

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Bepanthen 50 mg/g kreem dekspantenool

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Bepanthen kreemi täpselt juhiste järgi vastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Bepanthen kreem ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Bepanthen kreemi kasutamist
3. Kuidas Bepanthen kreemi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Bepanthen kreemi säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON BEPANTHEN KREEM JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Bepanthen kreemi aktiivne koostisaine dekspantenool muundub rakkudes pantoteenhappeks ja toimib seega B₅ vitamiinina. Dekspantenooli eeliseks on tema parem imendumine paiksel manustamisel. Pantoteenhappel on keskne osa raku ainevahetuses. Pantoteenhape on inimorganismile vajalik naha ja limaskestade regeneratsiooniks.

Näidustus

Kerged nahakahjustused.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE BEPANTHEN KREEMI KASUTAMIST

Ärge kasutage Bepanthen kreemi

- kui te olete ülitundlik (allergiline) dekspantenooli või Bepanthen kreemi mõne koostisosa suhtes.

Rasedus ja imetamine

Bepanthen kreemi kasutamine pole vastunäidustatud raseduse ajal ega rinnaga toitmise perioodil. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

3. KUIDAS BEPANTHEN KREEMI KASUTADA

- Imiku naha hoolduseks määratakse nahale mähkmete vahetamise ajal.
- Imetamise ajal võib määrada rinnanibudele iga toitmiskorra järel.
- Pindmiste haavade, nahamarrastuste ja -lõhede raviks manustatakse nahale üks või vajadusel rohkem kordi päevas.
- Paranemise ja epitelisatsiooni soodustamiseks, regulaarseks nahahoolduseks kantakse nahale üks või vajadusel rohkem kordi päevas.

Kasutage Bepanthen kreemi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on tunne, et Bepanthen kreemi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Bepanthen kreemi, mis on väga õrna (vesilahuselise) ning kiiresti imenduva koostisega, on soovitatav eelistada katmata kehaosade (käed, küünarnukid ja nägu) ravimisel ja karvkattega piirkonnas.

Bepanthen kreem sobib hästi ka päikesepõletuste ning kergemate põletuste raviks.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Bepanthen kreem põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ülitundlikkus Bepanthen kreemi mistahes koostisosa suhtes.

Eriti harvadel juhtudel on esinenud allergilisi nahareaktsioone. Sellisel juhul pöörduge oma arsti poole.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS BEPANTHEN KREEMI SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Bepanthen kreemi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast märget Kõlblik kuni:. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Bepanthen kreem sisaldab

- Toimeaine on dekspantenool. 1 g kreemi sisaldab 0,05 g dekspantenooli.
- Abiained on DL-pantolaktoon, fenoksüetanool, Amphisol K (heksadetsüülkaaliumvesinikfosfaat), tsetüülalkohol, stearyülalkohol, lanoliin, isopropüülmüristaat, propüleenglükool, puhastatud vesi.

Kuidas Bepanthen kreem välja näeb ja pakendi sisu

Bepanthen kreem on polüpropüleenkorgiga alumiiniumtuubis.

Pakendis on 3,5 g (näidispakend) või 30 g kreemi.

Müügiloa hoidja

UAB Bayer

Žirmunu 68a

LT 09124 Vilnius

Leedu

Tootja

GP Grenzach Productions GmbH
Emil-Barell-Strasse 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Tel.: +372 655 8565

Infoleht on viimati kooskõlastatud: veebruaris 2010