

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Bepanthen 50 mg/g salv dekspantenool

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Bepanthen salvi täpselt juhistelevastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Bepanthen salv ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Bepanthen salvi kasutamist
3. Kuidas Bepanthen salvi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Bepanthen salvi säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON BEPANTHEN SALV JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Bepanthen salvi aktiivne koostisaine dekspantenool muundub rakkudes pantoteenhappeks ja toimib seega B₅ vitamiinina. Dekspantenooli eeliseks on tema parem imendumine paiksel manustamisel.

Pantoteenhappel on keskne osa raku ainevahetuses. Pantoteenhape on inimorganismile vajalik naha ja limaskestade regeneratsiooniks.

Näidustus

Kerged nahakahjustused.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE BEPANTHEN SALVI KASUTAMIST

Ärge kasutage Bepanthen salvi

- kui te olete ülitundlik (allergiline) dekspantenooli või Bepanthen salvi mõne koostisosa suhtes.

Rasedus ja imetamine

Bepanthen salvi kasutamine pole vastunäidustatud raseduse ajal ega rinnaga toitmise perioodil.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

3. KUIDAS BEPANTHEN SALVI KASUTADA

- Imiku naha hoolduseks määratakse nahale mähkmete vahetamise ajal.
- Imetamise ajal võib määrada rinnanibudele iga toitmiskorra järel.
- Pindmiste haavade, nahamarrastuste ja -lõhede raviks manustatakse nahale üks või vajadusel rohkem kordi päevas.

- Paranemise ja epitelisatsiooni soodustamiseks, regulaarseks nahahoolduseks kantakse nahale üks või vajadusel rohkem kordi päevas.

Kasutage Bepanthen salvi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on tunne, et Bepanthen salvi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Bepanthen salv on kõrge rasvasisaldusega, sobides kuiva naha puhul kasutamiseks või kaitsekihi saavutamiseks.

Katmata kehaosade (käed, küünarnukid ja nägu) ravimisel on soovitatav eelistada Bepanthen kreemi, mis on väga õrna (vesilahustuva) ning kiiresti imenduva koostisega.

Nii antiseptikumi kui ka dekspantenooli sisaldavat Bepanthen Plus kreemi kasutatakse infitseerunud või infektsioonihuga haavade raviks.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Bepanthen salv põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ülitundlikkus Bepanthen salvi mistahes koostisosa suhtes.

Eriti harvadel juhtudel on esinenud allergilisi nahareaktsioone. Sellisel juhul pöörduge oma raviarsti poole.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS BEPANTHEN SALVI SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Bepanthen salvi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast märget Kõlblik kuni:. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Bepanthen salv sisaldab

- Toimeaine on dekspantenool. 1 g salvi sisaldab 0,05 g dekspantenooli.
- Abiained on protegin X (vedel parafiin, vaseliin, vaha, glütserüüloleaat, lanoliinalkohol), tsetüülalkohol, stearüülalkohol, valge mesilasvaha, lanoliin, valge vaseliin, mandliõli, vedel parafiin, puhastatud vesi.

Kuidas Bepanthen salv välja näeb ja pakendi sisu

Bepanthen salv on polüpropüleenkorgiga alumiiniumtuubis.

Pakendis on 3,5 g (näidispakend), 30 g või 50 g salvi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

UAB Bayer

Žirmunu 68a

LT 09124 Vilnius

Leedu

Tootja

GP Grenzach Productions GmbH

Emil-Barell-Strasse 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ

Lõõtsa 2, Tallinn

Tel.: +372 655 8565

Infoleht on viimati koostöölstatud veebruaris 2010