

## **Pakendi infoleht: teave kasutajale**

### **Alka-Seltzer 324 mg kihisevad tabletid**

Atsetüülsalitsüülhape

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Alka-Seltzer ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Alka-Seltzer tablettide kasutamist
3. Kuidas ravimit Alka-Seltzer kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas ravimit Alka-Seltzer säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Alka-Seltzer ja milleks seda kasutatakse**

Alka-Seltzer sisaldab atsetüülsalitsüülhapet, mis on valuvaigistava, palavikku alandava ja põletikuvastase toimega ning vähendab vere hüübimisvõimet.

Alka-Seltzer tablette kasutatakse peavalu, hambavalu, menstruaatsiooni valu, lihas- ja liigesvalu ning palaviku korral. Alka-Seltzer tablette kasutatakse ka külmetushaiguste või gripi puhul esineva valu ja palaviku korral.

#### **2. Mida on vaja teada enne Alka-Seltzer tablettide kasutamist**

##### **Ärge kasutage ravimit Alka-Seltzer:**

- kui olete atsetüülsalitsüülhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil on äge mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavand;
- kui teil on eelsoodumus veritsustele;
- kui teil on salitsülaatide või sarnase toimega mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite poolt esilekutsutud astma;
- kui teile on määratud raviks metotreksaati 15 mg nädalas või rohkem;
- kui teil on raseduse viimane kolmandik.

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Alka-Seltzer:

- kui teile on määratud antikoagulantravi;
- kui teil on seedetrakti haavand, kaasa arvatud krooniline või korduv haavandtõbi;
- kui teil on kroonilised seedetraktihäired või glükoos-6-fosfaathüdrogenaasi puudulikkus;
- kui teil on neeru- või maksafunktsiooni häired;
- kui teil on ülitundlikkus põletikuvastaste või antireumaatliste ravimite või teiste allergeenide suhtes;
- kui teil on kusihappe eritumise häired;

- kui te olete rase või imetate last.

Atsetüülsalitsüülhapet ei ole soovitatav anda lastele ja alla 18-aastastele noorukitele palavikuga kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye' sündroom (entsefalopaatia, maksafunktsiooni häired, esmanähuna kauakestev oksendamine).

### **Muud ravimid ja Alka-Seltzer**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Järgmiste ravimite toimed võivad tugevneda:

- antikoagulandid;
- mittesteroidsed põletikuvastased ravimid;
- sulfonüüluurea preparaadid;
- metotreksaat;
- valproehape.

Glükokortikosteroidide samaaegne kasutamine suurendab mao-sooletrakti verejooksu ohtu. Digoksiini plasmakontsentratsioon suureneb.

Järgmiste ravimite toimed võivad nõrgeneda:

- diureetikumid (vee eritust suurendavad ravimid);
- vererõhku alandavad preparaadid;
- urikosuurilised preparaadid.

Juba väikestes annustes vähendab atsetüülsalitsüülhappe kusihappe eritumist. See võib soodustada podagra arengut patsientidel, kellel esinevad kusihappe eritumise häired.

### **Alka-Seltzer koos toidu ja joogiga**

Alkoholi tarbimine ravimi kasutamise ajal suurendab seedetrakti verejooksu ohtu ja pikendab veritsusaega.

### **Rasedus ja imetamine**

Ravimi Alka-Seltzer kasutamine ei ole raseduse ajal soovitatav. Esimesel kahel raseduse kolmandikul võib Alka-Seltzer kihisevaid tablette kasutada ainult arsti ettekirjutusel. Raseduse viimasel kolmandikul ei tohi Alka-Seltzer tablette kasutada.

Kuna seni ei ole täheldatud ravimi aeg-ajalt kasutamise ebasoodsat mõju lapsele, ei ole tavaliselt vaja rinnaga toitmist katkestada. Ent ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel tuleb rinnaga toitmine varakult katkestada.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Alka-Seltzer ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

## **3. Kuidas ravimit Alka-Seltzer kasutada**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

**Täiskasvanud:** 1...3 tabletti ühekordse annusena, mida võib korrata 4...8 tunni järel. Maksimaalset ööpäevast annust 12 tabletti ei tohi ületada.

**Lapsed ja alla 18-aastased noorukid** - vt lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“.

Üle 9-aastased lapsed: 1 tablett ühekordse annusena. Manustada mitte sagedamini kui iga 4 tunni järel.

Alla 9-aastastele lastele ei sobi Alka-Seltzer toimeaine suure sisalduse tõttu. Alla 9-aastastele lastele soovitatakse kasutada atsetüülsalitsüülhappe väiksema sisaldusega tablette.

Enne Alka-Seltzer tablettide manustamist lahustatakse need klaasitäies vees.

### **Kui te võtate Alka-Seltzer tablette rohkem kui ette nähtud**

Üleannustamise korral võivad ilmneda kohin kõrvades, kuulmise langus, peavalu, peapööritus ja segasusseisund.

Üleannustamissümptomite ilmnemisel võtke otsekohe ühendust arstiga.

### **Kui te unustate Alka-Seltzer tablette võtta**

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedamini esinevateks kõrvaltoimeteks on seedetrakti ärritusnähud (kõhuvalu, iiveldus, oksendamine) ja seedetrakti väikesed verejooksud. Üksikjuhtudel on täheldatud maksafunktsioonihäireid. Harva võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (nõgestõbi, nahareaktsioonid, anafülaktilised reaktsioonid, astma).

### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas ravimit Alka-Seltzer säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Pakendi sisu ja muu teave**

### **Mida Alka-Seltzer sisaldab**

- Toimeaine on atsetüülsalitsüülhape. Üks tablett sisaldab 324 mg atsetüülsalitsüülhapet.
- Abiained on pulbriline veevaba sidrunhape ja veevaba naatriumvesinikkarbonaat.

### **Kuidas Alka- Seltzer välja näeb ja pakendi sisu**

10 tabletti paber/PE/alumiinium/Surlyn kotikestes.

### **Müügiloa hoidja:**

UAB Bayer

Žirmunu 68A

LT-09124 Vilnius  
Leedu

**Tootja:**

Bayer Bitterfeldt GmbH  
OT Greppin  
Salegaster Chaussee 1  
06803 Bitterfeld-Wolfen  
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa kohaliku esindaja poole.

**Müügiloa hoidja esindaja Eestis:**

Bayer OÜ  
Lõõtsa 2, Tallinn  
Tel: +372 655 8565

**Infoleht on viimati uuendatud augustis 2013**