

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
PURI-NETHOL 50 mg tabletid
Merkaptopuriin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi juhul, kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline ravimi kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on PURI-NETHOL ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne PURI-NETHOL'i kasutamist
3. Kuidas PURI-NETHOL'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas PURI-NETHOL'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON PURI-NETHOL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

PURI-NETHOL on antimetaboliitide klassi kuuluv tsütotoksiline ravim (kasvajatevastane preparaat). Seda kasutatakse ägeda ja kroonilise müeloidse leukeemia raviks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PURI-NETHOL'I KASUTAMIST

Ärge võtke PURI-NETHOL'i

- kui te olete ülitundlik ravimi toimeaine või ükskõik millise abiaine suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga PURI-NETHOL

- kui teil on mõni maksahaigus või te kasutate ravimeid, mis võivad maksale kahjulikud olla. PURI-NETHOL on maksale toksiline, mistõttu kord nädalas peab arst tegema maksafunktsiooni teste, vajalikuks võib osutuda ka sagedasem maksafunktsiooni jälgimine. Nahakollasuse (ikteruse) tekkimisel tuleb ravi katkestada ja võtta ühendust arstiga.

Informeerige arsti teil esinevatest muudest haigustest või vaevustest.

ETTEVAATUST!

Immuunpuudulikkusega patsiente ei soovitata elusvaktsiinidega vaktsineerida.

PURI-NETHOL kuulub tsütotoksiliste ravimite hulka ning seda tohivad määrata vaid vastava väljaõppe saanud arstid.

Kuna PURI-NETHOL on tugeva toimega luuüdi pärssiv ravim, peab patsient selle manustamise ajal olema pideva arstliku kontrolli all.

Soovitav on tablettidega ümber käia ettevaatlikult ning poolitamisel neid palja käega mitte katsuda.

Merkaptopuriini tablettide käsitlemisel tuleb järgida kohalikke soovitusi ja/või tsütotoksiliste ravimite käsitlemise ja hävitamise eeskirju.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal on PURI-NETHOL'i kasutamine vastunäidustatud. Informeerige arsti kui olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga.

Oluline teave mõningate PURI-NETHOL tablettide koostisainete suhtes

Ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS KASUTADA PURI-NETHOL'I

Kasutage PURI-NETHOL'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanutele ja lastele on 2,5 mg/kg/ööpäevas, kuid annuse suurus ja manustamise kestus sõltub samaaegselt manustatud teiste tsütotoksiliste ravimite annustest. Teile vajaliku annuse määrab arst sõltuvalt teie haigusest. PURI-NETHOL tabletid tuleb koos veega alla neelata vähemalt üks tund enne või 3 tundi pärast sööki või piima joomist.

Ärge ületage arsti poolt määratud annust või selle manustamise sagedust.

Kui teil on tunne, et PURI-NETHOL'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate PURI-NETHOL'i rohekm kui ette nähtud

Üleannustamise esmasteks sümptomiteks võivad olla seedetrakti vaevused, kaasa arvatud iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus ja isutus. Esineda võib vereloome pärssumist, mille teke on tõenäolisem kroonilise üleannustamise puhul. Üleannustamise oht on suurem, kui samaaegselt kasutatakse allopurinooli. Üleannustamise kahtluse korral pöörduge arsti poole.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka PURI-NETHOL põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Peamine kõrvaltoime on luuüdi funktsiooni pärssumine ning selle tagajärjel tekkiv vereloome häire - leukopeenia ja trombotsütopeenia (leukotsüütide ja trombotsüütide hulga vähenemine), sekundaarne leukeemia ja müelodüsplaasia.

PURI-NETHOL avaldab toksilist toimet maksale. Toksilise toime avastamiseks jälgib arst teie maksafunktsiooni näitajaid. PURI-NETHOL-ravi õigeaegsel lõpetamisel on muutused üldjuhul pöörduvad, kuid on esinenud ka pöördumatuid maksakahjustusi.

Aeg-ajalt on tekkinud isutus. Sageli on tekkinud iiveldus, oksendamine ja kõhunäärme põletik. Harva haavandid suuõõnes, väga harva haavandid sooltes. Harva on ülitundlikkusreaktsioonina esinenud kehatemperatuuri tõusu, liigesvalu ja nahalööbeid, väga harva näoturset. Harva on esinenud juuste väljalangemist ja meestel ajutiselt oligospermiat. Kõrvaltoimete ilmnemisel konsulteerige oma arstiga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole loetletud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas PURI-NETHOL'i säilitada

PURI-NETHOL tablette tuleb säilitada temperatuuril kuni 25°C, niiskuse ja valguse eest kaitstult. Tablette tuleb hoida originaalpakendis.

Ärge kasutage PURI-NETHOL'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida PURI-NETHOL sisaldab

- Toimeaine on merkaptopuriin.
- Abiained on laktoos, maisitärklis, oksüdeeritud tärklis, magneesiumstearaat, steariinhape.

Kuidas PURI-NETHOL välja näeb ja pakendi sisu

Merevaikkollasest klaasist purgis on 25 kahvatukollast värvi, ümmargust, kaksikkumerat, ühel küljel asuva poolitusjoonega tabletti, millele on pressitud kiri GX poolitusjoone kohal ja EX2 poolitusjoone all.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks. Purk on suletud lastekindla korgiga.

Müügiloo hoidja ja tootja

Müügiloo hoidja
Aspen Pharma Trading Limited
12/13 Exchange Place
I.F.S.C
Dublin 1
Iirimaa

Tootjad
EXCELLA GmbH
Nürnberger Strasse 12
90537 Feucht
Saksamaa

või

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Grunwaldzka 189
60-322 Poznan
Poola

Infoleht on viimati kooskõlastatud: aprillis 2012.