

Pakendi infoleht: teave patsiendile
Fucidin 20 mg/g, salv
Fusidiinhape

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Fucidin salv ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Fucidin salvi kasutamist
3. Kuidas Fucidin salvi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Fucidin salvi säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Fucidin salv ja milleks seda kasutatakse

Fucidin salv sisaldab fusidiinhapet, mis on tugeva antibakteriaalse toimega antibiootikum. fusidiinhape toimib stafülokokkidesse ja streptokokkidesse. Stafülokokid, kaasa arvatud penitsilliin-resistentsed ja teiste antibiootikumide suhtes resistentsed tüved, on fusidiinhappe suhtes tundlikud.

Fucidin salvi kasutatakse fusidiinhappele tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud nahainfektsioonide raviks, nagu impetiigo, follikuliit, furunkuloos, paronühhia, sekundaarselt infitseerunud dermatiit ja haavad.

2. Mida on vaja teada enne Fucidin salvi kasutamist

Ärge kasutage Fucidin salvi

- kui te olete ülitundlik (allergiline) Fucidin salvi mõne koostisosa suhtes

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

Kui Fucidin salvi kasutatakse näol, tuleb hoiduda salvi silma sattumise eest, sest salvis sisalduvad ained võivad põhjustada konjunktivi ärritus.

Fucidin salvis sisalduvad tsetüülalkohol ja lanoliin. Need ained võivad põhjustada lokaalseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit). Fucidin salv sisaldab butüülhüdrosütolueeni (E321), mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt. kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust.

Fertiilsus

Puuduvad kliinilised andmed Fucidini paikse kasutamise mõjust fertiilsusele. Fertiilses eas naistel ei ole ravimi toime tõenäoline, kuna paiksel manustatud fusidiinhappe/naatriumfusidaadi süsteemne imendumine on ebaoluline

Rasedus

Fucidin salvi võib kasutada raseduse ajal.

Toime lootele on ebatõenäoline, kuna fusidiinhappe/naatriumfusidaadi paikse kasutamise järgsel on süsteemne imendumine ebaoluline. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga.

Fusidiin

Imetamine

Fucidin salvi võib kasutada rinnaga toitmise ajal, kuid soovitatav on vältida Fucidin salvi kasutamist rinnal.

Muud ravimid ja Fucidin salv:

Koostoimeuuringuid ei ole teostatud. Süsteemne koostoime on ebatõenäoline, sest pärast paikse Fucidini manustamist on süsteemne toime ebaolulise tähtsusega. Sellele vaatamata informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

3. Kuidas Fucidin salvi kasutada

Fucidin salvi määratakse kahjustatud piirkonnale 2...3 korda päevas, üldisel 7 päeva vältel. Salvi võib kasutada ilma katva sidemeta.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Fucidin salv põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete sagedus baseerub kliiniliste uuringute ja spontaansete teatiste koondanalüüsi andmetel.

Tuginedes Fucidin kreemi ja Fucidin salvi kombineeritud kliinilistele andmetele, mis hõlmas 4724 patsienti, võivad ligikaudu 2,3 % patsientidest tekkida kõrvaltoimed.

Fucidin salv on üldjuhul hästi talutav ja ülitundlikkusreaktsioonid tekivad väga harva.

Harvad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st): ülitundlikku mis tahes ravimi koostisosa suhtes, konjunktiviit, angioödeem (turse), urtikaaria (nõgestõbi), villid,

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st): dermatiit, lööve, pruuritus (sügelus), erüteem (punetus)

Lapsed

Kõrvaltoimete sagedus, tüüp ja tõsidusaste lastel on sarnane täiskasvanutega.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Fucidin salvi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Mitte kasutada pärast etiketil ja pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Kõlblikkusaeg pärast tuubi esmast avamist on 28 päeva.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fucidin salv sisaldab:

- **Toimeaine on** fusidiinhape. Salvi 1 g sisaldab 20 mg naatriumfusidaati.
- **Abiained on** lanoliin, tsetüülalkohol, all-*rac*-alfa-tokoferool, butüülhüdrosütolueen (E321), vedel parafiin ja valge pehme parafiin.

Müügiloa hoidja

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Taani

Tootja

LEO Laboratories Ltd
285 Cashel Road, Dublin 12
Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Meda Pharma SIA
Narva mnt. 11D, 10151 Tallinn
Tel: +372 62 61 025

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2014