

## **Pakendi infoleht: teave kasutajale**

### **Loceryl, 50 mg/ml ravimküünelakk** Amorolfiinvesinikkloriid

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### **Infolehes antakse ülevaade:**

1. Mis ravim on Loceryl ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Loceryl'i kasutamist
3. Kuidas Loceryl'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Loceryl'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Loceryl ja milleks seda kasutatakse**

Loceryl küünelakki kasutatakse küünte seenhaiguste raviks.

#### **2. Mida on vaja teada enne Loceryl'i kasutamist**

##### **Ärge kasutage Loceryl'i**

- kui te olete amorolfiini või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

- Loceryl küünelakki ei kasutata lastel, kuna ravikogemused lastel on ebapiisavad.
- Vältida ravimi sattumist silma, kõrva ja limaskestadele.

##### **Muud ravimid ja Loceryl**

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teiste paiksete ravimite samaaegse kasutamise kohta pole koostoimeid teada.

Raviperioodil tuleb hoiduda kosmeetilise küünelaki ja tehisküünte kasutamisest.

Orgaaniliste lahustite kasutamisel tuleb kanda vett mitteläbilaskvaid kaitsekindaid, vastasel juhul tuleks amorolfiin küünelakk eemaldada.

##### **Loceryl'i kasutamine koos toidu ja joogiga**

Pole asjakohane.

##### **Rasedus ja imetamine**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Amorolfiini ei tohi kasutada raseduse ja/või imetamise ajal, kui see ei ole hädavajalik

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Pole asjakohane.

### **Oluline teave mõningate Loceryl'i koostisainete suhtes**

Pole asjakohane.

## **3. Kuidas Loceryl'i kasutada**

Kasutage Loceryl'i alati täpselt nii nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaliselt kantakse küünelakk kahjustatud sõrme- või varbaküüntele 1 või 2 korda nädalas. Seda tehakse alljärgneval viisil.

1. Enne küünelaki esmakordset pealekandmist tuleb kahjustatud küüned võimalikult õhukeseks viilida. Selleks kasutatakse juuresolevat ühekordset küüneviili.
  2. Kahjustatud küüs pühitakse alkoholisisaldusega vatitupsuga puhtaks. Ka enne küünelaki korduvat pealekandmist viilitakse küüned võimalikult õhukeseks ning eemaldatakse alkoholisisaldusega vatitupsuga vana laki jäägid.
  3. Küünelakk kantakse spaatli abil kahjustatud küüntele. Pärast spaatli laki sisse kastmist ei tohi seda vastu pudelisuud pühkida. Et vältida ravimi aurustumist, tuleks ravimipudel pärast protseduuri lõppu õhukindlalt sulgeda. Seejärel lastakse lakil 3...5 minutit kuivada. Pärast kasutamist pühitakse spaatel sama niisutatud vatitupsuga puhtaks.
  4. Kokkupuutel vedeldaja, lakibensiini jt orgaaniliste lahustitega tuleb kanda kaitsekindaid.
  5. Ravi peaks katkestamatult jätkuma senikaua, kuni küüs on taastunud ja kahjustatud alad paranenud. Ravi kestus sõltub kahjustuse paiknemisest ja ulatusest ning küünte kasvukiirusest. Reeglina kestab ravi sõrmeküünte seeninfektsiooni korral 6 ja varbaküünte kahjustuse korral 9...12 kuud.
- Ettevaatust! Nakatunud küüntega kokkupuutunud küüneviili ei tohi kasutada tervete küünte viilimiseks.

Kui teil on tunne, et Loceryl'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

### **Kui te unustate Loceryl'i kasutada**

Ärge kasutage ravimit rohkem kui eelnev kasutuskord jäi vahele.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimeid esineb harva. Võib esineda küünte häireid (nagu küünte värvuse muutumine, murdunud küüned, rabedad küüned). Samas võivad need nähud olla tingitud ka küüne seenhaigusest endast.

Harva (vähem kui ühel patsiendil 1000-st) on esinenud küünte häireid: küünte värvuse muutumine, küünte murdumine.

Väga harva (vähem kui 1 patsiendil 10'000-st, sealhulgas üksikjuhtudel) on esinenud põletustunnet nahal.

Turuletulekujärgselt on teatatud naha punetusest, sügelusest, kontaktdermatiidist, nahalööbest ja villidest (esinemissagedus teadmata).

### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

### **5. Kuidas Loceryl'i säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Pärast ravimi kasutamist tuleb küünelaki pudel õhukindlalt sulgeda.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

### **6. Pakendi sisu ja muu teave**

#### **Mida Loceryl sisaldab:**

Toimeaine on amorolfiin. 1ml küünelakki sisaldab 55,7 mg amorolfiinvesinikkloriidi (vastab 50 mg amorolfiinile).

Abiained on ammooniummetakrülaadi kopolümeer (tüüp A), triatsetiin, butüülatsetaat, etüülatsetaat, veevaba etanool.

#### **Kuidas Loceryl välja näeb ja pakendi sisu:**

2,5 ml või 5 ml ravimküünelakki merevaik-kollases klaaspudelis. Kõik originaalpakendid sisaldavad 30 isopropüülalkoholis niisutatud vatitupsu fooliumpakendis, 10 spaatlit ja 30 ühekordset küüneviili.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

#### **Müügiloa hoidja ja tootja**

Müügiloa hoidja:

GALDERMA INTERNATIONAL

Tour Europlaza

La Défense 4

20, avenue André Prothin

F-92927 La Défense Cédex

Prantsusmaa

Tootja:

Laboratoires Galderma

Z.I. – Montdesir,

74540 Alby-sur-Cheran,

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

H.Abbe Pharma GmbH

Pirita tee 20T

10127 Tallinn

Tel. 646 0980

**Infoleht on viimati kooskõlastatud: jaanuaris 2015**