

Pakendi infoleht: teave kasutajale

STREPSILS VITAMIN C, losengid (imemistabletid) Amüülmetakresool, 2,4-diklorobensüülalkohol, vitamiin C

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõdega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga

Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on Strepsils Vitamin C ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Strepsils Vitamin C kasutamist
3. Kuidas Strepsils Vitamin C kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Strepsils Vitamin C säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Strepsils Vitamin C ja milleks seda kasutatakse

Strepsils Vitamin C imemistabletid sisaldavad kahe antiseptilise toimeaine kombinatsiooni, mis toimib suu- ja neelupõletikke tekitavatele bakteritele. Strepsils Vitamin C imemistablette kasutatakse desinfitseeriva vahendina suu- ja neelupõletike korral patsientidel, kes samaaegselt vajavad täiendavalt C-vitamiini. Askorbiinhape on C-vitamiini allikas, mille sisaldus arvatakse infektsioonide ajal langevat.

2. Mida on vaja teada enne Strepsils Vitamin C kasutamist

Ärge kasutage imemistablette, kui olete ülitundlik mõne ravimi koostisosa suhtes.

Rasedus ja imetamine:

Ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud, kuid tõenäoliselt oht puudub. Raseduse ja imetamise ajal kasutage siis, kui arst teile seda soovib.

3. Kuidas Strepsils Vitamin C kasutada

Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed: 1 imemistablett lasta suus aeglaselt sulada iga 2 kuni 3 tunni järel, kuid mitte üle 8 tableti ööpäevas. Eakatel pole vaja annust vähendada. Ärge ületage lubatud annust.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võivad ka Strepsils Vitamin C imemistabletid põhjustada kõrvaltoimeid. Aegajalt võivad tekkida ülitundlikkuse reaktsioonid ja keele valulikkus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada

www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Strepsils Vitamin C säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Strepsils Vitamin C sisaldab

Toimeained on amüülmetakresool ja 2,4-diklorobensüülalkohol ja vitamiin C. Üks imemistablett sisaldab 0,6 mg amüülmetakresooli ja 1,2 mg 2,4-diklorobensüülalkoholi ja 100 mg vitamiini C (askorbiinhapet).

Abiained on levomentool, veriapelsini maitseaine, viinhape, propüleenglükool, päikeseloojangukollane värvaine (E110), erkpunane värvaine (E124), veeldatud suhkur, veeldatud glükoos.

Kuidas Strepsils Vitamin C välja näeb ja pakendi sisu

Losengid on pakitud blisterpakendisse, mis on tehtud läbipaistvast 250 mikroni paksusest polüvinüülkloriidist (PVC), kaetud 40 gsm polüvinüülideenkloriidiga (PVDC); kuumtihendatud 20 mikroni paksuse alumiiniumkattega ning kaetud 7 gsm lakiga.

Blisterpakendis on 12 tabletti. Kaks blistrit on pakitud pappkarpi.

Loseng (imemistablett) on ringikujuline, apelsini värvuse ja maitsega (läbimõõt 1,8 cm)

Müügiloa hoidja:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Ul.Okunin 1
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Poola

Tootjad:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd
Nottingham site
Thane Road
Nottingham NG90 2DB
Ühendkuningriik

SIA ELVIM

Kurzemes prospekts 3-513
RIGA LV-1067
Läti

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Kärberi 34-30
Tallinn 13919
Tel: 5151555

Infoleht on viimati koostöölastatud veebruaris 2014