

Pakendi infoleht: teave kasutajale

TRUSOPT 20 mg/ml silmatilgad, lahus Dorsolamiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on TRUSOPT ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne TRUSOPT'i kasutamist
3. Kuidas TRUSOPT'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas TRUSOPT'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on TRUSOPT ja milleks seda kasutatakse

TRUSOPT sisaldab toimeainena dorsolamiidi, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse karboanhüdraasi inhibiitoriteks.

Seda ravimit kasutatakse kõrgeenenud silmasisese rõhu alandamiseks ja glaukoomi raviks. Seda võib kasutada üksinda või lisaks teistele silmasisest rõhku alandavatele ravimitele (niinimetatud beetaadrenoblokaatorid).

2. Mida on vaja teada enne TRUSOPT'i kasutamist

Ärge kasutage TRUSOPT'i:

- kui te olete dorsolamiidvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui teil on raske neerukahjustus või probleemid neerudega või teil on kunagi olnud neerukivid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Informeerige arsti kõigest oma praegu esinevatest ja varem esinenud tervislikest probleemidest, sealhulgas silmaprobleemidest ja –operatsioonidest ning kõigest ravimitega seotud allergilistest reaktsioonidest.

Kui teil tekivad silma ärritusnähud või teised silmadega seotud probleemid, mida teil varem pole esinenud, näiteks silmade punetus või silmalaugude turse, konsulteerige otsekohe arstiga.

Kui te arvate, et selle ravimi kasutamine põhjustab teil mõningaid allergilisi reaktsioone, näiteks nahalöövet, rasket naha reaktsiooni või sügelust, lõpetage selle kasutamine ja konsulteerige otsekohe arstiga.

Lapsed

TRUSOPT'i kasutamist on uuritud imikutel ja alla 6-aastastel lastel, kellel on kõrgeenenud silmasisene rõhk või glaukoomi diagnoos. Lisainformatsiooni saamiseks rääkige oma arstiga.

Kasutamine eakatel

TRUSOPT'i uuringutes oli ravimi toime ühesugune nii eakatel kui noorematel patsientidel.

Kasutamine maksakahjustusega patsientidel

Informeerige oma arsti, kui teil on praegu või on kunagi olnud probleeme maksaga.

Muud ravimid ja TRUSOPT

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid (sealhulgas teisi silmatilkasid). See on eriti tähtis kui te võtate mõnda teist karboanhüdraasi inhibiitorit, näiteks atsetasolamiidi või sulfoonamiidide rühma kuuluvat ravimit.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine raseduse ajal

TRUSOPT'i ei tohi kasutada raseduse ajal. Informeerige oma arsti, kui te olete rase või planeerite rasedust.

Kasutamine rinnaga toitmise ajal

TRUSOPT'i kasutamise ajal ei soovitata last rinnaga toita. Informeerige oma arsti, kui te toidate last rinnaga või kavatsete seda teha.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitlemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. TRUSOPT'i võimalikud kõrvaltoimed nagu peeringlus ja nägemishäired võivad mõjutada autojuhtimise ja/või masinatega töötamise võimet. Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui te ei tunne ennast hästi või kui teie nägemine ei ole selge.

TRUSOPT sisaldab bensalkooniumkloriidi

TRUSOPT sisaldab säilitusainena bensalkooniumkloriidi. See võib ladestuda pehmetele kontaktläätsedele ja põhjustada läätsede värvuse muutust. Kui te kannate kontaktläätsi, konsulteerige enne selle ravimi kasutamist arstiga.

3. Kuidas TRUSOPT'i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Arst määrab sobiva annuse ja ravi kestuse.

Kui TRUSOPT'i kasutatakse üksinda, siis manustatakse hommikul, lõunal ja õhtul üks tilk kahjustatud silma(desse).


Kui arst soovitas TRUSOPT'i kasutada koos teiste silmatilkadega (beetaadrenoblokaatoritega), siis manustatakse hommikul ja õhtul üks tilk TRUSOPT'i kahjustatud silma(desse).

Kui te kasutate peale TRUSOPT'i veel teisi silmatilkasid, peab nende manustamise vahe olema vähemalt 10 minutit.


Ärge puudutage ravimipudeli otsikuga silma ega selle ümbrust. See võib bakteriaalselt saastuda ja põhjustada silmapõletikku, mis viib tõsise silmakahjustuseni ja isegi nägemise kaotuseni. Et ära hoida ravimipudeli otsa võimalikku saastumist bakteritega, peske enne ravimi kasutamist käsi ja vältige pudeli otsa kokkupuudet ükskõik millise pinnaga. Kui arvate, et ravim võib olla saastunud või kui teil tekib silmapõletik, võtke otsekohe ühendust oma arstiga, et küsida selle pudeli edasise kasutamise kohta.

Kasutamissjuhend


1. Enne ravimi esmakordset kasutamist veenduge, et turvariba pudeli esiküljel on terve. Väike vahemik pudeli ja korki vahel on avamata ravimipudeli korral normaalne.




2. Eemaldage pudeli avamiseks turvariba.




3. Pudeli avamiseks keerake kork lahti vastavalt avamise suunajoontele. Ärge eemaldage korki pudelilt otse üles tõmmates, sest selle tagajärjel ei tööta tilguti korralikult.



4. Kallutage pea tahapoole ja tõmmake alumine silmalau kergelt allapoole, nii et moodustuks tasku alumise silmalau ja silmamuna vahele.



5. Hoidke pudelil olevat sõrmede vajutuskohta pöidla ja nimetissõrme vahel ja keerake pudel tagurpidi. Vajutage kergelt, kuni tilk ravimit läheb silma nagu arsti poolt määratud.



ÄRGE PUUTUGE PUDELI OTSIKUGA SILMA EGA SILMALAUGU.

6. Kui ravimi tilgutamine on raskendatud pärast pudeli esmakordset avamist, pange kork pudelile tagasi ja keerake see kinni (ärge üle keerake). Seejärel keerake kork lahti vastupidises, nooltega näidatud suunas.
7. Korrake punkte 4 ja 5 teise silma puhul, kui see on arsti poolt nii määratud.
8. Pärast kasutamist keerake kork tihedalt pudeli peale nii, et see puutuks pudeliga kokku. Pärast sulgemist peab korgi vasakul poolel olev nool olema kohakuti pudeli sildi vasakul poolel oleva noolega. Ärge keerake korki üle, sest see võib kahjustada pudelit ja korki.
9. Pudeli otsik on disainitud selliselt, et pudelist väljuks üks tilk; seetõttu EI tohi pudeli otsas olevat ava suurendada.
10. Kui kõik annused on ära kasutatud, jääb pudelisse natuke ravimit alles. Sellepärast ei ole vaja muret tunda, kuna pudel on täidetud liiaga ja teie saate täielikult manustada arsti poolt määratud TRUSOPT'i annuse. Ärge püüdke allesjäänud ravimit pudelist eemaldada.

Kui te kasutate TRUSOPT'i rohkem kui ette nähtud

Kui te manustate silma liiga palju tilku või neelasite TRUSOPT'i alla, siis konsulteerige otsekohe arstiga.

Kui te unustate TRUSOPT'i kasutada

Tähtis on kasutada TRUSOPT'i arsti ettekirjutuste järgi. Kui üks annus jäi vahele, tuleb see manustada niipea kui võimalik. Juhul, kui on juba järgmise annuse manustamise aeg, siis võib ununenud annuse üldse vahele jätta ning ravimi manustamist tuleb jätkata oma tavalise raviskeemi alusel. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate TRUSOPT'i kasutamise

Kui te soovite selle ravimi kasutamist lõpetada, pidage kõigepealt nõu oma arstiga. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allergiliste reaktsioonide ilmnemisel, mille nähtudeks on nõgestõbi, näo, huulte, keele ja/või kõri turse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskust, tuleb TRUSOPT'i kasutamine lõpetada ja pidada otsekohe nõu arstiga.

Järgmisi kõrvaltoimeid on kirjeldatud TRUSOPT'i kasutamisel kliinilistes uuringutes või müügiloa saamise järgselt:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: (rohkem kui ühel kasutajal 10-st)
Põletus- ja torkimistunne silmades.

Sageli esinevad kõrvaltoimed: (1...10 kasutajal 100-st)
Sarvkesta kahjustus koos silmavalu ja ähmase nägemisega (pindmine punktaatkeratiit), eritus silmadest koos silmade sügelusega (konjunktiviit), silmalau ärritus/põletik, ähmane nägemine, peavalu, iiveldus, mõru maitse ja väsimus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: (1...10 kasutajal 1000-st)
Vikerkesta põletik.

Harva esinevad kõrvaltoimed: (1...10 kasutajal 10000-st)
Käte või jalgade surisemine või tuimus, ajutine lühinägevus, mis võib mööduda ravi lõpetamise järgselt, vedeliku kogunemine võrkkesta alla (soonkesta irdumine, filtratsioonkirurgia järgselt), silmavalu, koorikute teke silmalaugudel, madal silmasisene rõhk, sarvkesta turse (koos nägemishäirete sümptomitega), silmäärritus (sh punetus), neerukivid, pearinglus, ninaverejooks, kurguärritus, suukuivus, piirdunud nahalööve (kontaktdermatiit), rasked naha reaktsioonid, allergilist tüüpi reaktsioonid, nagu lööve, nõgestõbi, sügelus, harvadel juhtudel on võimalik huulte, silmade ja suu turse, hingelduse ja harvem viliseva hingamise teke.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas TRUSOPT'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast "Kõlblik kuni:". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

TRUSOPT tuleb ära kasutada 28 päeva jooksul pärast pudeli avamist.

Hoida pudelit karbis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida TRUSOPT sisaldab

- Toimeaine on dorsolamiid.
- 1 ml lahust sisaldab 20 mg dorsolamiidi (22,26 mg dorsolamiidvesinikkloriidina).
- Teised koostisosad on hüdroksüetüülselluloos, mannitool, naatriumtsitraat, naatriumhüdroksiid ja süstevesi. Säilitusainena on lisatud bensalkooniumkloriid.

Kuidas TRUSOPT välja näeb ja pakendi sisu

TRUSOPT on selge, värvitu kuni peaaegu värvitu, kergelt viskoosne lahust. Silmalahuse pudel (OCUMETER Plus) on valmistatud läbipaistvast kõrgtihedast polüetüleenist ja sisaldab 5,0 ml lahust. Pudelist on turvariba, millelt on näha, kas pudel on juba avatud.

Pakendi suurus:

1 x 5,0 ml (üksikud 5 ml pudelid)

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Merck Sharp & Dohme OÜ,
A. H. Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Eesti Vabariik

Tootja

LABORATORIES MERCK SHARP & DOHME
Chibret MIRABEL PLANT
Route de Marsat, RIOM
63963 Clermont-Ferrand Cedex 9
Prantsusmaa

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2012