

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Sudafed Expectorant, 6 mg/20 mg/ml siirup Pseudoefedriinvesinikloriid/guaifenesiin

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Sudafed Expectorant siirupit täpselt juhiste vastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Sudafed Expectorant ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Sudafed Expectorant siirupi kasutamist
3. Kuidas Sudafed Expectorant siirupit kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Sudafed Expectorant siirupit säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON SUDAFED EXPECTORANT SIIRUP JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Sudafed Expectorant siirupit kasutatakse täiskasvanutel samaaegselt nina limaskestast turse vähendamiseks nohu korral ja röga lahustamiseks ägeda produktiivse köha korral.

6-12-aastastel lastel kasutatakse Sudafed Expectorant siirupit samaaegselt nina limaskestast turse vähendamiseks nohu korral ja röga lahustamiseks ägeda produktiivse köha korral, kui tavameetmed on osutunud ebapiisavaks.

Ravimis sisalduv pseudoefedriin vähendab nina limaskestast turset. Guaifenesiin on röga lahustava toimega: ta suurendab röga veesisaldust ning vähendab viskoossust, mille tulemusena on röga kergem välja köhida.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE SUDAFED EXPECTORANT SIIRUPI KASUTAMIST

Ärge kasutage Sudafed Expectorant siirupit

- Allergia (ülitundlikkuse) korral ravimis sisalduvate toimeainete või ükskõik millise abiaine suhtes,
- patsientidel, kes kasutavad (või on viimase 2 nädala jooksul kasutanud) depressioonivastaseid ravimeid, mida tuntakse MAO inhibiitorite (monoamiinioksüdaasi inhibiitorid) nime all,
- patsientidel, kes kasutavad antibakteriaalset preparaati furasolidooni, sümpatomimeetilisi dekongestante (nohuravimeid) või beeta-blokaatoreid,
- patsientidel, kellel on südame-veresoonkonna haigus, sh kõrgvererõhutõbi,
- Patsientidel, kellel on raske neerutalitluse häire, suhkurtõbi, feokromotsütoom, hüpertüreoidism (kilpnäärme ületalitus) või kinnisenurga glaukoom.
- alla 6-aastastel lastel.

Sudafed Expectorant'i ei või manustada koos köhapärssijatega.

Sudafed Expectorant'i ei tohi kasutada püsiva või kroonilise köha ravimiseks, mis kaasneb nt astma, kopsuemfüseemi või suitsetamisega, samuti rohke rögaeritusega köha korral.

Informeerige arsti enne ravimi manustamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Sudafed Expectorant siirup

kõrge vererõhu, veresooni ummistavate haiguste, kõrgeenenud silmasisese rõhu ja eesnäärme healoomulise suurenemise korral.

Lõpetage koheselt Sudafed Expectorant'i kasutamine ning pöörduge arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest

- hallutsinatsioonid
- rahutus
- unehäired

Ravi tuleb koheselt katkestada ning konsulteerida arstiga, kui köha kestab üle 5 päeva, muutub tugevamaks või kui köhaga kaasneb palavik, lööve või püsiv peavalu.

Sudafed Expectorant sisaldab värvaineid päikeseloojangukollane (E110) ja erkpunane 4R (E124), mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.

Sudafed Expectorant sisaldab sahharoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev fruktoositalumatus, glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon või sahharoos-isomaltasi puudulikkus, ei tohi seda ravimit kasutada.

Sudafed Expectorant sisaldab 4,8 vol % etanooli (alkoholi), ehk 379 mg iga 10 ml annuse kohta, mis on võrdne 9,6 ml õlle või 4 ml veiniga. Võib olla kahjuliku mõjuga alkohoolikutele. Seda tuleb arvesse võtta ka rasedate või rinnaga toitvate naiste, laste, ning kõrge riskiga patsientide (maksahaigused, epilepsia) puhul.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Sudafed Expectorant siirupi samaaegne kasutamine koos monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoritega (teatud depressioonivastased ravimid), furasolidooni, tritsükliliste antidepressantide, amfetamiini-laadsete psühhostimulaatorite ja paikselt veresooni ahendavate ravimitega võib tõsta vererõhku.

Sudafed Expectorant siirup võib vähendada teatud vererõhuravimite toimet (nt beeta-adrenoblokaatorid, metüüldopa jt).

Kooskasutamine moklobemiidiga võib suurendada hüpertensiivse kriisi ohtu.

Samaaegne manustamine koos oksütotsiiniga võib tõsta vererõhku.

Samaaegne manustamine koos südameglükosiididega võib suurendada rütmihäirete riski.

Tungaltera alkaloidide samaaegne kasutamine võib põhjustada tungalteramürgistuse.

Antikolinergilised ained: pseudoefedriin võib suurendada antikolinergiliste ravimite (nt tritsükliliste antidepressantide) toimet.

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Konsulteerige arsti või apteekriga enne ükskõik millise ravimi kasutamist.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib ravimit kasutada ainult juhul, kui arst nii soovib. Kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sudafed Expectorant siirup ei avalda toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamisele.

3. KUIDAS SUDAFED EXPECTORANT SIIRUPIT KASUTADA

Pakend sisaldab mõõtelusikat.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed:

10 ml 3...4 korda ööpäevas (maksimaalne ööpäevane annus on 40 ml),

6...12-aastased lapsed:

5 ml 3...4 korda ööpäevas (maksimaalne ööpäevane annus 20 ml).

Sudafed Expectorant on vastunäidustatud alla 6-aastastele lastele. 6...12-aastastel lastel ei tohiks Sudafed Expectorant'i kasutada ilma arsti vastava ettekirjutuseta üle 5 päeva. Kui lapse seisund halveneb, tuleb koheselt arsti poole pöörduda.

Eakad patsiendid võivad kasutada tavalisi täiskasvanu annuseid. Ravim manustada soovitatavalt pärast sööki. Enne kasutamist loksutada.

Kui te unustate Sudafed Expectorant siirupit võtta

Manustage see esimesel võimalusel, kuid ärge võtke korraga kahte annust. Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga!

Kui te kasutate Sudafed Expectorant siirupit rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral võivad tekkida vererõhu tõus, südamepekslemine, ärrituvus, rahutus, värisemine ja krambid. Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. Võtke arsti juurde kaasa ravim või selle pakend, et arst teaks, millist ravimit olete manustanud.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Sudafed Expectorant põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Sudafed Expectorant siirupi kasutamisel tavaliselt kõrvaltoimeid ei teki või tekivad kergel kujul.

Pseudoefedriin

Tõsiseid kõrvaltoimeid pseudoefedriini kasutamisel esineb väga harva.

Väga harv (<1/10 000)

Süda ja veresoonekond

- Tahhükardia/ südamekloppimine
- Muud südame rütmihäired ja hüpertensioon

Kesknärvisüsteem

- Ärrituvus
- Ärevus
- Rahutus
- Erutus
- Unetus
- Hallutsinatsioonid ja paranoilised luulud

Nahareaktsioonid, kaasa arvatud lööve

Ülitundlikkusreaktsioonid – võivad ilmneda koos teiste sümpatomimeetikumidega

Muud nähud

- Iiveldus ja/või oksendamine
- Peavalu
- Kusepeetus

Guaifenesiin

Järgmised väga harva esinevad kõrvaltoimed võivad olla seotud guaifenesiini kasutamisega:

Seedetrakti häired: iiveldus, oksendamine

Immuunsüsteemi häired: allergilised reaktsioonid.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5. KUIDAS SUDAFED EXPECTORANT SIIRUPIT SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Mitte lasta külmuda.

Avatud siirup on kasutuskõlblik 28 päeva.

Pärast pakendil märgitud kõlblikusaja lõppu mitte kasutada!

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Sudafed Expectorant sisaldab

Toimeained on pseudoefedriinvesinikkloriid ja guaifenesiin.

5 ml siirupit sisaldab 30 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi ja 100 mg guaifenesiini.

Abiained on sahharoos, glütserool, metüülparahüdroksübensoaat (E218), propüülparahüdroksübensoaat (E216), 96% etanool, lõhna- ja maitseained (levomentool, metskirsi aroom), päikeseloojangukollane (E110), erkpunane 4R (E124) ja puhastatud vesi.

Kuidas Sudafed Expectorant välja näeb ja pakendi sisu

Sudafed Expectorant siirup on oranžikas-kollane iseloomuliku lõhnaga siirup.

Pakend sisaldab 100 ml siirupit keeratava metallkorgiga merevaikkollases klaaspudelil (tüüp III) ning kahe otsaga (2,5 ml/5 ml) mõõtelusikat.

Müügiloa hoidja

McNeil Products Ltd.

c/o Johnson & Johnson,

Foundation Park, Roxborough Way,

Maidenhead, Berkshire, SL 6 3 UG,

Ühendkuningriik

Tootja

Famar Orléans

5, avenue de Concyr

45071 Orléans

Cedex 2

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Cilag GmbH International

Lõõtsa 2

11415 Tallinn

Tel: 617 74 20

Infoleht on viimati koostölastatud novembris 2011