

## **Pakendi infoleht: teave kasutajale**

Imex, 30 mg/g salv  
Tetratsükliinvesinikkloriid

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekri või meditsiiniõega.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

### **Infolehe sisukord:**

1. Mis ravim on Imex ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Imex'i kasutamist
3. Kuidas Imex'it kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Imex'it säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

### **1. Mis ravim on IMEX ja milleks seda kasutatakse**

Imex on antibiootikumi sisaldav salv välispidiseks kasutamiseks. Imex salvi kasutatakse akne, eriti akne põletikuliste vormide raviks.

Papulopustuloosse akne paikne ravi.

### **2. Mida on vaja teada enne IMEX'I kasutamist**

#### **Ärge kasutage Imex salvi:**

- kui olete tetratsükliinile või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

#### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga

Kuigi raseduse aegsel kasutamisel ei ole ilmnenud loodet kahjustavat toimet, ei tohi ravimit kasutada raseduse ajal, v.a arsti eriloal.

#### **Muud ravimid ja IMEX:**

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada.

#### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Puudub toime autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

### **3. Kuidas IMEX 't kasutada**

Kasutage Imex salvi alati alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole teisiti määranud, siis tuleb salv kanda õhukese kihina ravitavatele nahapiirkondadele 1...3 korda päevas ja hõõruda kergelt sisse. Ravi kestus ei ole ajaliselt piiratud.

Kui teil on tunne, et Imex'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

**Kui te unustate Imex salvi kasutada:**

Määrige salv nahale niipea kui see teile meelde tuleb ja jätkake siis salvi tavapärasest manustamist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

*Aeg-ajalt (rohkem kui 1 isikul 1000-st isikust ja vähem kui 1 isikul 100-st isikust):*

- Naha sügelus, põletustunne ja punetus.

*Harvat (rohkem kui 1 isikul 10 000-st isikust ja vähem kui 1 isikul 1000-st isikust):*

- Naha kuivus.

#### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

#### **5. Kuidas IMEX'it säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Pärast tuubi esmakordset avamist kasutuskõlblik 6 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda

#### **6. Pakendi sisu ja muu teave**

**Mida Imex sisaldab:**

- Toimeaine on tetratsükliin. 1 g salvi sisaldab toimeainena 30 mg tetratsükliinvesinikkloriidi.
- Abiained on valge vaseliin, keskmise ahelaga triglütseriidid ning värvained E 171 ja E 172

**Kuidas Imex välja näeb ja pakendi sisu:**

Imex on naha värvusega salv.

20 g salvi tuubis

**Müügiloa hoidja**

Merz Pharmaceuticals GmbH  
Eckenheimer Landstr. 100  
D - 60318 Frankfurt/Main  
Saksamaa

**Tootja:**

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA  
Eckenheimer Landstr. 100  
D - 60318 Frankfurt/Main  
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

H.Abbe Pharma GmbH  
Pirita tee 20T  
10127 Tallinn  
Tel. 646 0980

**Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2014.**