

## **Pakendi infoleht: teave kasutajale**

### **Unasyn, suukaudse suspensiooni pulber (50 mg/ml) Sultamitsilliin**

#### **Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üknes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Unasyn ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Unasyni võtmist
3. Kuidas Unasyni võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Unasyni säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Unasyn ja milleks seda kasutatakse**

Unasyn kuulub ravimitegruppide nimega penitsilliinantibiootikumid. Toimeaine sultamitsilliin muutub organismis ampitsilliiniks ja sulbaktaamiks. Sulbaktaam tõhustab ampitsilliini toimet põletike puhul, mis on põhjustatud penitsilliiniresistentsetest bakteritest. Ravimit Unasyn kasutatakse paljude eri tüüpi põletike raviks, sh ampitsilliini ja sulbaktaami kombinatsioonile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid: põskkoopa- ja keskkõrvapõletik, kroonilise bronhiidi ägenemine, kopsupõletik, naha- ja pehmete kudede infektsioonid, kuseteede infektsioonid.

Arst võib määrata teile Unasyni ka teiste, ülal mainimata põletike raviks.

#### **2. Mida on vaja teada enne Unasyni võtmist**

##### **Ärge võtke Unasyni**

- kui olete toimeaine (sultamitsilliin), penitsilliinirühma antibiootikumide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne Unasyni võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

##### **Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Unasyn**

- kui te olete allergiline
- kui te olete ülitundlik penitsilliinide ja/või mitme allergeeni või tsefalosporiinide suhtes
- kui teil on neeruhaigus

##### **Muud ravimid ja Unasyn**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

*Allopurinool (kasutatakse podagra korral):* Allopurinooli ja Unasyni kooskasutamisel suureneb nahalööbe tekkimise võimalus.

*Antikoagulandid (vere hüübivust mõjutavad ravimid):* Unasyn võib mõjutada antikoagulantide toimet.

*Bakteriostaatiliste ravimite (klooramfenikool, erütromütsiin, sulfoonamiidid ja tetratsükliinid) kasutamist koos Unasyniga tuleks vältida (võib väheneda Unasyni baktereid hävitav toime).*

*Östrogeene sisaldavad suukaudsed rasestumisvastased ravimid: ampitsilliini (üks Unasyni toimeaine) kasutanud naistel on täheldatud suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide toime vähenemist, milletagajärjel on tekkinud soovimatu rasedus. Ehkki see seos ei ole päris kindel, on ampitsilliinravi ajal soovitatav kasutada mõnda teist või täiendavat rasestumisvastast meetodit.*

*Metotreksaat: samaaegsel kasutamisel koos penitsilliinidega (Unasyn kuulub penitsilliinide ravimgruppi) on täheldatud metotreksaadi toksilisuse suurenemist.*

*Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (atsetüülsalitsüülhape, indometatsiin ja fenüülbutasoon): võivad pikendada Unasyni eritumist.*

*Probenetsiidiga samaaegsel kasutamisel suureneb ravimi toksilisuse oht.*

### **Unasyn koos toidu ja joogiga**

Toit ja jook ei mõjuta ravimi toimet.

### **Rasedus ja imetamine**

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi ohutus raseduse ajal ei ole tõestatud, seetõttu tohib Unasyni raseduse ajal kasutada üksnes juhul, kui sellest oodatav kasu kaalub üles võimalikud ohud.

Unasyn eritub rinnapiima. Antibiootikumravi vajaduse korral otsustab teie arst, kuidas toimida.

Unasyni kasutamine emal võib emapiima saaval lapsel põhjustada sensibiliseerumist, kõhulahtisust, seenhaigust (kandidiaasi) ja nahalöövet. Unasyni kasutamine imetamise ajal ei ole soovitatav.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Ravi ajal Unasyniga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme, sest üksikjuhtudel võib ravim põhjustada peeringlust.

### **Unasyn sisaldab sahharoosi**

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, pidage enne Unasyni võtmist nõu oma arstiga.

## **3. Kuidas Unasyni võtta**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lastele kehakaaluga alla 30 kg on tavaliseks annuseks 25...50 mg ööpäevas kehakaalu kg kohta, jagatuna kaheks annuseks.

Täiskasvanutele, eakatele ja lastele kehakaaluga üle 30 kg on tavaline annus 375 mg kolm korda ööpäevas kuni 750 mg kaks korda ööpäevas.

Kõige parem on võtta seda ravimit iga päev samadel kellaaegadel.

Tehke läbi arsti poolt määratud ravikuur. Kui katkestate ravikuuri enneaegselt, võib põletik taas tekkida.

Enne iga manustamist loksutada.

Suspensiooni valmistamine:

1. Raputage pudelit.
2. Lisage pulbrile jahedat keedetud vett kuni pudelil oleva punase jooneni.

3. Loksutage korralikult kuni kogu pulber on segunenud. Pärast vee lisamist pudelil oleva märgini moodustub suspensioon, mis sisaldab ühes milliliitris 50 mg sultamitsilliini.
4. Annustamiseks kasutage kaasasolevat mõõtelusikat.
5. Valmissuspensiooni säilitage külmkapis kuni 14 päeva, enne iga manustamiskorda loksutage pudelit.

Kui teil on tunne, et Unasyni toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### **Kui te võtate Unasyni rohkem kui ette nähtud**

Üleannustamise korral pöörduge kohe arsti poole.

#### **Kui te unustate Unasyni võtta**

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Vahelejäänud annus tuleb võtta esimesel võimalusel. Järgmine annus tuleb võtta ettenähtud ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on tavaliselt hästi talutavad. Kõrvaltoimetena on täheldatud: kõhulahtisust, iiveldust, kõhuvalu, seedehäired, nahalöövet, nõgestõbe, nahareaktsioone, väsimust, unisust, peavalu, pearinglust, oksendamist, peensoole-jämesoolepõletikku, kandidiaasi, haigustekitaja resistentsust, aneemiat, vere hüübivusaja pikenemist, allergilisi reaktsioone (anafülaktiline šokk), nahaturset, isutust, toksilisust närvikoele, allergilist veresoonepõletikku, õhupuudustunnet, veriroed, suukuivust, ülakõhuvalu, maitsehäiret, kõhupuhitust, verejooksuga peensoole-jämesoolepõletikku, liigesevalu, neerupõletikku ja limaskesta põletikku, maksafunktsiooni häireid, kollatõve, sapipaisu või maksapõletikuga sapipaisu.

Antibiootikumide kasutamine võib vahel häirida organismis olevate mikroorganismide tasakaalu. See võib kaasa tuua niisuguste organismide vohamise, mis on antud antibiootikumi suhtes immuunsed, kaasa arvatud seennakkuse tekke (kandidiaas), mis võib põhjustada neelamisraskusi, keele või suu haavandeid või valu, välissuguelundite piirkonna sügelust või haavandeid.

Kui teil tekivad ülitundlikkuse- e allergianähud, näiteks ootamatu hingeldus, hingamisraskused või pigistustunne rinnus, silmalaugude, näo või huulte turse, punased laigud nahal või sügelemine üle kogu keha, võtke viivitamatult ühendust arstiga.

#### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.raviamet.ee](http://www.raviamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

### **5. Kuidas Unasyni säilitada**

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Valmissuspensiooni hoida külmkapis (2 °C...8 °C) ja kasutada ära 14 päeva jooksul.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Pakendi sisu ja muu teave**

### **Mida Unasyn sisaldab**

- Toimeaine on sultamitsilliin. Pudelis on 1,5 g sultamitsilliini, ühes milliliitris valmissuspensioonis on 50 mg sultamitsilliini.
- Teised koostisained on kolloidne ränidioksiid, veevaba dinaatriumvesinikfosfaat, veevaba naatriumdivesinikfosfaat, sahharoos ja kirsiaroom.

### **Kuidas Unasyn välja näeb ja pakendi sisu**

Valge kuni valkjaskirsilõhnaline suukaudse suspensiooni pulber plastikpudelis.

Suspensiooni manustamise hõlbustamiseks on pakendis spetsiaalne kahe otsaga mõõtelusikas.

### **Müügiloa hoidja ja tootja**

#### Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG  
Sandwich, Kent CT13 9NJ  
Ühendkuningriik

#### Tootja

Pfizer Italia S.r.l.  
Strada Statale 156 Km.50  
04010 Borgo San Michele -Latina  
Speed No.222-2208  
Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal  
Pirita tee 20  
10127 Tallinn  
Tel 6 405 328  
Faks 6 405 327

**Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2014.**