

## PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

### PANTHENOL SPRAY 4,63% nahavaht Dekspantenool

#### **Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Panthenol Spray'd täpselt juhistelevastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui Teie kaebused süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

#### **Infolehes antakse ülevaade:**

1. Mis ravim on Panthenol Spray ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Panthenol Spray kasutamist
3. Kuidas Panthenol Spray'd kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Panthenol Spray'd säilitada
6. Lisainfo

### **1. MIS RAVIM ON PANTHENOL SPRAY JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE**

Panthenol Spray'd kasutatakse toetava ja paranemist soodustava vahendina naha kergete kahjustuste korral.

### **2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PANTHENOLSPRAY KASUTAMIST**

#### **Ärge kasutage Panthenol Spray'd:**

-kui te olete allergiline (ülitundlik) dekspantenooli või Panthenol Spray mõne koostisosa suhtes.

-Panthenol Spray'd ei tohi pihustada silma.

#### **Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Panthenol Spray:**

-kui te olete astmahaige ja/või kannatate bronhopulmonaalsete haiguste (bronhide ja/või kopsude haiguste) all, ei tohi te Panthenol Spray pihustamisel väljuvat gaasi sisse hingata, kuna see võib põhjustada limaskestade ärritust või astmahoogu.

-Panthenol Spray kasutamisel puuduvad vanuselised piirangud, kuid lastel tohib seda toodet kasutada üksnes täiskasvanu järelevalve all.

-ärge pihustage Panthenol Spray'd silmadesse, suhu või ninna!

Aerosooli konteiner sisaldab rõhu all olevat gaasi. Kaitske otsese päikesekiirguse ja üle 50 °C temperatuuri eest!

Ka pärast toote kasutamise lõpetamist ei tohi konteinerit jõuga avada ega põletada.

Hävitada tohib vaid pärast konteineri täielikku tühjenemist. Mitte pihustada tulle ega hõõguvatele esemetele.

Hoida eemal kergesti süttivatest esemetest. Mitte suitsetada ravimi läheduses.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

„Leegi sümbol” (F+) *Euroopa Liidu sümbol väga tuleohtlike(F+) ainete jaoks*  
Vastavusmärk - TRG 300 (tehnilised reeglid rõhu all olevate gaaside kohta).

### **Kasutamine koos teiste ravimitega**

Ettenähtud kasutamisel ei ole Panthenol Spray’l koostoimeid teiste ravimitega täheldatud.

Kondoomide ja Panthenol Spray samaaegsel kasutamisel genitaal- ja anaalpiirkonnas võib preparaadis sisalduva parafiini tõttu väheneda kondoomi vastupidavus, mis võib põhjustada kondoomi kergema rebenemise ja turvalisuse languse.

### **Rasedus ja imetamine**

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Seoses sellega, et puuduvad teaduslikud andmed selle kohta, kui suur osa naha peale kantud dekspantenoolist läheb süsteemsesse vereringesse, tohib Panthenol Spray’d kasutada suurtel nahapiirkondadel raseduse ja rinnaga toitmise ajal üksnes arstliku järelevalve all ja ainult juhul, kui ravist oodatav võimalik kasu ületab oluliselt võimalikku riski.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Pole asjakohane.

### **Oluline teave mõningate Panthenol Spray koostisainete suhtes**

Ravimi koostises olev tsetostearüülalkohol võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).

## **3. KUIDAS PANTHENOL-SPRAY’D KASUTADA**

Kasutage Panthenol Spray’d alati vastavalt siin infolehes antud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui ei ole teisiti öeldud, pihustage Panthenol Spray’d üks või mitu korda päevas ühtlaselt kahjustatud piirkonnale.

#### *Manustamisviis*

Näopiirkonnas kasutamiseks ei tohi Panthenol Spray’d otse kahjustatud piirkonnale pihustada, vaid vaht tuleb esmalt pihustada käele ja siis kanda vastavale kahjustatud näopiirkonnale.

Mitte pihustada silmadesse. Mitte pihustada suhu ja ninna.

Pihustamisel hoida konteiner vertikaalselt pihustiga ülespoole.

Selleks, et saadav vaht oleks sobivate omadustega, tuleb enne iga kasutamist konteinerit hästi loksutada, eriti pärast pikemaajalist mittetarvitamist. Esmakordsel kasutamisel võib juhtuda, et enne normaalsete omadustega vahu ilmumist tuleb pudelist välja ainult gaas.

#### *Ravikuuri pikkus*

Panthenol Spray’ga ravi kestvuse osas ei ole piiranguid. See sõltub kahjustatud piirkonna iseloomust ja selle paranemisprotsessi kulust.

### **Kui te kasutate Panthenol Spray’d rohkem kui ette nähtud**

Panthenol Spray ettenähtud kasutamisel on üleannustamine vähetõenäoline. Kui suur kogus Panthenol Spray'd siiski juhuslikult satub suhu, ei ole vaja karta mingeid ohtlikke tagajärgi.

#### **Kui te lõpetate Panthenol Spray kasutamise**

Ravimi kasutamise katkestamine võib ohustada ravi efektiivsust. Palun toimige nii, nagu on kirjeldatud lõigus – Kuidas Panthenol Spray'd kasutada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### **4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu kõik ravimid, võib ka Panthenol Spray põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva (vähem kui ühel ravitud patsiendil 10,000-st, kaasa arvatud üksikjuhtumid) võivad esineda ülitundlikkusreaktsioonid, nt kontaktallergia.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

#### **5. KUIDAS PANTHENOL SPRAY'D SÄILITADA**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Panthenol Spray'd pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud aerosoolballoonil ja välispakendi peal. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

##### *Säilitamistingimused:*

Hoida temperatuuril kuni 25° C.

Vaata lõiku – Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Panthenol Spray

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. LISAINFO**

### **Mida Panthenol Spray sisaldab**

- Toimeaine on dekspantenool. 100 g nahavahtu sisaldab 4.63 g dekspantenooli
- Abiained on: (2-etiülheksüül)alkanoaat(C<sub>10</sub>-C<sub>16</sub>) (kerge vedel vaha); emulgeeriv tsetostearüülalkohol; kerge vedel parafiin; äädikhape; peroksüädikhape; vesinikperoksiid; puhastatud vesi; propellendid (propaan, butaan ja isobutaan).

### **Kuidas Panthenol Spray välja näeb ja pakendi sisu**

Rõhukonteiner vahuga (emulsioon koos propellendiga).  
130 g

### **Müügiloa hoidja ja tootja**

Chauvin ankerpharm GmbH  
Brunsbütteler Damm 165-173,  
13581 Berlin  
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:  
PharmaSwiss Eesti OÜ  
Tammsaare tee 47  
11316 Tallinn  
Tel: 6827 400

**Infoleht on viimati koostöölstatud aprillis 2014**