

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

GYNO-PEVARYL, 50 mg vaginaalsuposiidid GYNO-PEVARYL, 150 mg vaginaalsuposiidid Ekonasoolnitraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on GYNO-PEVARYL ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne GYNO-PEVARYL'i kasutamist
3. Kuidas GYNO-PEVARYL'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas GYNO-PEVARYL'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON GYNO-PEVARYL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

GYNO-PEVARYL'i kasutatakse ekonasooli suhtes tundlike seente poolt põhjustatud tupeseenhaiguste raviks.

GYNO-PEVARYL'i küünlad on tupesiseseks manustamiseks.

Ravimi toimeaineks on 1%-line ekonasool, mis on laia toimespektriga seentevastane ravim.

Kasutamisalala hõlmab kõiki tähtsamaid inimesele patogeenseid seeni, sh kandidoosi tekitajaid (*Candida albicans* jt alaliigid). Segainfektsioonide korral on täiendavaks eeliseks ekonasooli antibakteriaalne toime.

Ekonasool pärsib seente rakuseina sünteesi ja seente paljunemist. Preparaat on väga tõhus ning kõrvaldab lühikese aja jooksul kõik infektsioonisümptomid, nt kõrvetus- ja sügelustunde. Tupese esinevad patogeensed seened hävitatakse enamasti 3 päevaga. Resistentsust (haigustekitajate tundetuks muutumist ravimile) ekonasooli suhtes esineb väga harva.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE GYNO-PEVARYL'I KASUTAMIST

Ärge kasutage GYNO-PEVARYL'i

- kui te olete allergiline (ülitundlik) ekonasooli või GYNO-PEVARYL'i mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga GYNO-PEVARYL

Ravimküünla manustamise järgselt peske hoolikalt käed. Ravim ei tohi sattuda silma.

Samaaegset GYNO-PEVARYL'i ning tupesisese diafragma või kondoomi kasutamist tuleb vältida, kuna ravimküünal võib kahjustada diafragma pinda või vähendada kondoomide vastupidavust. Väheneda võib ka GYNO-PEVARYL'i ravitoime. Kui samaaegselt kasutatakse ka spermiitsiidseid kontratseptiive, võib nende toime väheneda. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

GYNO-PEVARYL'i kasutamisel pole kirjeldatud olulisi koostoimeid teiste ravimitega.

Siiski teatage kindlasti arstile, milliseid teisi ravimeid te veel samaaegselt kasutate.

Rääkige oma arstile, kui te kasutate suukaudseid verd vedeldavaid ravimeid (nt varfariini või atsenokumarooli). Samaaegsel kasutamisel koos GYNO-PEVARYL'iga tuleb nende ravimite toimet veel hoolikamalt jälgida.

Alkoholi pole üldse soovitatav ravimitega samaaegselt kasutada.

Rasedus ja imetamine

Ekonasooli paikse kasutamise järgselt on ravimi imendumine organismi äärmiselt väike. Kuigi tupesisene ekonasooli kasutamine raseduse ajal ei ole põhjustanud ebasoodsat toimet lootele, on siiski raseduse esimesel trimestril soovitatav GYNO-PEVARYL'i kasutada ainult juhtudel, kui arst peab seda tingimata vajalikuks. Raseduse teisel ja kolmandal trimestril tohib GYNO-PEVARYL'i kasutada juhul kui arsti hinnangul ületab ravist oodatav kasu võimaliku ohu lootele.

Kui olete rase või on teil kavas rasestuda, pidage nõu arstiga.

3. KUIDAS GYNO-PEVARYL'I KASUTADA*GYNO-PEVARYL 50 mg vaginaalsuposiidid*

Küünal viiakse sügavale tuppe (soovitatavalt lamavas asendis) järjestikustel öhtutel, soovitatavalt vähemalt 14 päeva järjest. Erilist tähelepanu tuleks pöörata sellele, et ravim paigutataks nii sügavale tuppe kui võimalik.

GYNO-PEVARYL 150 mg vaginaalsuposiidid

Küünal viiakse sügavale tuppe (soovitatavalt lamavas asendis) järjestikustel öhtutel, soovitatavalt 3 päeva järjest. Erilist tähelepanu tuleks pöörata sellele, et ravim paigutataks nii sügavale tuppe kui võimalik. GYNO-PEVARYL 150 mg tupeküünlaid ei soovitata kasutada alla 16-aastastel lastel toimeaine suure sisalduse tõttu.

Väliste suguelundite raviks soovatakse lisaks kasutada seennakkuse vastast kreemi, mis on ette nähtud kasutamiseks häbeme piirkonnas ja ka teie partneri raviks.

Ravi tuleb jätkata ka siis, kui subjektiivsed sümptomid (sügelus, voolus) on taandunud, vastasel korral võivad haigusnähted taastekkida.

Iga päev on soovitatav vahetada aluspesu ja käterätte. GYNO-PEVARYL ei määri pesu.

Enne kasutamist hoidke küünlaid 30 minutit külmkapis.

Hoiatused ravimi kasutamisel

Ravi käigus tekkivad tugevad paiksed ärritusnähtud viitavad ülitundlikkusele ravimi suhtes. Siis tuleb ravi GYNO-PEVARYL'iga katkestada.

Haiguse taastekke vältimiseks tuleb ravida ka välissuguelundite piirkonda ja partnerit.

Ravimi pikemaajalise kasutamise korral on võimalik resistentsete (ravimile tundetute) seente ja bakterite vohamine. Sel juhul tuleb ravi GYNO-PEVARYL'iga katkestada ja teie arst soovib mõne teise ravimi kasutamist.

GYNO-PEVARYL'i kasutamise kestus*GYNO-PEVARYL 50 mg vaginaalsuposiidid*

Tupes esinevad patogeensed seened hävitatakse tupesiseselt enamasti 3 päevaga, täieliku tervistumise saavutamiseks on enamasti ravimit vaja kasutada kauem, seetõttu jätkake ravi vähemalt 2 nädala vältel.

GYNO-PEVARYL 150 mg vaginaalsuposiidid

Tupes esinevad patogeensed seened hävitatakse tupesiseselt enamasti 3 päevaga, täieliku tervistumise saavutamiseks on enamasti ravimit vaja kasutada kauem.

Kui palju ja kui kaua peate teie ravimit kasutama, sõltub seennakkuse ulatusest. Arst selgitab seda teile täpsemalt.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka GYNO-PEVARYL põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedused on defineeritud järgmise konventsiooni alusel:

- sage: esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st
- aeg-ajalt: esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000-st
- harv: esineb 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st
- teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Sagedased kõrvaltoimed

- Sügelus
- Põletustunne nahal.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

- Lööve
- Põletustunne tupes või selle ümbruses.

Harva esinevad kõrvaltoimed

- Naha punetus.

Teadmata

- Ülitundlikkusreaktsioonid
- Näo või kurgu äkki tekkiv paistetus
- Nõgestõbi
- Kontaktdermatiit
- Manustamiskoha reaktsioonid, nt valu, ärritus või turse.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5. KUIDAS GYNO-PEVARYL'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage GYNO-PEVARYL'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida GYNO-PEVARYL sisaldab

- Toimeaine on ekonasool. Üks vaginaalsuposiit sisaldab 50 mg või 150 mg ekonasoolnitraati.
- Abiaine on searask.

Kuidas GYNO-PEVARYL välja näeb ja pakendi sisu

GYNO-PEVARYL vaginaalsuposiidid on valged kuni valkjad torpeedokujulised vaginaalsuposiidid, mis on saadaval PE/PVC blisterribades.

GYNO-PEVARYL, 50 mg vaginaalsuposiidid: üks karp sisaldab 15 vaginaalsuposiiti.

GYNO-PEVARYL, 150 mg vaginaalsuposiidid: üks karp sisaldab 3 vaginaalsuposiiti.

Müügiloa hoidja

UAB „Johnson & Johnson“
Geležinio Vilko g. 18A
LT-08104 Vilnius
Leedu

Tootja

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filiaal
Lõõtsa 2
Tallinn 11415
Tel: +372 617 7410

Infoleht on viimati koostöölstatud mais 2012