

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Imigran, 20 mg ninasprei, lahus
Sumatriptaan

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi juhul, kui haigusnähud on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Imigran ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Imigran'i kasutamist
3. Kuidas Imigran'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Imigran'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Imigran ja milleks seda kasutatakse

Imigran on valuvaigisti, mis kuulub migreenivastaste ravimite hulka. Imigran'i toimeaine on sumatriptaan, mis on serotoniini (5-HT₁) retseptori agonist.

Migreenihood tekivad veresoonte laienemise tulemusena. Sumatriptaan on ravim, mis ahendab veresooni, seega leevendab migreeni peavalusid.

Imigran'i kasutatakse auraga või aurata migreeni raviks. Aura on hoiatav tajuhäire, milleks on tavaliselt nägemishäired, nagu valgussähvatused, sikksakiline, tähekeste nägemine või lainetavad jooned.

Ravimit on soovitatav manustada migreenihoo ilmnemisel võimalikult varakult, kuid ravim on võrdselt toimiv ka manustatuna hoo igas staadiumis.

Imigrani ei tohi kasutada migreeni ennetamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Imigran'i kasutamist

Ärge kasutage Imigran'i:

- kui te olete sumatriptaani või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) Imigran'i suhtes allergiline;
- kui te olete kunagi põdenud südamelihase infarkti;
- kui teil on kõrge vererõhk;
- kui teil esineb ootamatut õhupuudust või valu või pigistustunnet rinnus (mis võib, kuid ei pruugi kiirguda lõualuusse või õlavarde);
- kui te olete või teile on öeldud, et te olete põdenud insulti;
- kui teil on Raynaud' tõbi, perifeersetes veresoontes haigus (valu jalgade tagaküljel) või külmad, surisevad või tuimad käed ja jalad;
- kui te põete mõnda rasket neeru- või maksahaigust;
- kui te kasutate migreeni raviks ergotamiini või dihidroergotamiini sisaldavaid ravimeid, neid ravimeid ei tohi kasutada koos Imigran'iga;
- kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud depressiooniravimeid, mis kuuluvad monoamiinioksüdaasi (MAO) inhibiitorite hulka.

Kui te arvate, et teil on mõni nimetatud seisund või kui te ei ole kindel, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Imigran'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui te olete rase või planeerite rasedust;
- kui te toidate last rinnaga. Ärge toitke last rinnaga 12 tundi pärast Imigran'i kasutamist;
- kui käesolev migreenihoog erineb teil tavaliselt esinevatest migreenihoogetest;
- kui te kasutate teisi migreeniravimeid;
- kui te kasutate antidepressante, mis kuuluvad selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) või serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorite (SNRI) gruppi;
- kui te olete allergiline sulfoonamiid-antibiootikumide suhtes. Kui te olete allergiline mõne antibiootikumi suhtes, kuid ei ole kindel, kas see kuulub sellesse gruppi, siis pidage nõu oma arsti või apteekriga;
- kui teil on isheemiline koliit (teatud jämesoolepõletik);
- kui teile on öeldud, et teil võib olla suurenenud risk haigestuda südamehaigusesse. Riskigruppi kuuluvaks võidakse teid lugeda siis, kui olete üle 40 aasta vanune mees, menopausi läbinud naine, kui teil on suhkurtõbi, vere kõrge kolesteroolitase, kui te olete ülekaaluline või suitsetate. Samuti juhul, kui teie veresugulased on südamehaigusi põdenud.
- kui te põete mõnda maksa- või neeruhaigust;
- kui teil on iga päev krooniline peavalu. Sumatriptaani liiga sagedane võtmine võib põhjustada kroonilise peavalu. Sellisel juhul pöörduge arsti poole, sest võib-olla peate Imigran'i võtmise lõpetama.
- kui teil on kunagi esinenud krampe või kas teile on öeldud, et teil on eelsoodumus krampide tekkeks;
- kui te olete alla 18 või üle 65 aasta vanune.

Ravimi liiga sagedane kasutamine võib põhjustada peavalude tugevnemise. Sellisel juhul võib arst paluda teil ravi lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Ravi ajal Imigran'iga ärge juhtige autot ning hoiduge masinate või mehhanismide käsitlemisest, sest Imigran või migreenihoog võib põhjustada unisust.

Muud ravimid ja Imigran

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Sumatriptaani ohutu kasutamise kohta raseduse ajal on vähe andmeid. Praegused andmed ei viita kaasasündinud väärarengute riski tõusule. Soovitav on sumatriptaani raseduse ajal mitte kasutada, kui arst ei ole teisiti määranud.

Imetamine

Enne ravimi kasutamist imetamise ajal pidage nõu arsti või apteekriga.

Sumatriptaan eritub rinnapiima. Ohtu lapsele saab miinimumini viia, vältides rinnaga toitmist 12 tunni jooksul pärast sumatriptaani võtmist.

3. Kuidas Imigran'i kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Ergotamiini või dihidroergotamiini sisaldavaid ravimeid ei tohi kasutada 6 tundi pärast Imigran'i kasutamist ning Imigran'i ei tohi kasutada vähemalt 24 tunni jooksul pärast ergotamiini või dihidroergotamiini sisaldavate ravimite kasutamist.

Ninasprei:

Imigran ninaspreid tohib kasutada vaid ninasiseseks manustamiseks (pihustamiseks).

Ninasprei juhuslikul silma sattumisel tuleb loputada rohke veega. Ärritusnähtude ilmnemisel konsulteerida arstiga.

See ravim ei sobi lastele (alla 12-aastastele) ja eakatele patsientidele (üle 65 eluaasta).

Imigran ninasprei soovitatav annus on 20 mg, mis manustatakse ühte ninasõõrmesse.

Ravimit on soovitatav manustada migreenihoo ilmnemisel võimalikult varakult, kuid ravim on võrdselt toimiv ka manustatuna hoo igas staadiumis. Toime avaldub 15 minuti jooksul pärast ninasprei kasutamist.

Kui migreenihoog küll möödub, aga sümptomid taasilmnevad, võib manustada teise annuse.

Teist annust ei tohi manustada enne kahe tunni möödumist esimesest annusest. 24 tunni jooksul ei tohi manustada üle kahe annuse.

Kui esimene annus ei toiminud, ärge rohkem Imigran'i manustage. Võite võtta oma tavalist peavaluravimit eeldusel, et see ei sisalda ergotamiini ega dihidroergotamiini.

Kuidas ninaspreid kasutada

Ninasprei koosneb kolmest osast:

Pihusti: see on osa, mille viite oma ninasõõrmesse. Ravim väljub pisikesest avast pihusti otsas.

Haarats: see on osa, millest hoiate kinni ninasprei kasutamisel.

Sinine kolb: kolvile vajutamisel väljub kogu annus korraga ninasõõrmesse. Seda saab kasutada ainult ühekordselt. Seega ärge vajutage kolvile enne, kui olete pihusti ninasõõrmesse viinud sest vastasel korral läheb annus kaduma.

Enne ninasprei kasutamist võtke endale mugav asend, soovi korral võite istuda. Nuusake nina, kui see tundub kinni olevat või kui teil on nohu.

Avage blisterpakend ja võtke välja ninasprei. Hoidke seda ettevaatlikult sõrmede ja pöidla vahel. Ärge vajutage sinisele kolvile enne, kui olete valmis.

Sulgege üks ninasõõre, surudes sõrmega vastavale ninapoollele ja hingake rahulikult läbi suu välja.

Viige pihusti teise ninasõõrmesse (umbes 1 cm ulatuses).

Sulgege suu ja hingake rahulikult läbi nina sisse, vajutades samal ajal pöidlaga sinisele kolvile. Kolb võib tunduda veidi jäik ja te võite kuulda klõpsatust.

Hingake 10...20 sekundi vältel rahulikult läbi nina sisse ja läbi suu välja. See aitab ravimil ninas püsida. Samal ajal võite pihusti ninast ja sõrme teiselt ninapoolelt ära võtta.

Pärast ninasprei kasutamist võib nina tunduda pisut vesine ja te võite tunda suus kerget maitset – see on normaalne ja möödub peagi.

Kui teil on tunne, et Imigran'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Imigran'i rohkem kui ette nähtud:

Ärge ületage soovitatud annust. Kui te peaksite kogemata ületama maksimaalse päevase annuse, pöörduge otsekohe oma arsti või apteekri poole. Võtke ravimi pakend endaga kaasa.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned inimesed võivad olla ravimite suhtes allergilised. Kui teil tekib varsti pärast Imigran'i kasutamist mõni järgnevalt loetletud sümptomitest, siis ÄRGE rohkem manustage ning pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Järsku tekkiv hingamisraskus või pigistustunne rindkeres.

Silmalaugude, näo või huulte turse.

Krambid.

Nahalööve või „nõgeslööve“ üle kogu keha.

Alakõhuvalu ja/või tugev verejooks pärasoolest.

Kui teil tekivad mistahes muud sümptomid, mida te ei mõista, teavitage oma arsti või apteekrit.

Muudeks sümptomiteks võivad olla:

Tundlikkuse häired sh tundlikkuse langus, surisemistunne, kuuma- ja külmatunne.

Valu, raskus- või survetunne mistahes kehaosas, sealhulgas rindkeres ja kurgus.

Need nähud võivad olla tugevalt väljendunud, kuid üldjuhul mööduvad kiiresti. Pöörduge otsekohe oma arsti poole, kui sümptomid püsivad või süvenevad, kuna tegemist võib olla südamelihaseinfarktiga. Ärge kasutage Imigran'i enne, kui olete nõu pidanud oma arstiga.

Teil võivad ilmneda ka järgmised kõrvaltoimed:

väsimus või unisus,

pearinglus,

ebatavaliselt aeglane või kiire südametegevus või südame rütmihäired ja/või

südamekloppimine,

hingamisraskused,

nõrkustunne,

iiveldus või oksendamine,

lühiajaline näoõhetus,

nägemishäired,

sõrmede ja varvaste värvuse muutus.

Ninasprei kasutamisel võivad tekkida kerge ärritus- või põletustunne neelus, ninaverejooks ning ebameeldiv maitse suhu.

Nende sümptomite tõttu ei ole vaja ravimi kasutamist lõpetada, kuid teavitage neist arsti järgmisel visiidil. Ent kui teil esineb käte või jalgade värvuse püsiv muutus (punakaslilla), lõpetage ravimi kasutamine ja pidage otsekohe nõu oma arstiga.

Kui teilt võetakse vereproov maksatalitluse hindamiseks ja te olete kasutanud Imigran'i, siis teavitage sellest arsti, kuna ravim võib mõjutada tulemusi.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Imigran'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil (kuupäev PP.KK.AAAA). Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ninasprei:

Hoida temperatuuril kuni 30 °C, valguse eest kaitstult. Ninaspreid on soovitatav hoida pakendis.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Imigran sisaldab:

- Toimeaine on sumatriptaan. Ninasprei on ettenähtud ühekordseks kasutamiseks, 1 annus sisaldab 20 mg sumatriptaani. Lahusel on iseloomulik maitse.
- Abiained:

kaaliumdivesinikfosfaat, veevaba kahealuseline naatriumfosfaat, väävelhape, naatriumhüdroksiid, puhastatud vesi.

Kuidas Imigran välja näeb ja pakendi sisu

Imigran ninasprei, lahus (20 mg/annuses) on ettenähtud ühekordseks kasutamiseks ja sisaldab ühte annust.

Helekollane kuni tumekollane lahus.

Müügiloo hoidja ja tootja

Imigran ninasprei müügiloo hoidja:

Glaxo Wellcome UK Limited trading as GlaxoWellcome Operations,
980 Great West Road
Brentford,
Middlesex TW8 9GS,
Ühendkuningriik

Imigran ninasprei partii vabastamise eest vastutavad tootjad:

Glaxo Wellcome S.p.A., Strada Asolana 68, S.Polo di Torrile, 43056 Parma, Itaalia või
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka 189, Poznan, Poola.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloo hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloo hoidja esindaja Eestis:

GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.
Telefon: +372 6676 900

Infoleht on viimati koostöölstatud jaanuaris 2015