

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Neuromultivit, 100 mg/200 mg/0,2 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vitamiin B₁

Vitamiin B₆

Vitamiin B₁₂

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma Neuromultivit'i täpselt juhiste vastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Neuromultivit ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Neuromultivit'i võtmist
3. Kuidas Neuromultivit'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Neuromultivit'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON NEUROMULTIVIT JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Vitamiin B₁(tiamiinvesinikkloriid) toetab süsivesikute ainevahetust ja närvisüsteemi funktsioone.

Vitamiin B₆(püridoksiinvesinikkloriid) osaleb aminohapete ainevahetuses närvikoos ja mõjutab mitmete teadaolevate mediaatorite, nt dopamiini, adrenaliini ja noradrenaliini biosüteesi.

Vitamiin B₁₂ (tsüanokobalamiin) osaleb rasvhapete ainevahetuses närvikoos ja hädavajalik rakkude kasvuks ning paljunemiseks.

Neuromultivit'i kasutatakse vitamiinide B₁, B₆ ja B₁₂ vaeguse raviks ja vältimiseks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE NEUROMULTIVIT'I KASUTAMIST

Ärge võtke Neuromultivit'i

- kui te olete ülitundlik (allergiline) toimeainete või Neuromultivit'i mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Neuromultivit

- kui te võtate rohkem kui 3 tabletti päevas rohkem kui 4 nädala jooksul, kuna võivad tekkida närvisüsteemi kõrvaltoimed. Pidage nõu oma arstiga edasise ravi suhtes.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Samaaegsel manustamisel võib vitamiin B₆ vähendada L-dopa (Parkinsoni tõve või hüpertensiooni raviks kasutatavad ravimid) efektiivsust.

Neuromultivit'i võtmine koos toidu ja joogiga

Toit suurendab vitamiin B₁ imendumist seedetraktist. Seetõttu tuleb tabletid võtta koos vähese koguse vedelikuga pärast sööki. Toidu ja joogi muid toimeid Neuromultivit'le ei ole teada.

Rasedus ja imetamine

Ravimeid, mis sisaldavad B vitamiine, ei tohi raseduse või imetamise ajal võtta. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Neuromultivit ei oma toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

3. KUIDAS NEUROMULTIVIT'I KASUTADA

Võtke Neuromultivit'i alati täpselt nii nagu on kirjas selles infolehes või nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Tabletid tuleb alla neelata tervelt koos vähese koguse vedelikuga pärast sööki.

Tavaline ööpäevane annus täiskasvanutele ja üle 15 aasta vanustele noorukitele on 1 tablett 1 kord ööpäevas.

Suurte annuste kasutamine pikemalt kui 4 nädala vältel pole soovitatav, kuna võivad avalduda neuroloogilised sümptomid.

Kui te võtate Neuromultivit'i rohkem kui ette nähtud

Neuromultivit'iga üleannustamise korral võtke ühendust arstiga.

Kui te unustate Neuromultivit'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Neuromultivit põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Võivad tekkida järgnevad kõrvaltoimed:

Harv (1...10 inimesel 10000-st)

Närvisüsteem: peavalu, peapööritus

Seedetrakt: iiveldus

Väga harv (vähem kui 1 inimesel 10000-st)

Immuunsüsteem: ülitundlikkusreaktsioonid, peamiselt nahal (lööve, ekseem).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsisemaks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS NEUROMULTIVIT'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitada temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Neuromultivit'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Neuromultivit sisaldab

- Toimeained on: tiamiinvesinikkloriid (Vitamiin B₁), püridoksiinvesinikkloriid (Vitamiin B₆), tsüanokobalamiin (Vitamiin B₁₂).

- Abiained on: mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat, povidoon, makrogool 6000, titaandioksiid, talk, hüpromelloos, polüakrülaadi dispersioon 30% (sisaldab nonoksünool 100).

Kuidas Neuromultivit välja näeb ja pakendi sisu

Valged või hallikasvalged, ümarad, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid. PVC/PE/PVdC-alumiinium pakendis 20 või 100 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

A-8502 Lannach

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Covalent OÜ

Pärnu mnt 102c

Tallinn 11312

tel: +3726600945

fax: +3726600946

Infoleht on viimati koostöölstatud: juunis 2011.