

PAKENDI INFOLEHT - INFORMATSIOON KASUTAJALE

Trachitol, 1 mg/1,8 mg losengid
Lidokaiinvesinikkloriid / propüülparahüdroksübensoaat

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on Teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Trachitol'i juhiste vastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui pärast 3 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on **Trachitol** ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne **Trachitol**'i kasutamist
3. Kuidas **Trachitol**'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas **Trachitol**'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON TRACHITOL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Trachitol on valuvaigistava ja antiseptilise toimega ravim, mida kasutatakse suuõõne ja neelupõletike korral.

Trachitol'i losengid (imemistabletid) sisaldavad lidokaiinvesinikkloriidi, mis kuulub lokaalanesteetikumide hulka. Ta toimib tuimestavalt ja vähendab valutundlikkust kurgus.

Propüülparahüdroksübensoaat on antiseptiliste omadustega aine.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE TRACHITOL'I KASUTAMIST

Ärge kasutage Trachitol'i

- kui Te olete allergiline (ülitundlik) lidokaiinvesinikkloriidi, propüülparahüdroksübensoadi või Trachitol'i mõne koostisosa suhtes.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui Te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja rinnaga toitmine

Enne kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Puudub piisav informatsioon Trachitol'i kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui Trachitol'i kasutatakse vastavalt juhistele, ei avalda ta mingit toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

Oluline teave mõningate Trachitol'i koostisainete suhtes

Kui arst on Teile öelnud, et Te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS TRACHITOL'I KASUTADA

Kasutage Trachitol'i alati vastavalt infolehes toodud juhistele. Kui Te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Laske losengil aeglaselt suus sulada. Soovitatavaks annuseks 1 loseng iga 2 tunni järel. Ärge võtke rohkem, kui 8 losengi päevas.

Lastele ei soovitata manustada üle 6 losengi päevas.

Kui Te kasutate Trachitol'i rohkem, kui on ette nähtud

Kui te kasutate ettenähtust rohkem losenge, võivad Teil tekkida järgmised sümptomid: haigutamine, rahutus, peapööritus, iiveldus, oksendamine või kuulmishäired.

Võtke kohe ühendust oma arstiga, kuna antud juhul võib tekkida vajadus täiendavaks raviks. Palun võtke ka käesolev infoleht endaga kaasa.

Kui Te unustate Trachitol'i kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui loseng jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Trachitol põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõnedel harvadel juhtudel (vähem, kui ühel 1000-st, kuid rohkem, kui ühel 10 000-st patsiendist) võivad tekkida allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus). See tähendab, et ühel kuni kümnel patsiendil kümnest tuhandest võivad tekkida ülitundlikkuse reaktsioonid.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui Te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS TRACHITOL'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Trachitol'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Trachitol sisaldab

- Toimeained on lidokaiinvesinikkloriid ja propüülparahüdroksübensoaat. Üks loseng (imemistablett) sisaldab 1 mg lidokaiinvesinikkloriidi (monohüdraadina) ja 1,8 mg propüülparahüdroksübensoati.
- Abiained on magneesiumstearaat, alumiiniumkaaliumsulfaat, piparmündiõli ja sorbitool (E420).

Kuidas Trachitol välja näeb ja pakendi sisu:

Trachitol on valge, ümar, lame, kaldservadega loseng (imemistablett).

Pakendi suurus: 20 losengi. Iga Alumiinium/PVC blister sisaldab 10 losengi.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG.
Herzbergstr. 3
61138 Niederdorfelden
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Eesti

Sirowa Tallinn AS
Salve 2c,
11612 Tallinn
Telefon: +372 6 830 700

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2010