PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Potassium Chloride Braun 7,45 %, infusioonilahuse kontsentraat
Kaaliumkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Potassium Chloride Braun 7,45 % infusioonilahuse kontsentraat ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Potassium Chloride Braun 7,45 % infusioonilahuse kontsentraadi kasutamist
3. Kuidas Potassium Chloride Braun 7,45 % infusioonilahuse kontsentraati kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5 Kuidas Potassium Chloride Braun 7,45 % infusioonilahuse kontsentraati säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON Potassium Chloride Braun 7,45 %, infusioonilahuse kontsentraat JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Potassium Chloride 7,45 % infusioonilahuse kontsentraat on kaaliumkloriidi kontsentreeritud lahus. Seda kasutatakse varustamaks teie organismi kaaliumiga, kui teil esineb selle mineraali puudujääk. See on eriti tõhus juhul, kui teie kaaliumidefitsiidiga kaasneb ülemäärane alkaloos või vere ebanormaalselt madal kloriidisisaldus.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE Potassium Chloride Braun 7,45 % infusioonilahuse kontsentraadi KASUTAMIST

Ärge kasutage Potassium Chloride Braun 7,45 % infusioonilahuse kontsentraati:
- kui teil on vere ebatavaliselt kõrge kaaliumisisaldus (hüperkaleemia);
- kui teil on ebatavaliselt kõrge kloriidisisaldus (hüperkloreemia);
- kui teil on mistahes haigus või tervisehäire, millega sageli seostub vere kõrge kaaliumisisaldusega, nagu nt:
  - ebanormaalselt madal vee sisaldus organismis,
  - vähene uriinieritus,
  - Addison'i-tõbi,
  - Perioodiliselt ilmnevad krambid, mis on tingitud pärilikust kaaliumi metabolismihäirest (Gamstorp'i episoodiline adünaamia),
  - sirprakuline aneemia.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Potassium Chloride Braun 7,45 %:
- kui teil on tõsine südamefunktsiooni häire,
- kui te võtate või kui teile antakse ravimeid, mis vähendavad kaaliumi eritumist uriiniga või selliseid ravimeid, mis võivad kahjustada neere, nagu nt teatud kindlad põletikuvastased ravimid.

Neerupuudulikkuse sümptomite tekke korral tuleks kaaliumisisaldavate infusioonide manustamine peatada.

Liiga kõrge või liiga madal kaaliumisisaldus viib iseloomulike muutusteni EKG's.

Manustamise ajal tuleb regulaarselt kontrollida vere elektrolüütide taset ja happe-aluse tasakaalu, veendumaks, et need on normis.

Vältimaks koekahjustust, tuleb olla täiesti kindlaks, et lahust manustataks teile veeni,

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Eriti peaks teie arst pöörama tähelepanu:
Südamepuudulikkuse raviks kasutatavad ravimid (digitaalise preparaadid):
Nende ravimite toime muutub nõrgemaks kui vere kaaliumisisaldus suureneb ja tugevneb (harilikult koos ebaregulaarse südamerütmiga) kui kaaliumisisaldus veres langeb.

Ravimid, mis vähendavad kaaliumi eritumist uriiniga:
See ravimgrupp sisaldab mõningaid ravimeid, mis suurendavad uriinieritust, teatud ravimeid kõrge vererõhu raviks või põletiku- ja valuvastaseid ravimeid. Kaaliumi manustamine koos nende ravimitega tingib vere väga kõrge kaaliumisisalduse tekke.

Suksametoonium (lihaseid lõdvestav aine, mida kasutatakse üldanesteesias):
Kaaliumi manustamine koos selle ravimiga tingib samuti väga kõrge vere kaaliumisisalduse tekke.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Praeguseks ei ole teateid kahjulike toimete või riskide kohta, mis seostuvad selle ravimi kasutamisega rasedatel või imetavatel naistel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
See ravim ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

3. KUIDAS Potassium Chloride Braun 7,45 % infusioonilahuse kontsentraati KASUTADA

Potassium Chloride 7,45 % infusioonilahuse kontsentraati manustatakse teile pärast lahustamist sobivas lahuses (nt tavaline füsioloogiline lahus, 5…10 % glükoosilahus, Ringer'i laktaadilahus) läbi kanüüli või väikese toru kaudu (veenisisene infusioon).
Harilikult manustatakse teile kaaliumilisandit infusioonipumba abil.

<u>Annustamine:</u>
Teile manustatava annuse arvutab tuginedes teie keha veesisaldusele ja vere elektrolüütide tasemele välja arst.
Tuleb hoolikalt jälgida, et ei ületataks päevast annust 2…3 mmol kaaliumi ühe kg kehamassi kohta ja et infusiooni kiirus ei oleks üle 0,3 mmol kaaliumi kg/h.

Kui teil on tunne, et Potassium Chloride Braun 7,45 % toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui teile manustatakse Potassium Chloride Braun 7,45 % infusioonilahuse kontsentraati rohkem kui ette nähtud
Üleannustamine võib viia ebanormaalselt kõrge kaaliumisisalduseni, millega kaasnevad kõrvaltoimed:

Süda ja vereringe:
Aeglane südamerütm või isegi südameseiskumine, muutused EKG's, vererõhu langus ja vereringe ümberjaotumine jäsemetest pähe ja kehatüve ossa.

Lihased ja närvisüsteem:
Nõrkustunne, väsimus, segasusseisundid, raskustunne jäsemetes, lihastõmblused, teadvusekadu ja halvatus.

Ravi:
Kõigepealt tuleb infusioon viivitamatult lõpetada. Edasine ravi võib sisaldada kaltsiumglükonaadi või glükoosi ja insuliini manustamist, teiste sobilike ravimite manustamist urineerimise sageduse suurendamiseks või ainult kaaliumi eemaldamiseks, vere elektrolüütide taseme korrigeerimiseks ja happe-alus taskaalu häirete kõrvaldamiseks. Raske mürgistuse korral võib vajalikuks osutuda hemodialüüs.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Potassium Chloride Braun 7,45 % infusioonilahuse kontsentraat põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kaaliumkloriidi manustamisega võivad kaasneda haiguslik enesetunne, happe-alus tasakaalu muutumist happelisuse poole (atsidoos) ja kloriidisisalduse suurenemine vereplasmas.

Liiga kiire infusioon võib esile kutsuda südame rütmihäireid.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS Potassium Chloride Braun 7,45 %infusioonilahuse kontsentraati SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Potassium Chloride Braun 7,45 % infusioonilahuse kontsentraati pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage Potassium Chloride Braun 7,45 % infusioonilahuse kontsentraati, kui te märkate, et lahus on hägune, selles on osakesi või kui mahuti lekib.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Potassium Chloride Braun 7,45 % infusioonilahuse kontsentraat sisaldab:

- Toimeaine on naatriumkloriid.
  Üks ml lahust sisaldab 74,5 mg (= 1 mmol) kaaliumkloriidi.
  Üks 10 ml ampull sisaldab 745mg kaaliumkloriidi.

- Abiaine on süstevesi.

Kuidas Potassium Chloride Braun 7,45 % infusioonilahuse kontsentraat välja näeb ja pakendi sisu

Potassium Chloride Braun 7,45 % on infusioonilahuse kontsentraat. See tähendab, et seda tuleb enne kasutamist lahjendada ning seda manustatakse veenisiseselt.

Lahus on selge ja värvitu.

Ravim on pakendatud 20 ml polüetüleenampullidesse 20 x 20 ml pakendites ja 100 ml klaasviaalis 20 x 100 ml pakendites.

Müügiloa hoidja ja tootja

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen,
Saksamaa

Postiaadress
34209 Melsungen, Saksamaa
Telefon: +49 5661 71 0
Fax: +49 5661 71 4567

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

B.Braun Medical OÜ
Kadaka tee 70B, 12618
Tallinn

Infoleht viimati kooskõlastatud: veebruaris 2011.