

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Vepesid 100 mg pehmekapslid etoposiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Vepesid ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Vepesid'i kasutamist
3. Kuidas Vepesid'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Vepesid'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON VEPESID JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Vepesid on kasvajatevastane ravim, mida kasutatakse munandivähi, väikerakulise kopsuvähi ja lümfoomi ning ägeda müeloidse leukeemia raviks kombinatsioonis teiste kasvajavastaste ravimitega.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE VEPESID'I KASUTAMIST

Ärge võtke Vepesid'i, kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine või Vepesid'i mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Vepesid

Vepesid'i võib välja kirjutada ainult onkoloog või hematoloog. Ravim võib kahjustada vereloomet, seepärast on ravi ajal vajalik regulaarne arstlik kontroll. Tavaliselt teeb arst vereanalüüsi enne ravi alustamist ja iga järgneva ravikuuri eel.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Võtmine koos toidu ja joogiga

Vepesid kapsleid tuleb võtta tühja kõhuga.

Rasedus ja imetamine

Vepesid'i kasutamine raseduse ajal võib kahjustada loodet. Rasestuda võivad naised peavad kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kuna paljud ravimid erituvad rinnapiima ja olemas on tõsiste kõrvaltoimete tekke võimalus imikul, ei tohiks ravi ajal last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole täheldatud, et Vepesid vähendaks reaktsioonikiirust, mida tuleks arvestada auto juhtimisel või masinatega töötamisel. Ravim võib siiski harva põhjustada väsimust ja unisust. Sellisel juhul on soovitatav hoiduda auto juhtimisest või masinatega töötamisest.

3. KUIDAS VEPESID'I KASUTADA

Kasutage Vepesid'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Vepesid'i annuse ja raviskeemi määrab arst lähtudes teie kehakaalust ja pikkusest ning tervislikust seisundist ja teistest kasutatavatest ravimitest. Tavaline suukaudne annus on 100...200 mg/m² kehapindala kohta ööpäevas viiel järjestikusel päeval või 200 mg/m² kehapindala kohta ööpäevas esimesel, kolmandal ja viiendal päeval. Ravikuure korratakse 3...4 nädalaste vahedega. Täitke täpselt arsti antud juhiseid. Kapsleid tuleb võtta enne sööki.

Arvestades Vepesid'i toimemehhanismi, võib see ravim põhjustada kasvaja teket tervel inimesel, mistõttu see ravim ei tohiks sattuda kõrvaliste isikute kätte.

Kui teil on tunne, et Vepesid'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Vepesid'i rohkem kui ette nähtud

Kui olete manustanud eksituse tõttu liiga suure annuse või kui keegi teine on võtnud sisse teie ravimit, informeerige sellest kohe lähimat arsti (kiirabi). Üleannustamise korral võivad tekkida seedetrakti vaevused, maksakahjustus, vereloome kahjustus ja tõsised ainevahetuse häired.

Kui te unustate Vepesid'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Pidage nõu arstiga, sest kasvajavastases kemoterapias on sageli oluline erinevate ravimite võtmise aeg ja järjekord.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Vepesid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige olulisemaks kõrvaltoimeks on vereloome ajutine häirimine, mis võib nõuda annuse vähendamist või järgmise ravikuuri edasi lükkamist. Ravim võib põhjustada iiveldust ja oksendamist, mille vastu arst määrab vajadusel täiendavaid ravimeid. Esineda võib ka söögiisu vähenemine, suu, söögitoru või mao limaskesta põletik või kõhulahtisus. Ligikaudu kahel kolmandikul patsientidest põhjustab ravim juuste väljalangemist. Kirjeldatud on tundlikkuse häireid kätes või jalgades (neuropaatia), sagedamini patsientidel, kes on saanud varem teisi vähivastaseid ravimeid (vinkristiin). Küllaltki harva on esinenud unisust, väsimust, maksa kahjustust, kõrvalmaitset suus, palavikku, nahalööbeid, nahapigmentatsiooni, sügelust, nõgestõbe, kõhuvalu, kõhukinnisust.

Vepesid võib vallandada ka ägeda allergilise reaktsiooni (anafülaksia). Kui ravi käigus tekib ootamatu kehatemperatuuri tõus, hingeldus, südame pekslemine, naha punetus või vererõhu langus, tuleb koheselt pöörduda arsti poole (kutsuda kiirabi). Tõsiste kõrvaltoimete ilmnemisel vähendab arst annust või lõpetab ravi.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS VEPESID'I SÄILITADA

Ärge kasutage Vepesid'i pakendile märgitud aegumistähtaja möödudes. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Säilitada temperatuuril kuni 25°C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Vepesid sisaldab

- Toimeaine on etoposiid
- Abiained on: sidrunhape, glütserool, polüetüleenglükool-400, želatiin, titaandioksiid (valge pigment), raudoksiid, (punane pigment), naatriumetüülhüdroksübensoaat, naatriumpropüülhüdroksübensoaat.

Kuidas Vepesid välja näeb ja pakendi sisu

Pakendis on 10 pehmekapslit.

Müügiloa hoidja

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Lövőház u. 39

1024, Budapest

Ungari

Tootja

Corden Pharma Latina S.p.A

Via del Murillo Km 2,800

Sermoneta, Latina

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47

11316 Tallinn

Tel: 6827 400

Infoleht on viimati koostöölstatud septembris 2010