

Pakendi infoleht: teave kasutajale

GeloMyrtol, 120 mg gastroresistentsed pehmekapslid

Standardiseeritud mürtool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on GeloMyrtol ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne GeloMyrtol'i võtmist
3. Kuidas GeloMyrtol'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas GeloMyrtol'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on GeloMyrtol ja milleks seda kasutatakse

GeloMyrtol on taimse päritoluga ravim, toimeaine standardiseeritud mürtool saadakse taimede eeterlikest õlidest. Sekreedi vedeldamiseks sinusiidi ja bronhiidi korral.

2. Mida on vaja teada enne GeloMyrtol'i võtmist

Ärge võtke GeloMyrtol'i

- kui olete standardiseeritud mürtooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Muud ravimid ja GeloMyrtol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

GeloMyrtol'i võib raseduse ajal kasutada.

Rasvlahustuvate omaduste tõttu tuleb arvesse võtta GeloMyrtol'i eritumist rinnapiima. Ravi vajadusel tuleb lõpetada imetamine või ravimit mitte võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei kohaldata.

GeloMyrtol sisaldab sorbitooli

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas GeloMyrtol'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on:

Üle 10-aastased lapsed, noorukid ja täiskasvanud võtavad ägeda põletiku puhul 2 kapslit 4...5 korda ööpäevas. Kroonilise haiguse puhul 2 kapslit 3 korda ööpäevas. Selline annus on soovitatav ka säilitusravi korral.

Alla 10-aastased lapsed võtavad ägeda põletiku puhul 1 kapsli 4...5 korda ööpäevas. Kroonilise haiguse puhul 1 kapsel 3 korda ööpäevas. Selline annus on soovitatav ka säilitusravi korral.

Kroonilise bronhiidi korral hommikuse köhimise kergendamiseks võtta 2 kapslit GeloMyrtol'i õhtul enne magamaminekut. Alla 10-aastased lapsed võtavad sel juhul 1 kapsli GeloMyrtol'i.

Kapsel neelata alla tervelt (mitte närida) koos rohke jaheda vedelikuga pool tundi enne sööki.

Viimase annuse võib võtta enne magamaheitmist.

Kui teil on tunne, et GeloMyrtol'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate GeloMyrtol'i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate GeloMyrtol'i rohkem kui ette nähtud, pöörduge niipea kui võimalik arsti poole.

Ülisuurte annuste puhul võivad esineda iiveldus, oksendamine, krambid, harvadel juhtudel hingamisraskused. Kui patsient vajab viivitamatut arstiabi, kutsuge kiirabi.

Kui te unustate GeloMyrtol'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üksikjuhtudel võib esineda mao-soole vaevusi, olemasolevad neeru- ja sapikivid võivad hakata liikuma. Üksikjuhtudel on esinenud ülitundlikkusnähte (nt nahalööve, näoturse, õhupuudus ja vereringehäired).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas GeloMyrtol'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida GeloMyrtol sisaldab

- Toimeaine on standardiseeritud mürtool.
- Teised koostisosad on keskmise ahelaga triglütseriidid, želatiin, glütserool, hüpromelloosatsetaatsuktsinaat, trietüültsitraat, sorbitooli lahus (mittekristalliseeruv), naatriumlaurüülsulfaat, talk, dekstriin, ammooniumglütserisaat, lahjendatud vesinikkloriidhape.

Kuidas GeloMyrtol välja näeb ja pakendi sisu

Värvimata läbipaistvad pehmed želatiinkapslid. Üks blister sisaldab 10 kapslit. Karbis on 2, 5 või 10 blisterit.

Müügiloa hoidja ja tootja

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG
Kieler Straße 11
25551 Hohenlockstedt
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ
Tähtvere 4
51007 Tartu
Tel: + 372 7338080

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2013