

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Espumisan L 40mg/ml suukaudsed tilgad, emulsioon Simetikoon

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Espumisan L'i täpselt juhistele vastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigusümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Espumisan L milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Espumisan L'i kasutamist
3. Kuidas Espumisan L'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Espumisan L'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON ESPUMISAN L JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Espumisan L kuulub ravimite gruppi mida nimetatakse seedetrakti ravimiteks. Selle toimeaine simetikoon lagundab maos ja soolestikus olevaid gaasimulle. Vabanenud gaas eemaldub seejärel loomulikul teel.

- Kasutatakse gaasi kogunemisega seotud mao- ja soolekaebuste korral, mille sümptomiteks on kõhupuhitus.
- Täiendava vahendina seedetrakti diagnostiliste uuringute (nt röntgen-, ultraheli- või gastrokoopilised uuringud) ettevalmistamiseks.
- Pesuvahendite eksliku sissevõtmise järgselt abistava vahendina vahu vähendamiseks seedetraktis.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ESPUMISAN L'i KASUTAMIST

Ärge kasutage Espumisan L'i kui te olete allergiline:

- toimeaine simetikoon suhtes
- Espumisan L'i mõne koostisosa suhtes.

Palun pidage meeles, et andes seda ravimit teistele, siis käib see ka nende kohta.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Espumisan L

Gaasi kogunemisest tingitud kaebused võivad olla ka mao ja soolestiku mõne muu, tõsisema haiguse sümptomid.

Selliste sümptomite, nagu:

- pinge- ja täiskõhutunne;
- gaasi eraldumine suukaudu;
- kõhu "korisemine";
- mao venitus (liigsest gaasist)

esinemisel või püsimisel tuleb pöörduda arsti poole. Arst uurib kaebuste põhjust, välistades haiguse olemasolu, mis võiks vajada teistsugust ravi.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Siiani ei ole täheldatud Espumisan L-il koostoimeid teiste ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Enne mistahes ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Espumisan L'i võib raseduse ja imetamise ajal kasutada, kuna toimeaine simetikoon ei imendu seedetraktist verre.

Kliinilisi uuringuid Espumisan L'i kasutamisel raseduse ajal pole läbi viidud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Erijuhised puuduvad.

Oluline teave mõningate Espumisan'i koostisainete suhtes

See ravim sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS ESPUMISAN L'i KASUTADA

Kui arst ei ole määranud teisiti, kasutage Espumisan L'i alati vastavalt pakendi infolehe juhistele.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Enne kasutamist loksuta pudelit. Tilgutamiseks hoia pudeli põhi ülespoole. 25 tilka (1 ml suukaudset emulsiooni) sisaldab 40 mg simetikooni.

Annustamine

Tavaline annus on:

Kõhupuhituse korral

Vanus	Annus tilkades (ml)	Kasutamise sagedus
Imikud	25 tilka (võrdne 1 ml-ga)	Igal toidukorral toidupudelisse või andke lapsele enne või pärast imetamist
Lapsed vanuses 1...6 aastat	25 tilka (võrdne 1 ml-ga)	3...5 korda päevas
Lapsed vanuses 6...14 aastat	25 kuni 50 tilka (võrdne 1...2 ml-ga)	3...5 korda päevas
Noorukid üle 14 eluaasta ja täiskasvanud	50 tilka (võrdne 2 ml-ga)	3...5 korda päevas

Märkus: Espumisan L'i võib kasutada ka pärast operatsiooni.

Espumisan L'i võetakse söögi ajal või pärast sööki, vajadusel ka enne magamaminekut. Ravi kestuse määrab kaebuste kulg. Vajadusel võib Espumisan L'i kasutada pikema aja vältel. Kui kaebused püsivad vt lõik 2 "Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Espumisan L"

Diagnostilisteks uuringuteks ettevalmistamine:

Uuringule eelneval päeval	Uuringupäeva hommikul
----------------------------------	------------------------------

50 tilka (vastab 2 ml-le) 3 korda päevas	50 tilka (vastab 2 ml-le)
--	---------------------------

Lisandina kontrastaine suspensioonile (diagnostilistel uuringutel):

100...200 tilka (vastab 4...8 ml-le) Espumisan L'i lisaks 1 liitrile suukaudsele kontrastainele radiograafia puhul.

Antidoodina (vastumürgina) mürgistuse korral pesuvahenditega :

Sõltuvalt mürgistuse raskusastmest.

Vanus	Annus
Lapsed	65 tilka kuni 1/3 pudelit (vastab 2,5...10 ml-le) Espumisan L'i.
Täiskasvanud	1/3...2/3 pudelit (vastab 10...20 ml-le) Espumisan L'i).

Tähelepanu!

Kui te kasutate Espumisan L'i esmaabivahendina pärast pesuvahendi neelamist tuleb minna **otsekohe** arsti juurde!

Kui teil on tunne, et Espumisan L'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Espumisan L'i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisel pole teadaolevaid ohtlikke toimeid. Ka suured simetikoonikogused on hästi talutavad.

Espumisan L'i toimeaine simetikoon lagundab seedetraktis oleva vahu füüsikaliselt ja ei satu vereringesse.

Kui te unustate Espumisan L'i kasutada

Võite võtta järgmise annuse mistahes teile sobival ajal.

Kui te lõpetate Espumisan L'i kasutamise

Pärast Espumisan L'i kasutamist võivad ilmnedä sümptomid uuesti.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Siiani ei ole Espumisan L'il kõrvaltoimeid täheldatud.

Kui te täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. KUIDAS ESPUMISAN L'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Espumisan L'i pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pärast pudeli esmakordset avamist on Espumisan L kasutamiskõlblik 6 kuud.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida ESPUMISAN L sisaldab

- Toimeaine on simetikoon. 25 tilka (1 ml suukaudset emulsiooni) sisaldab 40 mg simetikooni.

- Abiained on makrogoolsteraat, glütseroolmonostearaat, karbomeer, banaani maitseaine, kaaliumatsesulfaam, sorbitooli lahus (mittekristalluv), naatriumkloriid, naatriumtsitraat, naatriumhüdroksiid, sorbiinhape, puhastatud vesi

Müügiloa hoidja ja tootja:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125

12489 Berliin, Saksamaa

Kuidas Espumisan L välja näeb ja pakendi sisu

Piimjas valge väheviskoosne emulsioon.

30 ml merevaiguvärvi klaasist keeratava korgi ja tilgutiga pudel, 1 või 3 pudelit karbis.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Paldiski mnt 27/29

10612 Tallinn

Eesti

Tel: 667 5001

Infoleht on viimati koostöölstatud septembris 2013