

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

OFTAN AKVAKOL 5 mg/ml silmatilgad, lahus

Klooramfenikool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusümptomid on sarnased
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Oftan Akvakol silmatilgad ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Oftan Akvakol silmatilkade kasutamist
3. Kuidas Oftan Akvakol silmatilkasid kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Oftan Akvakol silmatilkasid säilitada
6. Lisainfo

1. Mis ravim on Oftan-Akvakol silmatilgad ja milleks seda kasutatakse

Oftan Akvakol silmatilgad sisaldavad klooramfenikooli, mis takistab silmapõletikku põhjustavate bakterite kasvu. Oftan Akvakol silmatilkasid kasutatakse klooramfenikoolile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud silmapõletike raviks. Silmatilkasid kasutatakse ka nakkuste ennetamiseks silmatraumade ja -operatsioonide korral.

2. Mida on vaja teada enne Oftan Akvakol silmatilkade kasutamist

Ärge kasutage Oftan Akvakol silmatilkasid

Kui te olete allergiline (ülitundlik) klooramfenikoolile või Oftan Akvakoli mõne koostisosa suhtes.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Muud samaaegselt kasutatavad ravimid ei mõjuta Oftan Akvakoli silmatilkade toimet olulisel määral. Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Oftan Akvakol silmatilkade kasutamine ei mõjuta autojuhtimist ega masinatega töötamist

Oluline teave mõningate Oftan Akvakol silmatilkade koostisosade suhtes

Oftan Akvakol silmatilgad sisaldavad säilitusainet bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada silmaärritust ja kontaktläätsede värvimuutust.

Hoiduge kontaktläätsede kandmisest, kui silm on põletikuline, sest kontaktläätsed võivad aeglustada põletiku paranemist või soodustada põletiku ägenemist.

3. Kuidas Oftan Akvakol silmatilkasid kasutada

Ravim on vaid silma tilgutamiseks. Kasutage Oftan Akvakol silmatilkasid täpselt nii, nagu arst teile on rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline annus on esialgu üks tilk silma(desse) 6–8 korda päevas. Paranemise korral annust vähendatakse astmeliselt. Kui teil on tunne, et Oftan Akvakoli toime on liiga tugev või nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Enne silmatilkade manustamist

- peske käed
- valige tilkade tilgutamiseks kõige mugavam asend (nt. istuge, hetke pikali, seiske peegli ees)

Manustamine

1. Avage silmatilgapudel. Saastumisest hoidumiseks ärge puudutage pudeli otsikuga mingeid pindu.


2. Kallutage pea kuklasse ja asetage pudel kohakuti silmaga.



3. Tõmmake alumist silmalaugu alla, vaadake lakke ja pigistage pudelit kuni tilk kukub silma.



4. Sulgege silm ja vajutage nimetissõrmega silma sisemisele (ninapoolsele) nurgale umbes minuti jooksul. Sellega hoiate ära silmatilkade valgumise ninaneelu.



Kui te tilgutate samasse silma erinevaid tilkasid, pidage erinevate tilkade tilgutamisel vähemalt 5 min. vahet.

Kui tilgutasite Oftan Akvakol silmatilkasid rohkem kui ette nähtud

Kui tilgutasite rohkem kui ette nähtud, siis liigne lahus väljub silmast ja ei põhjusta mingeid sümptome.

Kui te unustate Oftan Akvakol silmatilkasid kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võivad ka Oftan Akvalol silmatilgad põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Oftan Akvakol silmatilgad on tavaliselt hästi talutavad. Harva esineb ärritust ja ülitundlikkuse reaktsioone (punetus, vesised silmad, silmalaugude sügelemine).

Väga harvaks kõrvaltoimeks on muutused verepildis (vere valgeliblede vaegus ja kehvveresus) ning nägemisnärvipõletik.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas Oftan Akvakoli säilitada

- Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!
- Hoida külmkapis (temperatuuril (2 °C ...8 °C).
- Ärge kasutage Oftan Akvakol silmatilkasid pärast pakendile märgitud kõlblikkusaega. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
- Pärast pudeli esmakordset avamist on ravim kõlblik 28 päeva. Hoidke pudel tihedalt suletuna ja külmkapis.
- Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Lisainfo

Mida Oftan Akvakol silmatilgad sisaldavad

- Toimeaine on klooramfenikool. 1 ml Oftan Akvakol silmatilkasid sisaldab 5 mg klooramfenikooli.
- Abiained on bensalkooniumkloriid (40 mikrogrammi/ml), boorhape, booraks, polüsorbaat 80 ja süstevesi.

Kuidas Oftan Akvalol välja näeb ja pakendi sisu

Valgest plastist (HDPE) keeratav kork ja valgest plastist (LDPE) pudel tilgutiga, sisaldab 10 ml lahust.

Müügiloo hoidja ja tootja

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Finland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloo hoidja kohaliku esindaja poole.

Pärnu mnt.501
76401 Laagri, Harjumaa
Tel 6503680

Infoleht on viimati koostölastatud augustis 2010