

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE**OFTAN DEXA-CHLORA, 1 mg/ 2mg/ml silmatilgad, lahus**
Deksametason, klooramfenikool**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigusümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Oftan Dexa-Chlora silmatilgad ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Oftan Dexa-Chlora silmatilkade kasutamist
3. Kuidas kasutada Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid säilitada
6. Lisainfo

1. Mis ravim on Oftan Dexa-Chlora silmatilgad ja milleks seda kasutatakse

Oftan Dexa-Chlora silmatilgad sisaldavad deksametasooni ja klooramfenikooli. Deksametason sarnaselt kortisoonile leevendab põletikku ja ülitundlikkust (allergiat) ja vaigistab silmavalu. Klooramfenikool pidurdab silmapõletikku põhjustavate bakterite kasvu. Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid kasutatakse silmapõletike ja allergiliste silmahaiguste raviks.

2. Mida on vaja teada enne Oftan Dexa-Chlora silmatilkade kasutamist**Ärge kasutage Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid**

- Kui te olete ülitundlik deksametasooni või klooramfenikooli või Oftan Dexa-Chlora silmatilkade mõne muu koostisosa suhtes
- Kui teil on silmatuberkuloos
- Kui teil on viiruslik silmapõletik või silma seennakkus
- Kui teie silmas on haavand

Eriline ettevaatus on vajalik Oftan Dexa-Chlora silmatilkadega

Oftan Dexa-Chlora silmatilkades kasutatav bensalkooniumkloriid võib muuta kontaktläätsede värvi. Vältige kontaktläätsede kasutamist põletikulises silmas.

Deksametasoni pikaajaline (rohkem kui kaks nädalat) kasutamine võib suurendada silma siserõhku. Sarvkesta kahjustuste paranemine võib olla aeglasem.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Muud samaaegselt kasutatavad ravimid ei mõjuta Oftan Dexa-Chlora silmatilkade toimet olulisel määral.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Oftan Dexa-Chlora silmatilgad ei takista autojuhtimist ega teravat nägemist nõudvaid toiminguid.

3. Kuidas Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid kasutada

Kasutage Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid täpselt nii, nagu arst teile on rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Ravim on vaid silma manustamiseks. Tavaline annus on 1 tilk silma(desse) 4...6 korda päevas.

Enne silmatilkade manustamist:

- Peske käed
- Valige silmatilkade manustamiseks teile sobiv asend (nt. istuge, heitke pikali, seiske peegli ees)

Manustamine:

1. Avage pudel. Hoidmaks lahust saastumisest ärge puudutage tilguti otsaga mingeid pindu.

2. Kallutage pea kuklasse ja asetage pudel kohakuti silmaga.



3. Tõmmake alumist silmalaugu allapoole, vaadake üles ja tilgutage tilk silma.



4. Sulgege silm ja vajutage nimetissõrmega silma sisemisele (ninapoolsele) nurgale umbes 1 minut. Sellega hoiate ära silmatilkade väljavoolamise pisarateede kaudu neelu. Sulgege pudel.



Kui te tilgutate samasse silma mitmeid ravimeid, siis pidage vähemalt 5 min. vahet erinevate tilkade tilgutamisel.

Kui kasutasite Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid rohkem kui ette nähtud

Lokaalsel manustamisel silma on üleannustamine ebatõenäoline.

Kui te unustate Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võivad ka Oftan Dexa-Chlora silmatilgad põhjustada kõrvaltoimeid.

Oftan Dexa-Chlora silmatilgad on tavaliselt hästi talutavad. Pärast tilgutamist võib esineda kipitust, mis möödub. Pikaajalisel kasutamisel võib tõusta silmasisene rõhk. Mitmeid kuid kestnud ravi korral võivad tekkida sarvkesta haavandid ja hägused.

Väga harva ja tingituna (pikaajalisest) klooramfenikooli kasutamisest on esinenud luuüdi düsfunktsiooni (valge- ja punaliblede madal sisaldus).

Oftan Dexa-Chlora silmatilgad sisaldavad säilitusainet bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada silmade ärritust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Oftan Dexa-Chlora silmatilkade säilitamine

- Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Hoida külmkapis (2 °C ...8 °C).
- Ärge kasutage Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid pärast sildile ja pakendile märgitud kõlblikkusaega. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
- Pärast pudeli esmast avamist on ravim kõlblik 28 päeva.
- Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Lisainfo**Mida Oftan Dexa-Chlora silmatilgad sisaldavad**

- Toimeained on deksametasoon ja klooramfenikool. 1 ml Oftan Dexa-Chlora silmatilkade lahust sisaldab 1 mg deksametasooni, 1,32 mg deksametasoonnaatriumfosfaadina ja 2 mg klooramfenikooli.
- Abiained on bensalkooniumkloriid (40 mikrogrammi/ml), boorhape, booraks, dinaatriumedetaat, polüsorbaat 20 ja süstevesi.

Kuidas Oftan Dexa-Chlora silmatilgad välja näevad ja pakendi sisu

Silmatilkade lahus on läbipaistev värvitu või veidi kollakas lahus.

Läbipaistvast plastist (LDPE) pudel valgest plastist (HDPE) keeratava korgiga, sisaldab 10 ml lahust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Finland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa kohaliku esindaja poole

Pärnu mnt. 501
76401 Laagri, Harjumaa
tel. 6503680

Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2010