

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Braunovidon, 100 mg/g, salv Polüvidoonjodiid

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Braunovidon salvi täpselt juhistelevastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui pärast haigussümptomeid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Braunovidon ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Braunovidon'i kasutamist
3. Kuidas Braunovidon'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Braunovidon'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON BRAUNOVIDON JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Braunovidon on polüvidoonjodiidi sisaldav antiseptikum ja desinfektant.

Braunovidon on salv.

Braunovidon'i kasutatakse infitseerunud nahakahjustuste (lamatised, säärehaavandid, pindmised haavad ja põletused, infitseerunud dermatoosid) raviks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE BRAUNOVIDON'I KASUTAMIST

Ärge kasutage Braunovidon'i

- kui te olete allergiline (ülitundlik) polüvidoonjodiidi või mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on praegu või on olnud hiljuti äge joodist mõjutatud kilpnäärme haigus
- kui teil on kilpnäärme suurenemine või funktsionaalne autonoomne adenoom (peamiselt eakatel)
- enne ja pärast ravi radioaktiivse joodiga (kuni täieliku paranemiseni)
- kui teil on *herpetiformse dermatiidi* sündroom (ohatisetaoline nahapõletik)

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Braunovidon

- vastsündinutel ja kuni 6 kuu vanustel imikutel tohib salvi kasutada vaid pärast kasu ja riski suhte hindamist. Ravist saadav kasu peab üles kaaluma kaasuva riski, sest ravim võib mõjutada imiku kilpnääret.
- nende patsientide puhul, kellel on mitte-infektsioosne nodulaarne struuma või latentne hüpertüreoos.
- polüvidoonjodiidi oksüdeeriva toime tõttu võivad mõningad diagnostilised uuringud anda valepositiivseid vastuseid (näiteks O-toluidiin või guajakivaik hemoglobiini ja glükoosi määramisel).
- arvestama peab keemilist sobimatust teiste ainetega.
- polüvidoonjodiidi kasutamisel võib olla langenud joodi omastamine kilpnäärme poolt. Ravimi kasutamise ajal võib see segada kilpnäärme uuringute läbiviimist (stsintigraafia, plasmavalkudega seotud

joodi määramine, diagnostika radioaktiivse joodiga) ja seega muuta ravi radioaktiivse joodiga võimatuks. Uue stsintigrammi võib teha 1...2 nädalat pärast ravi lõpetamist Braunovidon'iga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Jood reageerib elavhõbedaga, mille tulemusel tekib tugevalt söövitav elavhõbejodiid.

Polüvidoonjodiid on toimiv pH väärtuste juures 2...7. Tuleb arvestada, et polüvidoonjodiid võib reageerida valkude ja teiste orgaaniliste ainete, mis vähendab tema efektiivsust.

Ärge kombineerige polüvidoonjodiidi ensümaatiliste haavaravivahendite, taurolidiini ega vesinikülhlapendiga.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimit ei tohi kasutada raseduse esimese kolme kuu jooksul. Teisel ja kolmandal trimestril ning rinnaga toitmise perioodil 6 kuud pärast sünnitust tuleb ravist saadavat kasu hinnata võimalike mõjude suhtes loote või imiku kilpnäärmele.

3. KUIDAS BRAUNOVIDON'I KASUTADA

Kasutage Braunovidon'i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Sõltuvalt ravitava pinna suurusest ja kahjustuse iseloomust kantakse Braunovidon kahjustusele mitu korda ööpäevas. Ravimit tuleb kasutada kogu kahjustusele.

Põletikulise ja rohke eksudaadiga kahjustuse korral tuleb püsiva mikroobidevastase toime säilitamiseks vahetada salvi iga 4...6 tunni järel.

Abstsessiõõsi võib Braunovidon'iga tamponeerida.

Salvi võib haavapinnale jätta ka pikemaks ajaks ning seda tuleb vahetada siis, kui salv muudab värvi.

Märkus:

Salvi pruun värvus on preparaadile iseloomulik omadus. See näitab vaba joodi esinemist ning ühtlasi ravimi toimivust.

Pruuni värvuse kadumisel on vajalik salvi uuesti määrada. Ravitav pind tuleb katta salviga kogu ulatuses, sest Braunovidon'il on ainult lokaalne antimikroobne toime.

Kuna polüvidoonjodiid on vesilahustuv, saab ravimi jääke riidetelt eemaldada seebi ja veega. Raskelt eemaldatavaid jääke saab kõrvaldada ammoniaagi või tiosulfaadi lahusega.

Kui teil on tunne, et Braunovidon'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Braunovidon põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Isegi joodile tundlike patsientide hulgas esineb allergilisi reaktsioone väga harva.

Üksikutel juhtudel võib tundlikel patsientidel esineda paikselt valu, põletus- ja kuumatunnet.

Ravimi pikemaajalisel kasutamisel või ulatuslikele põletuskahjustustele aplitseerimisel on üksikjuhtudel teatatud vereseerumi elektrolüütide ja osmolaarsuse häiretest, metaboolsest atsidoosist ja neerupuudulikkusest.

Kui Braunovidon'i kasutatakse pikema aja jooksul või suurematel pindadel, eelkõige põletuspindadel, kilpnäärmehaiguste esinemisel ja vastündinutel, on ravi ajal soovitatav jälgida patsiendi kilpnäärme funktsiooni.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS BRAUNOVIDON'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Braunovidon'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Braunovidon sisaldab:

- Toimeained on polüvidoonjodiid. 1 g salvi sisaldab 100 mg polüvidoonjodiidi, milles on 10% vaba joodi.
- Abiained on makrogool 400, makrogool 4000, puhastatud vesi, naatriumvesinikkarbonaat.

Kuidas Braunovidon välja näeb ja pakendi sisu

Braunovidon on pruun salv.
Salv on saadaval 20 g, 100 g ja 250 g tuubides.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

B. Braun Medical OÜ
Kadaka tee 70B
12618, Tallinn



Tel: 677 12 00
e-mail: info@bbraun.ee

Infoleht on viimati koostõlastatud juulis 2011

Braunovidon salv 20 g sobivas otsikuga tuubis

Sobib hästi täpseks manustamiseks ja ulatuslike haavade, põletike ja nahahaiguste raviks.

Ei määri, on mahapestav



a) Lõigake otsiku tipp maha soovitava läbimõõduga kohalt.

b) Suurema või väiksema avause kaudu saate täpselt soovitud koguse salvi.

Pärast kasutamist keerake kaitsekork tuubile tagasi.

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen
Saksamaa

B | BRAUN