

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

PK-Merz 100 mg, 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid Amantadiinsulfaat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on PK-Merz ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne PK-Merz'i võtmist
3. Kuidas PK-Merz'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas PK-Merz'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON PK-MERZ JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

PK-Merz on parkinsonismivastane ravim, mida kasutakse Parkinsoni tõve sümptomite (lihaste jäikus, kangus, värisemine) raviks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PK-MERZ'I VÕTMIST

Ärge võtke PK-Merz'i:

- kui te olete allergiline (ülitundlik) amantadiinsulfaadi, värvaine oranžkollane S (E 110) või PK-Merz tablettide mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on raske dekompenseeritud südamepuudulikkus (NYHA IV staadium)
- kui teil on teised kindlad südamelihase häired (kardiomiopaatiaid ja müokardiiit)
- kui teil on südame erutustekke-juhtesüsteemi häired (II või III astme AV-blokaad)
- kui teil on südamelöögi sagedus alla 55 löögi/minutis (bradükardia alla 55 löögi/minutis)
- kui teil on kindlad ebaharilikud muutused elektrokardiogrammis (teadaolev QT-intervalli pikenemine või eristatavad U-lained)
- kui teie suguvõsas on esinenud kaasasündinud QT sündroomi (südamehaigus)
- kui teil on olnud/ on rasked ventrikulaarsed rütmihäired (sealhulgas *torsade de pointes*)
- kui teil on vere kaaliumi- või magneesiumisisaldus vähenenud

PK-Merz tablette ei tohi võtta kui te saate samaaegset ravi budipiini või teiste QT-intervalli pikendavate ravimitega (vt Kasutamine koos teiste ravimitega).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga PK-Merz

kui teil esineb mõni allpool loetletud seisunditest:

- eesnäärme suurenemine (prostata hüpertroofia)
- silmasisese rõhu tõus e glaukoom (suletudnurga glaukoom)

- kahjustunud neerufunktsioon (erineva raskusastmega neerupuudulikkus), vt. lõik 3. „Annustamine kahjustunud neerufunktsiooniga patsientidele”
- eelnevad ja olemasolevad ärevus- ja segasusseisundid
- delirioossed seisundid ja rasked vaimsed häired (eksogeenne psühhoos) kui te saate samaaegset ravi memantiiniga (vt. manustamine koos teiste ravimitega)

Lapsed:

Ravimi kasutamise kogemused lastel on ebapiisavad.

Vanemaealised patsiendid:

Eakatel patsientidel, eriti neil, kellel esinevad ärevus- ja segasusseisund või teadvushäired, tuleb alustada väiksemast algannusest. (vt. lõik 3 „Kuidas PK Merz’i kasutada”)

Oluline informatsioon PK-Merzi kasutamisel

Enne ravi PK-Merz’iga tuleb teha EKG (50 mm/s) enne ning 1 ja 3 nädalat pärast ravi alustamist ning määrata Bazetti valemi abil sagedus-korrigeeritud QT-intervall (QTc). Selline EKG tuleb teha ka enne ja 2 nädalat pärast iga järgnevat annuse suurendamist. Edaspidi tuleb EKG teha vähemalt üks kord aastas.

Kui teil tekib südamekloppimine, pearinglus või minestus, tuleb ravi amantadiiniga kohe lõpetada ja pöörduda otsekohe arsti poole.

Patsientidel, kellele on paigaldatud südamestimulaator, ei ole QT-intervalli täpne määramine võimalik. Nende patsientide puhul tuleb amantadiini kasutamise üle otsustada individuaalselt pärast konsulteerimist kardioloogiga.

Kahjustunud neerufunktsiooniga patsientidel on risk toimeaine kuhjumiseks, kuna eliminatsioon neerude kaudu on langenud. See võib põhjustada üleannustamise sümptome. Seepärast tuleb arstil annus hoolikalt määrata ja ravi ajal PK-Merziga tablettidega määrata ja jälgida glomerulaarfiltratsiooni väärtust (vt lõik 3. „Kuidas PK-Merz’i võtta“).

Patsiendid, kellel on orgaaniline ajukahjustus (aju düsfunktsioon) ja varem esinenud krambid, tuleb PK-Merz’i kasutada erilise ettevaatusega, kuna individuaalsed sümptomid võivad halveneda ja võivad tekkida krambid (vt lõik 3. Kuidas PK-Merz’i võtta ja lõik 4. „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Patsiendid, kel on teadaolevalt soodumus krampide tekkeks, kaasa arvatud need, kel on varem krampe esinenud ning kardiovaskulaarsete häiretega patsiendid peavad PK-Merz’i samaaegse kasutamise ajal olema regulaarse meditsiinilise järelevalve all.

Kui teil tekib südamekloppimine, pearinglus või lühiajaline teadvuse kadu, lõpetage PK-Merz tablettide võtmine ning võtke otsekohe ühendust oma arstiga, et kontrollida südamerütmi. Kui südame rütmihäireid ei tuvastata, võib ravi PK-Merz’iga uuesti alustada, võttes arvesse vastunäidustusi ja koostoimeid (vt lõik 4. „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Te peate vältima ravi järsku katkestamist PK-Merz’iga, sest see võib põhjustada Parkinsoni tõvega patsientidel liikumise halvenemist ja halvimal juhul liikumatust.

Patsientidel, kes saavad samaaegselt ravi neuroleptikumidega (ravimid, mida kasutatakse vaimsete ja emotsionaalsete häirete raviks), on oht eluohtliku maliigse neuroleptilise sündroomi tekkeks, kui amantadiini kasutamine järsku lõpetada. See seisund on seotud järsu kehatemperatuuri tõusuga, lihasjäikuse ja närvisüsteemi häiretega.

Parkinsonismiga patsientidel esinevad sageli sellised haigusnähud nagu madal vererõhk, suurenenud süljeeritus, higistamine, kehatemperatuuri tõus, soojuse akumulatsioon, tursed ja

depressioon. Nende patsientide ravimisel tuleb arvesse võtta amantadiini kõrvaltoimeid ja koostoimeid.

Palun konsulteerige oma arstiga, kui teil tekivad urineerimishäired.

Kohe kui te märkate nägemishäireid (nägemisteravuse kadumine) või ähmane nägemine, peate kohe pöörduma silmaarstile, et välistada võimaliku põhjusena sarvkesta turset. Teie arst lõpetab ravi PK-Merz'iga kui diagnoositakse sarvkesta turse. Amantadiinravist põhjustatud sarvkesta turse taandub üldiselt kuu aja jooksul.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Amantadiini ja QT-intervalli pikendavate ravimite samaaegne kasutamine on vastunäidustatud. Sellisteks ravimiteks on näiteks:

- teatud IA klassi (nt kinidiin, disopüramiid, prokaiinamiid) ja III klassi (nt amiodaroon, sotalool) antiarütmikumid;
- teatud ravimid, mida kasutatakse luulude raviks (antipsühhootikumid nt tioridasiin, kloorpromasiin, haloperidool, pimosiid);
- teatud depressiooniravimid (tri- ja tetratsükliilised antidepressandid nt amitriptüliin);
- teatud allergiaravimid (antihistamiinikumid nt astemisool, terfenadiin);
- teatud ravimid seen- ja bakteriaalsete infektsioonide raviks (makroliidantibiootikumid nt erütromütsiin, klaritromütsiin);
- teatud ravimid bakteriaalsete infektsioonide raviks (güraasi inhibiitorid nt sparfloksatsiin);
- teatud seeninfektsioonide ravimid (asooli tüüpi antimükootikumid)
- teised ravimid, nagu näiteks budipiin, halofantriin, ko-trimoksasool, pentamidiin, tsisapriid või bepridiil.

See loetelu ei pruugi olla täielik. Enne ravi alustamist PK Merz'iga samaaegselt koos teise ravimiga, kontrollib arst, kas QT intervalli pikenemine on võimalik PK Merz'i kasutamisel koos teise ravimiga. Palun öelge oma arstile või apteekrile, kui te lisaks PK-Merzile võtate või olete hiljuti võtnud muid ravimeid.

Võimalik on amantadiini kasutamine koos teiste parkinsonismivastaste ravimitega. Kõrvaltoimete (nt vaimsed ja emotsionaalsed reaktsioonid) vältimiseks võib vajalikuks osutuda ravimiannuste vähendamine.

Amantadiini täiendav manustamine A-gripiviiruse poolt põhjustatud infektsiooni profülaktikaks ja raviks ei ole soovitatav ning sellest tuleb hoiduda üleannustamise ohu tõttu.

Amantadiini ja teiste parkinsonismivastaste ravimite (nt levodopa, bromokriptiin, triheksüfenidüül jms) või memantiini samaaegsel kasutamisel ilmnevate koostoimete spetsiifilisi uuringuid ei ole läbi viidud (vt lõik 4. „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Amantadiini kasutamine koos allpool loetletud ravimgruppide või toimeainetega võib viia järgmiste koostoimete tekkeni:

Antikoliinergilised ravimid:

Antikoliinergiliste ravimite (nt triheksüfenidüül, benstropiin, skopolamiin, biperideen, orfenadriin jms) kõrvaltoimed (segasus ja hallutsinatsioonid) võivad süveneda.

Kaudselt kesknärvisüsteemi toimivad sümpatomimeetikumid:(sümpaatilist närvisüsteemi stimuleerivad ained)

Amantadiini tsentraalsete toimete tugevnemine.

Alkohol:

Alkoholitaluvuse vähenemine.

Levodopa (parkinsonismivastane ravim):

Terapeutilise toime vastastikune potentseerimine. Levodopat tohib seetõttu kasutada kombinatsioonis amantadiiniga.

Memantiin (dementsusevastane ravim):

Memantiin võib potentseerida amantadiini toimet ja kõrvaltoimeid (vt lõik „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga PK-Merz“)

Muud ravimid:

Triamtereeni/ hüdroklorotiasiidi kombineeritud preparaadi tüüpi diureetikumide samaaegne kasutamine võib põhjustada amantadiini plasmakliirensi vähenemist, viies toksiliste plasmakontsentratsioonide tekkeni. Seetõttu tuleb nende ravimite kooskasutamist vältida.

Palun pidage meeles, et see informatsioon võib kehtida ka hiljuti kasutatud ravimite kohta.

PK-Merz'i võtmine koos toidu ja joogiga

Vältida alkoholsete jookide tarvitamist, kuna PK-Merz vähendab alkoholitaluvust.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

PK-Merz'i kasutamise kohta rasedatel naistel on andmed ebapiisavad. On olnud mõned juhud, kus sündis terve laps, kuid samuti on esinenud raseduskomplikatsioone ja väärarenguid. Loomkatsetes avaldas PK-Merz'i toimeaine amantadiin kahjulikku mõju lootele. Võimalik risk inimesele ei ole teada.

PK-Merz'i ei tohi kasutada raseduse ajal kui see ei ole hädavajalik. Kui ravi viiakse läbi kolme esimese raseduskuu jooksul, peab teie arst teile võimaldama ultraheliuuringu..

Kui te soovite PK-Merz ravi ajal rasestuda või kahtlustate, et olete rase, rääkige palun koheselt oma arstile, et ta saaks otsustada, kas jätkata ravi amantadiiniga, määrata teile teine ravim või lõpetada ravi.

Imetamine

Amantadiin eritub rinnapiima. Kui on vajalik ravimi kasutamine imetamise ajal, tuleb last jälgida ravimi võimalike kõrvaltoimete suhtes (nahalööve, uriinipeetus, oksendamine) ning vajadusel rinnaga toitmine katkestada.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei saa välistada ravimi toimet tähelepanuvõimele ja erksusele (valvsus) ning silma fookuseerimisvõimele (akommodatsioonile), sealhulgas võivad avalduda ka koostoimed teiste Parkinsoni tõve ravimitega. Lisaks haiguse enda mõjule võib ravi alustamise järgselt veelgi halveneda autojuhtimise ja masinate käsitlemise võime.

Te ei ole enam võimeline reageerima kiiresti ja spetsiifiliselt (täpselt) ootamatutele ja äkilistele sündmustele. Seetõttu ärge juhtige autot ega teisi liiklusvahendeid ja ärge kasutage elektrilisi tööriistu ilma oma arstiga konsulteerimata. Pange tähele, et teie autojuhtimisvõime halveneb veelgi koostoimes alkoholiga.

Oluline teave mõningate PK-Merz'i koostisainete suhtes

PK-Merz õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et teil on talumatus teatud suhkrute suhtes, pöörduge enne selle ravimi võtmist oma arsti poole.

3. KUIDAS PK-MERZ'i VÕTTA

Võtke PK-Merz'i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Järgnev informatsioon on PK-Merz tablettide kohta kui teie arst ei ole määranud teisiti. Palun jälgige kasutamishist, vastasel korral ei pruugi PK- Merz tabletid korralikult toimida.

Manustamisviis ja kestvus:

Tabletid võetakse sisse koos vähese vedelikuga, eelistatult hommikul ja pärastlõunal. Viimane annus tuleks võtta enne kella 16.00.

Te ei tohi lõpetada tablettide võtmist ilma oma arstiga konsulteerimata. Ravi kestvus on määratud teie arsti poolt ja sõltub teie haigusest ja reageerimisest ravile.

Annustamine:

Parkinsonismi ravi ning ravimitest tingitud liigutuste häiretega patsientide ravi alustatakse tavaliselt järk-järgult. Vajalik annus ja ravi kestvus sõltub sümptomite tüübist ja tõsidusest ja määratakse teie arsti poolt.

Haigusnähtude taandamiseks võetakse 1 PK-Merz 100 mg õhukese polümeerikattega tablett (ekvivalentne 100 mg amantadiinsulfaadiga päevas) üks kord päevas esimesed 4 kuni 7 päeva. Seejärel suurendatakse annust üks kord nädalas ühe tableti kaupa kuni säilitusannuse (1-3 PK-Merz 100 mg õhukese polümeerikattega tabletti kaks korda päevas (vastab 200-600 mg amantadiinsulfaadile päevas)) saavutamiseni. Arstiga konsulteerides võib päevaannuse jagada 3 eraldi annuseks.

Eakatel patsientidel, eriti neil, kellel esinevad ärevus- ja segasusseisund või teadvushäired, tuleb alustada väiksemast algannusest.

PK-Merzi kombineerimisel teiste parkinsonismivastaste ravimitega, määrab teie arst teile individuaalse annuse.

Kui teid on varem ravitud amantadiini infusioonilahusega, võib teie arst valida suurema algannusega.

Kui teil tekib ootamatu parkinsonismi sümptomite süvenemine (akineetiline kriis), alustab teie arst ravi amantadiini infusiooniga.

Annustamine nõrgenenud neerufunktsiooniga patsientidele:

Kui teil on neeruhäired, kohandab teie arst annuse vastavalt renaalse kliirensi (uriini kaudu erituvast testainest minuti jooksul täielikult puhastatud vereplasma maht neerufunktsiooni testis, mõõdetakse glomerulaarfiltratsioonina) vähenemise ulatusele järgnevalt:

Glomerulaarfiltratsioon (ml/min)	Annus (amantadiin-sulfaat, mg)	Annustamisintervall
80...60	100	iga 12 tunni järel
60...50	200 ja 100	ülepäeviti

		manustatakse vaheldumisi 1x1 ja 1x2 100 mg tabletti
50...30	100	1 kord päevas
30...20	200	2 korda nädalas
20...10	100	3 korda nädalas
<10 ja hemodialüüsitavad patsiendid	100 või	1 kord nädalas või
	200	üle nädala

Kreatiniini kliirensi arvutamiseks võib kasutada järgnevat valemit:

$$Cl = (140 - \text{vanus}) \times \text{kehakaal} / 72 \times \text{kreatiniin}$$

Cl = kreatiniini kliirens (ml/min); kreatiniin = kreatiniin plasmas (mg/100 ml)

Valem võimaldab arvutada kreatiniini kliirensi väärtust, mis on võrdne inuliini kliirensiga. Täiskasvanud meestel on glomerulaarfiltratsiooni kiirus 120 ml/min, naistel 85% selle väärtusest.

Amantadiin on ainult osaliselt dialüüsitav (ligikaudu 5%).

Kui teil on tunne, et PK-Merz'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate PK-Merz'i rohkem kui ette nähtud

Informeeri arsti või paluge seda teha oma hooldajal/ perekonnaliikmel ning lubage arstil end hospitaliseerida kui teil ilmnevad ägeda mürgistuse nähud: iiveldus, oksendamine, ülierutatavus, värisemine, ebakindel kõnnak, nägemise ähmanemine, kauakestev teadvusehäire (letargia), masendus, kõne häired või krambid (ühel juhul on teatatud tõsisest kardiaalsetest arütmiaist). Pärast samaaegset PK-Merz'i tablettide ja teiste parkinsonismivastaste ravimite sissevõtmist on esinenud segasusseisundeid koos hallutsinatsioonidega ja isegi nii koomat kui ka lihastõmbusi.

Kuna spetsiifiline ravi või antidoot puudub, kutsub teie arst üleannustamise korral esile oksendamise või teeb maoloputuse. Kuna amantadiin on vähe dialüüsitav (u 5%), siis vere puhastamiseks dialüüsi (hemodialüüsi) mürgistuse korral ei kasutata.

Eluohtriku mürgistuse korral on vajalik intensiivravi. Võimalikud ravimeetmed hõlmavad vedeliku asendamist, uriini happesuse suurendamist ravimi kiiremaks eritumiseks ning ka sedatsiooni, krambilravi ja antiarütmikumide (i.v. lidokaiini) kasutamist. Neurotoksiliste sümptomite (kirjeldatud eespool) raviks võib kasutada füsostigmiini veenisisesest manustamisest täiskasvanutele annuses 1...2 mg iga 2 tunni järel ja lastele annuses 2 x 0,5 mg 5...10-minutiliste intervallidega kuni maksimaalse annuseni 2 mg.

Vajadusel teeb teie arst EKG ja jälgib hoolikalt tegurite suhtes, mis soodustavad südame rütmihäirete teket, näiteks elektrolüütide tasakaaluhäired (kaaliumi või magneesiumi puudus veres) või aeglane pulss.

Kui te unustate PK-Merz'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate PK-Merz'i võtmise

Te ei tohi mitte mingil juhul lõpetada ravi PK-Merz'iga ilma arstiga konsulteerimata.

Palun teatage sellest oma arstile kui te soovite lõpetada PK-Merz tablettide võtmist (nt. talumatuse või haigustunnuste kadumise tõttu). Ravi ei tohi lõpetada äkki, sest see võib põhjustada haigustunnuste süvenemist ja ärajäämanähtusid.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka PK-Merz põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnev tabel on kõrvaltoimete esinemissageduse selgituseks:

Väga sage:	rohkem kui 1 ravitud inimesel 10-st
Sage:	vähem kui 1 10-st, aga rohkem kui 1 100-st ravitud inimesel
Aeg-ajalt:	vähem kui 1 100-st, aga rohkem kui 1 1000-st ravitud inimesel
Harv:	vähem kui 1 1000-st, aga rohkem kui 1 10'000-st ravitud inimesel
Väga harv:	vähem kui 1-10'000-st ravitud inimesest
Teadmata	ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Võimalikud PK-Merzi kõrvaltoimed:

Sage:

- unehäired
- rahutus ja ärevus
- uriinipeetus eesnäärme suurenemisega patsientidel (prostata hüpertroofia)

Vallanduda võivad paranoilised eksogeensed psühhoosid (taju- ja käitumishäire) koos kaasnevate nägemishallutsinatsioonidega, eriti eelsoodumusega eakatel patsientidel. Sellist tüüpi kõrvaltoimed võivad sagedamini ilmned juhul, kui amantadiini kasutatakse koos teiste parkinsonismivastaste ravimitega (nt levodopa, bromokriptiin) või memantiiniga.

- amantadiinile iseloomulikud nahareaktsioonid, *livedo reticularis* (laiguline nahk), mõnikord koos säärite ja pahklude tursega.
- iiveldus
- peapööritus
- suukuivus
- vereringehäired seistes või püsti tõustes (ortostaatiline vererõhu langus)

Harv:

- ähmane nägemine

Väga harv:

- hematoloogilised (vere pilti puudutavad) kõrvaltoimed nagu leukopeenia ja trombotsütopeenia
- ebaregulaarne südame rütm, nagu ventrikulaarne tahhükardia, vatsakeste fibrillatsioon, *torsade de pointes* ja QT-intervalli pikenemine. Enamik neist juhtudest ilmnes pärast üleannustamist või seoses teatud ravimite või südame rütmihäirete teiste riskifaktoritega (vt lõik 2 „Ärge võtke PK-Merz’i“ ja „Võtmine koos teiste ravimitega“.)
- ajutine nägemise kaotus
- suurenenud valgustundlikkus
- ebaregulaarne südame rütmi koos kiirenenud pulsiga
- epileptilised krampid, tavaliselt patsientidel, kes on ületanud soovitatud annust
- lihastõmbused ja tunnetushäired jäsemetes

Teadmata:

Sarvkesta turse, mis taandub ravi lõpetamisel.

Kohe kui ilmnevad sellised sümptomid nagu nägemisteravuse kadumine või ähmane nägemine, peate pöörduma silmaarstile, et välistada võimaliku põhjusena sarvkesta turse (vt *Oluline informatsioon PK-Merzi kasutamisel*)

Värvaine oranžkollane S (E 110) võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimete tekkimisel otsustab teie arst vajalike meetmete kasutuselevõtmise üle. Palun võtke ühendust oma arstiga, kui teil tekivad ravimi talumatuse nähud.

5. KUIDAS PK-MERZ'i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage PK-Merz'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida PK-Merz sisaldab:

- Toimeaine on amantadiinsulfaat.
- Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg amantadiinsulfaati.
- Abiained on laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, kartulitärklis, želatiin, povidoon 25, talk, kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat, kroskarmelloosnaatrium, butüülmetakrülaad-2-dimetüülaminoetüülmetakrülaad-metüülmetakrülaadi kopolümeer (1:2:1) (Eudragit E 100), oranžkollane S (E 110), titaandioksiid (E 171).

Kuidas PK-Merz välja näeb ja pakendi sisu

Oranž, ümar õhukese polümeerikattega tablett poolitusjoonega ühel poolel.

30 või 90 õhukese polümeerikattega tabletti originaalpakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100
D-60318 Frankfurt
Saksamaa

Tootja:

Merz Pharma GmbH & Co. KgaA
Eckenheimer Landstr. 100
60318 Frankfurt
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

H.Abbe Pharma GmbH
Pirita tee 20T
10127 Tallinn
Tel. 646 0980

Infoleht on viimati koostöölstatud märtsis 2011