

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

LACIPIL, 4 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Latsidipiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on LACIPIL ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne LACIPIL'i kasutamist
3. Kuidas LACIPIL'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas LACIPIL'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON LACIPIL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

LACIPIL'i kasutatakse kõrgvererõhu (hüpertensiooni) raviks. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kaltsiumikanali blokaatoriteks. LACIPIL laiendab veresooni, mille tulemusena paraneb verevool ja alaneb vererõhk.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE LACIPIL'I KASUTAMIST

Ärge kasutage LACIPIL'i

- kui te olete allergiline (ülitundlik) latsidipiini või LACIPIL'i mõne koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6).
 - kui teil on südamehaigus, mida nimetatakse aordistenoosiks. See on südamest vere väljavoolu reguleeriva südameklapi ahenemine.
- ➔ Kui arvate, et midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, siis ärge võtke LACIPIL'i enne, kui olete nõu pidanud oma arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga LACIPIL

Enne LACIPIL-ravi alustamist peab arst olema teadlik sellest:

- kui teil esineb probleeme südamega.
- kui te põete maksahaigust.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Mõned ravimid võivad mõjutada LACIPIL'i toimet või suurendada kõrvaltoimete tekke tõenäosust.

Ka LACIPIL võib muuta mõnede teiste ravimite toimet. Nendeks on:

- teised vererõhku langetavad ravimid, nagu furosemiid, propranolool või kaptopriil;
- tsimetidiin (kasutatakse maohaavandite raviks);
- tsüklosporiin (kasutatakse siirdatud elundite äratõukereaktsiooni vältimiseks või teatud autoimmuunhaiguste korral).

➔ Teavitage oma arsti või apteekrit sellest, kui te võtate mõnda eespool loetletud ravimiteist.

LACIPIL'i võtmine koos toidu ja joogiga

Ärge jooge LACIPIL'i võtmise ajal greibimahla.

Rasedus ja imetamine

Puuduvad andmed LACIPIL'i ohutuse kohta rasedatel. Kui te olete rase, kahtlustate või planeerite rasedust, ärge võtke LACIPIL'i ilma arstiga nõu pidamata. Arst kaalub LACIPIL'i võtmisega seotud riske ja kasu teile ja teie lapsele.

LACIPIL'is sisalduvad koostisained võivad erituda rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga, pidage enne LACIPIL'i võtmist nõu oma arstiga.

Oluline teave mõningate LACIPIL'i koostisainete suhtes

LACIPIL sisaldab laktoosi (piimasuhkur). Kui teile on öeldud, et te ei talu teatud suhkruid, teavitage sellest arsti enne LACIPIL'i võtmist.

3. KUIDAS LACIPIL'I KASUTADA

Võtke LACIPIL'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

LACIPIL'i tavaline algannus on 2 mg üks kord päevas hommikul. Arst võib umbes 3...4 nädala möödudes suurendada annust 4 või 6 mg-ni, mis võetakse üks kord päevas hommikul.

Kuidas ravimit võtta

Neelake tablett koos veega.

Parim on ravimit võtta iga päev samal kellaajal.

LACIPIL'i võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui te võtate LACIPIL'i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju LACIPIL'i tablette, võivad suurema tõenäosusega tekkida madal vererõhk ja südametegevuse muutused (kiirenemine või aeglustumine).

➔ Pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate LACIPIL'i võtta

Kui te unustate annuse võtmata, võtke lihtsalt järgmine tablett tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Ärge lõpetage LACIPIL'i võtmist ilma arstiga nõu pidamata

Võtke LACIPIL'i senikaua, kui arst soovib. Ärge lõpetage ravimi võtmist enne, kui arst seda teha soovib.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka LACIPIL põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10st:

- ebakorrapärane südametegevus (südamepekslemine)
- südametegevuse kiirenemine (tahhükardia)
- vedeliku kogunemisest tingitud tursed
- pearinglus
- tavalisest suurem uriinieritus
- peavalu
- nahalööve (kaasa arvatud naha punetus ja sügelus)
- õhetus
- ebamugavustunne mao piirkonnas
- iiveldus

- nõrkustunne

Sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmned vereanalüüsid:

- alkaalseks fosfataasiks nimetatud ensüümi taseme pöörduv tõus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 100st:

- rindkerevalu (stenokardia e rinnaangiini) halvenemine
- minestus
- madal vererõhk
- igemete veritsus, valulikkus

Harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000st:

- tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo, keele või kõri turset, millega võib kaasneda neelamis- või hingamisraskus
- sügelev turses nahk

Väga harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10 000st:

- käte või jalgade värisemine ehk treemor
- depressioon

➔ Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või häirivaks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS LACIPIL'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage LACIPIL'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Võtke LACIPIL'i tablett fooliumpakendist välja vahetult enne sissevõtmist.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida LACIPIL sisaldab

- Toimeaine on latsidipiin. Tablett sisaldab 4 mg latsidipiini.
- Abiained on: tableti sisu: laktoos, povidoon K30, magneesiumstearaat, tableti kate: Opadry White YS-1-18043 (koosneb hüpromelloosist, titaandioksiidist, polüetüleenglükool 400 ja polüsorbaat 80) või Opadry White OY-S-7335 (koosneb titaandioksiidist ja hüpromelloosist), puhastatud vesi.

Kuidas LACIPIL välja näeb ja pakendi sisu

LACIPIL'i tabletid on ovaalsed valged tabletid, mille kummalgi küljel on poolitusjoon.

Tabletid on saadaval kahekordsest fooliumist blisterpakendites, 28 või 56 tabletti karbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ühendkuningriik.

Tootjad: Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, Aranda de Duero, Hispaania ja/või GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul Grunwaldzka 189, Poznan, Poola.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis: GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.

Telefon: +372 6676 900

Infoleht on viimati kooskõlastatud: mais 2014