

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Panadol Extra, 500 mg/65 mg õhukese polümeerikattega tabletid Paratsetamool/kofeiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on Panadol Extra ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Panadol Extra võtmist
3. Kuidas Panadol Extra-t võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Panadol Extra-t säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Panadol Extra ja milleks seda kasutatakse

Panadol Extra sisaldab kahte toimeainet: paratsetamooli, mis on valuvaigisti ja palavikualandaja ning kofeiini, mis täiendab valuvastast toimet.

Panadol Extra tablette kasutatakse palaviku ja nõrga valu korral.

Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Panadol Extra võtmist

Ärge võtke Panadol Extra-t:

- kui olete paratsetamooli või kofeiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Panadol Extra võtmist pidage nõu oma arstiga või apteekriga:

- kui teil on probleeme neerude või maksaga (sh Gilberti sündroom);
- kui teil on hemolüütiline aneemia;
- kui teil on ensüüm glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus.

See ravim sisaldab kofeiini. Vältige selle ravimi tarvitamisel ülemääraselt kofeiini sisaldavate jookide tarvitamist (nt tee, kohv ja kofeiini sisaldavad purgijoogid). Suur kofeiini tarbimine võib põhjustada unehäireid, värinaid ja südamepekslemisest põhjustatud ebamugavustunnet rinnus.

Muud ravimid ja Panadol Extra

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Pidage nõu oma arstiga enne Panadol Extra võtmist:

- kui võtate varfariini või teisi sarnaseid ravimeid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks;
- kui võtate ravimeid liivelduse ja oksendamise vastu (metoklopramiid, domperidoon) või vere kõrge kolesteroolitaseme alandamiseks (kolestüramiin).

Ärge võtke Panadol Extra-t koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Panadol Extra tablette ei ole soovitatav kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimil ei ole teadaolevalt tähelepanu ja keskendumisvõimet mõjutavat toimet.

3. Kuidas Panadol Extra-t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid:

2 tabletti iga 4 tunni järel või vastavalt vajadusele. Ärge võtke Panadol Extra tablette sagedamini kui 4-tunniste vahedega ja **mitte rohkem kui 8 tabletti 24 tunni jooksul.**

Ärge ületage ettenähtud annust.

Ärge võtke koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega.

Panadol Extra-t ei ole soovitatav anda alla 12-aastastele lastele.

Kui sümptomid püsivad, konsulteerige arstiga.

Kui te võtate Panadol Extra-t rohkem kui ette nähtud

Pöörduge koheselt arsti poole, kuna on oht maksakahjustuse tekkeks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage ravimi võtmine ja võtke oma arstiga otsekohe ühendust:

- kui teil esineb pärast Panadol Extra võtmist allergiline (ülitundlikkus) reaktsioon, mis väljendub nahalööbe või sügelemisena, millega võivad kaasneda hingamisraskused, huulte, keele-, kõri- või näoturse;
- kui teil esineb pärast Panadol Extra võtmist nahalööbe, ketendus või haavandid suus;
- kui teil on varem esinenud aspiriini või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete võtmisel hingamisraskusi ja te kogete sama Panadol Extra võtmisel;
- kui teil esineb pärast Panadol Extra võtmist seletamatuid verevalumeid või verejookse.

Sellised kõrvaltoimed esinevad harva.

Tee ja kohvi liigne tarvitamine koos Panadol Extra tablettidega võib esile kutsuda ärevus- ja pingetunde.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Panadol Extra-t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Panadol Extra sisaldab

Toimeained: iga tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli ja 65 mg kofeiini.

Abiained on: eelzelatiniseeritud tärklis, maisitärklis, povidoon, kaaliumsorbaat, talk, steariinhape, kroscarmelloosnaatrium, puhastatud vesi, hüpromelloos, triatsetiin.

Kuidas Panadol Extra välja näeb ja pakendi sisu

Valged, õhukese polümeerikattega lamedate servadega kapslikujulised tabletid, mille ühele küljele on sissepressitud kolmnurkne logo ja "+" märk, teine külg on tühi.

PVC/alumiiniumfooliumist blisterpakend ja HDPE tabletipurk keeratava polüpropüleenist korgiga, mis sisaldab 4, 6, 10, 12, 20, 24, 30, 48, 60 või 96 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloo hoidja:

GlaxoSmithKline Export Ltd.

980 Great West Road

Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Ühendkuningriik

Tootja:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.

Knockbrack

Dungarvan, Co Waterford

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloo hoidja kohaliku esindaja poole:

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Lõõtsa 8a

Tallinn 11415

Telefon: +372 6676 900

Infoleht on viimati koostöölstatud mais 2014