

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Uromitexan 100 mg/ml süstelahus Mesna

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on Uromitexan ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Uromitexan'i kasutamist
3. Kuidas Uromitexan'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Uromitexan'i säilitamine
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on UROMITEXAN ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on Uromitexan. Uromitexani manustatakse ainult siis, kui te kasutate ka ifosfamiidi või tsüklofosfamiidi.

Ifosfamiid ja tsüklofosfamiid võivad kahjustada teie põie limaskesta. Kahjustusele viitab vere ilmumine uriini. Väga väike kogus verd ei pruugi näha olla, nii et teie arst või meditsiiniõde analüüsib teie uriini testriba või mikroskoobiga, et kontrollida vere leidumist uriinis. Kui uriinis on suurem kogus verd, märkate, et uriin on punane ja väga harva võib näha olla ka verehüübeid.

Uromitexan kaitseb põie limaskesta ifosfamiidi ja tsüklofosfamiidi kahjustava toime eest.

2. Mida on vaja teada enne UROMITEXAN'I kasutamist.

Ärge kasutage Uromitexani:

- kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergiline reaktsioon võib hõlmata õhupuudust, vilistavat hingamist, löövet, näo ja huulte sügelust või turset;
- kui teil on kunagi olnud samalaadse ravimi suhtes allergiline reaktsioon.

Teile ei anta Uromitexani, kui mis tahes eespool nimetatust kehtib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, rääkige enne Mesna manustamist oma arsti, meditsiiniõde või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Mesna manustamist pidage nõu oma arsti, meditsiiniõde või apteekriga:

- kui teil on reumatoidartriit;
- kui teil on süsteemne erütematoosne luupus (nimetatakse ka luupus või SEL);

- kui teil on mingeid probleeme immuunsüsteemiga, mida nimetatakse autoimmuunhaiguseks (keha immuunsüsteem ründab iseennast).

Kui te ei ole kindel, kas miski eespool nimetatust kehtib teie kohta, rääkige enne Uromitexani manustamist oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Muud ravimid ja Uromitexan

Uromitexani manustatakse koos ifosfamiidi ja tsüklofosfamiidiga. Uromitexan ei reageeri nende ravimitega ja ei ole ka teada, et ta reageeriks mõne teise ravimiga. Siiski teatage alati oma arstile, meditsiiniõe või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Uromitexani kasutatakse ainult koos ifosfamiidi ja tsüklofosfamiidiga. Kui te olete rase ja arst arvab, et teid on vaja nende ravimitega ravida, vajate te ka Uromitexani. Enne selle ravimi manustamist pidage raseduse suhtes nõu oma arstiga.

Ärge imetage last sel ajal, kui te saate neid ravimeid.

Uromitexani kasutamise ajal tehtavad analüüsid

Teie arst või meditsiiniõde kontrollib regulaarselt vere leidumist teie uriinis spetsiaalse testriba või mikroskoobi abil.

Teatage oma arstile, meditsiiniõe või apteekrile, kui teile tehakse muul põhjusel uriini ribaanalüüsi, sest ravimid võivad tulemusi mõjutada. Ribaanalüüsi võidakse kasutada teie vere või uriini analüüsimiseks, et määrata teatud keemiliste ainete (mida nimetatakse ketoonideks) sisaldust veres või punaste vereliblede leidumist uriinis.

Uromitexan koos toidu, joogi ja alkoholiga

Toit ei mõjuta mesna imendumist ega uriiniga eritumist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõned Uromitexani kõrvaltoimed võivad mõjutada teie võimet juhtida autot ja käsitseda masinaid. Arst otsustab, kas teil on ohutu seda teha.

Mida teha, kui lähete mõne teise arsti juurde või peate haiglasse minema

Kui te lähete mõne teise arsti juurde või peate mingil põhjusel minema haiglasse, öelge arstile, milliseid ravimeid te saate. Ärge võtke mitte mingeid muid ravimeid enne, kui teie arst teab, et te kasutate Uromitexani.

Uromitexan sisaldab naatriumedetaati, naatriumhüdroksiidi ja steriilset süstevett.

3. Kuidas UROMITEXAN'I kasutada

Ravimi kasutamine

Uromitexanit võidakse teile süstida või anda suu kaudu.

- Kui Uromitexani manustatakse süstina, teeb seda arst või meditsiiniõde.
- Uromitexani manustamisel suu kaudu segatakse see maitsestatud joogi, näiteks apelsinimahla või koolaga, mis muudab maitse meeldivaks ja allaneelamise lihtsamaks.
- Kui te kasutate Uromitexani, peate iga päev jooma piisavalt vedelikku, et säilitada uriinieritust 100 ml tunnis.

- See aitab uriini lahjendada ja tagab hea uriinivoolu, mis kaitseb teie põit. Teil tuleb oma põit tühjendada (urineerida) nii nagu tavaliselt. Ärge püüdke oma tavalist urineerimisharjumust muuta.

Tavaline annus

- Teie arst otsustab, kui palju ravimit te vajate ja millal seda teile manustatakse. Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud.
- Annus sõltub:
 - ifosfamiidi või tsüklofosfamiidi annusest ja manustamise ajast;
 - kas ifosfamiidi või tsüklofosfamiidi manustatakse teile süstina või antakse suu kaudu tablettidena;
 - kas te põete kuseteede nakkusi (urotrakti infektsioone);
 - kas teil on kunagi varem olnud ifosfamiidist või tsüklofosfamiidist tingitud märke põiekahjustusest;
 - kas teile on tehtud kiiritusravi põie läheduses.

Kui te ei ole kindel, kuidas teile süst tehakse või millal te ravimit võtma peate, küsige oma arstilt, meditsiiniõelt või apteekrilt.

Kui te unustate Uromitexani kasutada

On väga oluline, et te võtaksite Uromitexani arsti määratud ajal.

Ajad on hoolikalt välja arvestatud, et kindlustada teile täielik kaitse põiekahjustuste eest.

- Kui teid süstib arst või meditsiiniõde, on väga ebatõenäoline, et teil annus vahele jääb. Kui te arvate, et teil on süst vahele jäänud, rääkige sellest arstile või meditsiiniõele nii kiiresti kui võimalik.
- Kui teile antakse Uromitexani koos joogiga ja te unustate annuse võtta, tarvitage see ära niipea, kui see teile meenub. Seejärel pöörduge kohe oma arsti poole või lähimasse haiglasse.

Kui te kasutate Uromitexan-i rohkem kui ette nähtud

Ei ole tõenäoline, et teile süstitakse ettenähtust rohkem Uromitexani, sest seda manustavad teile väljaõppe saanud ja kvalifitseeritud meditsiinitöötajad. Nad lõpetavad süstimise kohe, kui ravimit on liiga palju.

Kui te võtate ravimit koos joogiga ja arvate, et olete saanud seda liiga palju või kui laps on ravimit alla neelanud, rääkige kohe arstiga või minge haiglasse. Võtke kindlasti kaasa etiketiga ravimipakend, isegi kui see on tühi.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Uromitexaniga seoses on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest.

Rääkige kohe oma arstile, kui te märkate mõnda järgmistest kõrvaltoimetest, sest võite vajada kiiret arstiabi:

- kui teil tekib pärast Uromitexani võtmist iiveldus ja te oksendate, võite vajada Uromitexani manustamist süstina;
- harva võib Uromitexan põhjustada seisundi, mis meenutab allergilist reaktsiooni. Sümptomid võivad hõlmata nahalööbeid ja marrastusi, sügelevat nahka, ville suus või nahal, äkilist vererõhu langust (pearinglus), sagenenud südamelööke ja muutusi vereanalüüsides, mis näitavad, kas teie maks töötab korralikult.

Mõned neist kõrvaltoimetest võivad olla põhjustatud ifosfamiidist või tsüklofosfamiidist, mitte Uromitexanist, sest neid võetakse alati koos.

Muud võimalikud kõrvaltoimed:

- iiveldus, kõhulahtisus, peavalu;
- hootine kõhuvalu (koolikud);
- väsimus, masendus- või ärritustunne;
- lööve, kiirem pulss;
- madal vererõhk, millele võib viidata pearinglus või peapööritus;
- jalgade, käte või liigeste valu;
- energia puudumine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas UROMITEXAN'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

- Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast EXP {kuupäev PP.KK.AAAA}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
- Ärge hoidke ampulle temperatuuril üle 30 °C. Hoida ampulle välispakendis, valguse eest kaitstult.
- Kui Uromitexan on joomiseks valmis segatud, säilitage segu külmkapis suletud nõus mitte üle 24 tunni.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave**Mida Uromitexan sisaldab**

Toimeaine on mesna. Üks ampull 4 ml sisaldab 400 mg mesnat.

Teised abiained on: Naatriumedetaat, naatriumhüdroksiid, steriilne süstevesi.

Kuidas Uromitexan välja näeb ja pakendi sisu

Süstelahus on selge värvitu steriilne lahus, mida tarnitakse 5 ml läbipaistvast klaasist ampullis. Igas karbis on 15ampulli.

Tootja ja müügiloa hoidja

Baxter Oncology GmbH
Kantstrasse 2
D-33790 Halle
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Baxter Estonia
Kungla 2
Saue76505
Telefon 6 515 120

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2014