

## **Pakendi infoleht: teave kasutajale**

### **MST CONTINUS 30 mg, suukaudse suspensiooni toimeainet prolungeeritult vabastavad graanulid Morfiinsulfaat**

#### **Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on MST CONTINUS ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne MST CONTINUS'e kasutamist
3. Kuidas MST CONTINUS't kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas MST CONTINUS't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on MST CONTINUS ja milleks seda kasutatakse**

MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolungeeritult vabastavad graanulid sisaldavad morfiinsulfaati, mis on tugev valuvaigisti ning kuulub opioidide ravimrühma.

MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolungeeritult vabastavaid graanuleid kasutatakse tugeva valu raviks.

#### **2. Mida on vaja teada enne MST CONTINUS'e kasutamist**

##### **Ärge kasutage ravimit MST CONTINUS:**

- kui te olete morfiini, Ponceau 4R (E124) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
- kui teil on seisund, mille korral teie sooled on blokeeritud (iileus),
- kui teil on teadmata põhjusega äge kõhuvalu (äge kõht).

##### **Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga MST CONTINUS:**

- kui te olete sõltuv opioididest,
- kui teil on teadvushäired,
- kui teil on seisund, mille korral esinevad või peab vältima hingamiskeskuse ja hingamisfunktsiooni häireid,
- kui teil on südamehaigus, mis tuleneb kopsuvereringe kroonilisest ülekoormusest (kopssüda),
- kui teil on hingamisprobleemid, nagu nt raske bronhiaalastma või krooniline raske obstruktiivne hingamisteede haigus,
- kui teil on seisund, mille korral on suurenenud ajusisene rõhk,
- kui teil on madal vererõhk, mis on seotud ringleva vere vähese mahuga (hüповoleemiast tingitud hüpotensioon),
- kui teil on eesnäärme suurenemine (prostata hüpertroofia) koos kusepõie tühjendamise järgse jääkuriiniga (risk kusepõie rebendi tekkeks (st kusepõis võib lõhkeda) uriinipeetuse tõttu),
- kui teil on kuseteede kitsenemine või koolik,
- kui teil on sapiteede haigus,

- kui teil on obstruktiivne (soolte kitsenemisega seotud) ja põletikuline soolte haigus,
- kui teil on neerupealise kasvaja (feokromotsütoom),
- kui teil on pankrease põletik (pankreatiit),
- kui teil on raske neerufunktsiooni häire,
- kui teil on rasked maksaprobleemid,
- kui teil on kilpnäärme alatalitus (hüpotüreoidism),
- kui teil on epilepsia või suurenenud krambivalmidus.

Pikemaajaline MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite kasutamine võib viia taluvuse (tolerantsi) kujunemisele ning sellest tuleneva vajaduseni kasutada soovitava valuvaigistava toime saavutamiseks suuremaid annuseid. Pikaajaline MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite kasutamine võib viia füüsilise sõltuvuse tekkeni ja järsk ravi lõpetamine võib tekitada võõrutusnähte. Kui ravi morfiiniga ei ole enam vajalik, võib olla soovitav annuse järk-järguline vähendamine, et vältida võõrutusnähte.

Morfiinsulfaadi puhul on võimalik kuritarvitamine nagu teiste tugevate opioidide korral. Esineb võimalus psühholoogilise sõltuvuse tekkeks. MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavaid graanuleid peab seetõttu kasutama erilise ettevaatusega patsientidel, kellel esineb praegu või on esinenud minevikus alkoholi või ravimite kuritarvitamist. MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavaid graanuleid tuleb kasutada ettevaatusega enne ja 24 tunni jooksul pärast operatsiooni (kuna esineb risk soole liikuvuse pidurdumiseks või hingamise pärssimise tekkeks).

Väga harva, eriti suurte annuste korral, tekib valutundlikkuse suurenemine (hüperalgeesia), mis ei allu MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite annuse edasisele tõstmisele. Teie arst otsustab, kas annuse vähendamine või muutus (opioid)valuvaigisti ravis on sellises olukorras vajalik.

Kui teil on neerupealise koore haigus (nt Addisoni tõbi), kontrollib arst neerupealiste koore hormooni sisaldust veres (vereplasma kortisooli kontsentratsioon) ja vajadusel määrab teile sobiva ravimi (kortikosteroidi).

### **Enne ravi MST CONTINUS'ega**

Morfiiniravile tüüpiline kõrvaltoime on kõhukinnisus. Te peaksite hakkama lahtistit võtma juba alates morfiiniravi algusest, eriti kui teil on enne morfiini kasutamist esinenud probleeme soole liikuvusega. Konsulteerige oma arstiga.

### **Fertiilses eas mehed ja naised**

Morfiinil on mutageensed omadused (mis tähendab, et see põhjustab geneetilisi muutusi) ja seetõttu tohib seda fertiilses eas meestele ja naistele manustada ainult juhul, kui nad kasutavad tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid.

### **Lapsed**

MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite kasutamise kohta alla 12-aastastel lastel on andmeid ebapiisavalt.

### **Eakad**

Eakatele tuleb MST CONTINUS't manustada erilise ettevaatusega (vt *Kuidas MST CONTINUS't kasutada*).

### **Tagajärjed väärkasutamisel dopingu eesmärgil**

MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite kasutamine võib anda dopingukontrollis positiivse tulemuse.

### **Muud ravimid ja MST CONTINUS**

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Morfiini ja KNS-pärssijate (ravimid, mis nõrgendavad ajufunktsiooni) [nagu ärevushäirete ravimid (rahustid), depressiooni ravimid (antidepressandid), vaimsete häirete ravimid (neuroleptikumid), tuimestuses kasutatavad ravimid (anesteetikumid), unehäirete ravis kasutatavad ravimid (hüpnootikumid ja sedatiivsed ained, barbituraadid), gabapentiin, allergiate või merehaiguse ravis kasutatavad ravimid (antihistamiinid/antiemeetikumid), teiste tugevate valuvaigistite (opioidid)] samaaegne kasutamine võib põhjustada morfiini kõrvaltoimete, eriti hingamist pärssiva toime tugevnemist.

Antikolinergilise toimega ravimid (nagu psühhoaktiivse toimega ravimid, allergiaravimid, oksendamise vastased ravimid, Parkinsoni tõve ravimid) võivad suurendada opioidide antikolinergilisi kõrvaltoimeid (nagu kõhukinnisus, suukuivus, urineerimishäired).

Tsimetidiin (kasutusel maohaavandite ravis) ja teised ravimid, mis kõrvaltoimena mõjutavad maksas toimuvat ainevahetust, võivad pidurdada morfiini lagundamist ja seega tõsta morfiini kontsentratsiooni veres.

MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolungeeritult vabastavaid graanuleid ei tohi kasutada koos monoamiinoksüdaasi (MAO) inhibiitoritega (depressiooni ravimid). Patsiendid, keda on MAO-inhibiitoritega ravitud 14 päeva jooksul enne opioidiga (petidiin) ravi alustamist, on kogenud eluohtlikke koostoimeid, mis mõjutavad aju (kesknärvisüsteem), hingamise ja vereringe tööd. Sarnaseid kõrvaltoimeid MAO inhibiitorite kasutamisel ei saa välistada ka MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolungeeritult vabastavate graanulite kasutamisel.

Morfiin võib tugevdada lihaseid lõõgastavate ravimite (lihaskõõgastite) toimet.

Samaaegne rifampitsiini (tuberkuloosi ravim) kasutamine võib morfiini toimet vähendada.

### **MST CONTINUS koos toidu ja joogiga**

Kui te joote MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolungeeritult vabastavate graanulite võtmise ajal alkoholi, võite te tunda ennast rohkem unisemalt või suureneb tõsiste kõrvaltoimete (nagu pindmine hingamine koos hingamisreisaku ja teadvusekaoga) tekkerisk. Soovitatakse on MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolungeeritult vabastavate graanulite võtmise ajal alkoholi mitte juua.

### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Loomkatsetest on tõendeid kahjulikust toimest morfiiniga ravitud emasloomade järglastele. Seetõttu ei tohi te MST CONTINUS't raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul kui teie arst peab morfiinravi tingimata vajalikuks ja sellest saadav kasu teile on palju suurem kui risk lapsele. Morfiinil on mutageensed omadused (mis tähendab, et see põhjustab geneetilisi muutusi) ja seetõttu tohib seda fertiilses eas meestele ja naistele manustada vaid juhul, kui nad kasutavad efektiivset rasestumisvastast vahendit.

Pärast morfiini pikaajalist kasutamist raseduse ajal on teatatud võõrutusnähtudest vastsündinutel.

Morfiin eritub rinnapiima ja saavutab lapse jaoks toimiva kontsentratsiooni. Seetõttu ei ole rinnaga toitmine soovitatav.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolungeeritult vabastavad graanulid võivad muuta halvemaks tähelepanuvõimet ja reaktsiooniaega. Sel juhul ei ole te enam võimeline reageerima piisavalt kiiresti ja efektiivselt ootamatutele ja äkilistele sündmustele.

Konsulteerige oma arstiga, kas ja mis tingimustel te võite nt autot juhtida.

Tugevam negatiivne toime on eriti tõenäoline ravi alustamisel, annuse suurendamisel või üleminekul teisele ravimile ja kombinatsioonis koos alkoholiga või trankvillisaatorite kasutamisega. Sellises olukorras ärge juhtige autot ega teisi mootorsõidukeid. Ärge käsitsege elektrilisi tööriistu ega masinaid. Ärge töötage kõrgustes.

**MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolungeeritult vabastavad graanulid sisaldavad Ponceau 4R (E124).** Ponceau 4R võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

## **3. Kuidas MST CONTINUS't kasutada**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **Manustamisviis**

Suukaudne.

MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite annus peab põhinema valu tugevusel ja patsiendi individuaalsel tundlikkusel.

Ravi alustatakse tavaliselt lühitoimelise morfiiniga (tablett või lahus), et selgitada välja valu kontrollimiseks vajalik annus. Seejärel viiakse patsient üle vastavale MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite ööpäevasele annusele. Säilinud valu (läbilöögivalu) ravitakse lühitoimelise morfiini annustega (tableti või lahusega). Toimeainet prolongeeritult vabastavat morfiini võetakse tavaliselt 12 tunnise intervallidega, manustamine sõltub valu raskusest ja patsiendi vanusest ning eelnevast analgeesia vajadusest.

Kui teie arst ei ole välja kirjutanud teisiti, on täiskasvanute ja üle 12-aastaste noorukite tavaline annus: 1 pakike MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavaid graanuleid kaks korda ööpäevas.

### **Ravi kestus**

Ravi kestuse otsustab teie arst sõltuvalt teie valust.

MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavaid suukaudse suspensiooni graanuleid ei tohi kunagi kasutada kauem kui tingimata vajalik. Patsientidel, kellel haigusseisundi iseloomu ja raskuse tõttu on vajalik pikaajaline valuravi MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate suukaudse suspensiooni graanulitega, peab seda vajadust regulaarselt lühikeste intervallide järel hindama (nt ravi katkestamise teel; vt *Kui te lõpetate MST CONTINUS'e võtmise*), kas ja kui suures ulatuses on säilinud meditsiiniline vajadus valu kontrolliks selle ravimiga. Patsient võib vajada üleviimist sobivamale ravivormile.

Kroonilise valu ravis on eelistatud fikseeritud skeemiga manustamine.

### **Neeru- ja maksaprobleemidega patsiendid**

Maksa- või neeruprobleemidega või arvatava aeglustunud mao-soolepassaažiga patsientidel tuleb MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate suukaudse suspensiooni graanulite annust tiitrida erilise ettevaatusega.

### **Eakad patsiendid**

Eakad patsiendid (reeglina vanemad kui 75 eluaastat) ja halvas üldseisundis patsiendid võivad olla morfiinile tundlikumad. Seega tuleb annuseid kohandada suurema ettevaatlikkusega ja/või manustada annuseid pikema ajavahemikuga. Võib osutada vajalikuks kasutada väiksemaid toimeaine tugevusi.

### **Erijuhised annuse kohandamisel**

Annuse esmaseks kohandamiseks peab kasutama morfiini lühitoimelist ravivormi. Annuse kohandamiseks võib vajadusel kasutada morfiini madalama toimeaine sisaldusega ravivorme, võimalik, et ka kombinatsioonis koos olemasoleva ravi, morfiini toimeainet prolongeeritult vabastava ravivormiga.

Üldiselt tuleb kasutada väikseimat annust, mille analgeetiline toime on individuaalselt piisavalt tõhus.

Kui te saate muud täiendavat valuravi (nt operatsioon, närvipõimiku blokaad), peab annust pärast protseduuri tõenäoliselt uuesti tiitrima. Vajadusel teeb seda teie arst.

Pakikese sisu võib segada veega suspensiooniks ja juua, puistada pehmele toidule, nt jogurtile või manustada toitmissondi kaudu. Suspensiooni on soovitatav võtta hommikuti ja õhtuti.

Toimeainet prolongeeritult vabastavaid graanuleid saab manustada toitmissondidega, mille suurus on alates CH 8. Pange toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid mõõdunõusse ja lisage pakikese sisule 20 ml vett. Segage hoolikalt. Tõmmake homogeenne suspensioon süstlasse, ühendage see

toitmissondiga ja süstige suspensioon. Lõpuks loputage nagu tavaliselt. Veenduge, et mõõdunõusse või süstlasse ei jäänud graanuleid.

Kui teil on tunne, et MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### **Kui te võtate MST CONTINUS't rohkem kui ette nähtud**

Kui te võtate MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavaid graanuleid rohkem kui ette nähtud, peate otsekohe pöörduma lähima arsti poole.

Teil võib tekkida mõni järgmistest sümptomitest: silma pupillide ahenemine, hingamise kahjustus kuni hingamise peatumiseni, teadvushäire kuni koomani, vererõhu langus kuni šokini, kiirenenud südame töö, krampid ja lihaste kahjustus kuni lihaste lagunemiseni (koos võimaliku järgneva neerupuudulikkusega). Tugevate opioidide üleannustamine võib olla surmav.

Ärge osalege tegevustes, mis nõuavad kõrgendatud tähelepanu, nt autojuhtimine.

Üleannustamise puhul võib arsti tulekut oodates kasu olla järgmistest toimingutest: hoidke patsient ärkvel, käskige hingata, abistage hingamisel.

#### **Kui te unustate MST CONTINUS't võtta**

Kui te võtate väiksema annuse MST CONTINUS't kui peaks või kui te unustate MST CONTINUS't võtta, võib kontroll valu üle väheneda või kaduda.

Kui te unustasite võtmata üksikannuse, võite te unustatud annuse võtta, kui järgmise annuse võtmiseni on jäänud rohkem kui 8 tundi. Seejärel võite pöörduda tagasi fikseeritud raviskeemi juurde.

Kui järgmise regulaarse annuse võtmiseni on vähem kui 8 tundi, võtke samuti MST CONTINUS't. Sel juhul tuleb siiski annustamise režiimi muuta. Rääkige oma arstiga, kuidas edasi toimida. Tavaliselt ei tohi MST CONTINUS't võtta sagedamini kui iga 12 tunni järel. Ärge võtke kunagi kahekordset annust.

#### **Kui te lõpetate MST CONTINUS'e võtmise**

Kui te soovite ravi katkestada või lõpetada, rääkige alati oma arstile katkestamise põhjustest ja arutage oma edasist ravi.

MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate suukaudse suspensiooni graanulite pikaajaline kasutamine võib põhjustada füüsilist sõltuvust. Järsk ravi katkestamine võib seetõttu kaasa tuua võõrutusnähud. Nende hulgas võivad olla peavalu, lihaskrambid, ärevus, pinge, väsimus, segasus, ärrituvus, korduv unetus, meeleolu muutused, hallutsinatsioonid ja krampid.

Kuna risk võõrutusnähtude tekkeks on suurem ravi järsul katkestamisel, peab annust ravi katkestamisel vähendama järk-järgult.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimeid on hinnatud järgmiste sageduste alusel:

Väga sage: rohkem kui 1 kasutajal 10-st
Sage: 1 kuni 10 kasutajal 100-st
Aeg-ajalt: 1 kuni 10 kasutajal 1000-st
Harv: 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st
Väga harv: vähem kui 1 kasutajal 10 000-st
Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

**Olulised kõrvaltoimed või nähud, millest te peate olema teadlik ning meetmed nende tekkimise korral:**

Kui teil tekib mõni järgmistest olulistest kõrvaltoimetest, võtke otsekohe ühendust arstiga. Opioidi üleannustamisel on peamine oht pinnapealne ja aeglustunud hingamine (hingamise pärssimine). See tekib peamiselt eakatel või halvas üldseisundis patsientidel.

## **Muud võimalikud kõrvaltoimed**

### Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt: allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus)

Teadmata: ägedad allergilised üldised reaktsioonid, sh järsku tekkinud hingamisraskused, naha turse ja/või vererõhu järsk langus (anafülaktilised reaktsioonid)

MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolungeeritult vabastavad graanulid sisaldavad värvainet Ponceau 4R (E124). Ponceau 4R võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

### Endokriinsüsteemi häired

Väga harv: antidiureetilise hormooni vääresekretsiooni sündroom (SIADH)

### Psühhiaatrilised häired

Morfiin võib põhjustada erinevaid vaimseid kõrvaltoimeid, mille raskus ja iseloom on patsientidel erinev (sõltudes isiksusest ja ravi kestusest).

Sage: muutused aktiivsuses (tavaliselt vähenenud aktiivsus, kuid ka suurenenud aktiivsus või erutus seisund), unehäired, segasusseisund

Aeg-ajalt: ärritus, eufooria, hallutsinatsioonid, tujumuutused

Teadmata: mõtlemishäired, ravimsõltuvus, düsfooria

### Närvsüsteemi häired

Sage: peavalu, pearinglus, tahtmatud lihaste kokkutõmbed, unisus

Aeg-ajalt: krambid, hüpertoonia, sipelgate jooksmise tunne nahal (paresteesia), minestus

Väga harv: lihasvärin, ebaharilik valutundlikkus (allodüünia)

Teadmata: annusest sõltuv erutuse vähenemine (sedatsioon), valutundlikkuse suurenemine (hüperalgeesia, vt lõik 4.4)

### Silma kahjustused

Aeg-ajalt: nägemishäired

Teadmata: pupillide ahenemine (mioos)

### Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt: peapööritus

### Südame häired

Aeg-ajalt: pulsi kiirenemine (tahhükardia), pulsi aeglustumine (bradükardia)

Teadmata: südamepekslemine, südamepuudulikkus

### Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt: vererõhu langus, vererõhu tõus, näo õhetus

### Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt: kopsuturse, pinnapealne ja aeglustunud hingamine, vilisev hingamine (bronhospasm)

Väga harv: hingamisraskused (düsnoe)

Teadmata: vähenenud köhimine (pärstid köharefleks)

### Seedetrakti häired

Väga sage: kõhukinnisus (pikaajalise ravi ajal), iiveldus

Sage: oksendamine (eriti ravi algul), kõhuvalu, isutus, suukuivus

Aeg-ajalt: soolesulgus, maitsetundlikkuse muutused, seedehäired (düspepsia)

Harv. kõhunäärme ensüümide aktiivsuse suurenemine, kõhunäärme põletik

Väga harv: hammaste kahjustused, kuigi põhjuslik seos morfiiniraviga ei ole kindel

#### Maksa ja sapiteede häired

Aeg-ajalt: maksaensüümide aktiivsuse tõus

Teadmata: sapikoolikud

#### Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage: liighigistamine, lööve

Aeg-ajalt: nõgeslööve

#### Lihaskoe ja sidekoe kahjustused

Väga harv: lihaste jäikus

#### Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt: uriinipeetus

Harv: neerukoolik

#### Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Teadmata: vähenenud libiido, impotentsus (ereksioonihäired), menstruaalperioodi puudumine

#### Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage: üldine nõrkus, sügelus

Aeg-ajalt: käte, hüppeliigete või labajala piirkonna tursed (perifeerne turse)

Väga harv: külmavärinad

Teadmata: kurnatus, ravimtaluvus, ravimi ärajätusündroom

#### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu.

Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas MST CONTINUS't säilitada**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

#### **Stabiilsus pärast avamist või valmistamist**

Ravim tuleb võtta koheselt pärast valmistamist.

## **6. Pakendi sisu ja muu teave**

#### **Mida MST CONTINUS sisaldab**

- Toimeaine on morfiinsulfaat. Üks pakike (0,583 g) graanuleid sisaldab 30 mg morfiinsulfaati (63 mg morfiin-polü(stürool-ko-divinüülbenseen)sulfonaadina, mis vastab 22,5 mg morfiinile).
- Abiained on resiinne katioonvahetaja, ksülitool, ksantaankummi, vaarika maitse- ja lõhnaaine ning erkpunane värvaine Ponceau 4R (E124).

Igas karbis on 10, 20, 30 või 60 pakikest graanulitega.

#### **Müügiloa hoidja:**

Mundipharma Ges.m.b.H., Apollogasse 16-18, A-1070 Viin, Austria.

**Tootja:**

Mundipharma GmbH, Mundipharmastraße 2, 65549 Limburg/Lahn, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ KBM Pharma  
Tähtvere 4  
51007 Tartu  
Tel: +372 733 8080

**Infoleht on viimati koostöölstatudmais 2014**