

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Sinupret, kaetud tabletid

Raudürdiürt, emajuurejuur, hapu oblikas, leedriõis, nurmenukuõis.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 7...14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Sinupret ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Sinupret'i kasutamist
3. Kuidas Sinupret't kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Sinupret't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Sinupret ja milleks seda kasutatakse

Sinupret on taimne ravim, mida kasutatakse täiendava ravina sekreedi vedeldamiseks ninakõrvalurgete (sinusiit) ägeda põletiku ja kroonilise põletiku ägenemise korral.

Kui pärast 7...14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Sinupret'i kasutamist

Ärge kasutage Sinupret't

- kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

See ravim sisaldab glükoosi, laktoosi, sahharoosi ja sorbitooli. Sinupret't ei tohi kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik fruktoosi või galaktoosi talumatus, laktaasi defitsiit, glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni sündroom, sahharoosi-isomaltosaasi defitsiit.

Kui sümptomid kestavad kauem kui 7...14 päeva, tekivad perioodiliselt uuesti või kui ilmnevad düspnoe, palavik või mädane röga, on vajalik konsulteerida arstiga.

Lapsed

Alla 6-aastastel lastel ei ole soovitatav kasutada seoses küllaldaste andmete puudumisega.

Muud ravimid ja Sinupret

Koostoimed teiste ravimitega ei ole teada.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Sinupret koos toidu, joogi ja alkoholiga

Maohäiretega patsientidel soovitatav võtta tablette pärast sööki .

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate, arvate end olevat rase või kavatsete raseduda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Nagu kõiki ravimeid, võib Sinupret´ti kasutada raseduse ja imetamise ajal ainult arsti ettekirjutusel, kui see on hädavajalik.

Loomkatsetes ei täheldatud Sinupret´i toimet fertiilsusele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

Sinupret sisaldab glükoosi, laktoosi, sahharoosi ja sorbitooli.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, palun konsulteerige arstiga enne kui alustate Sinupret tablettide võtmist.

Üks tablett sisaldab suhkruid, mis vastab 0,01 LÜ (leivaühik).

3. Kuidas Sinupret´ti kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

täiskasvanud ja noorukid alates 12. eluaastast - 2 kaetud tabletti 3 korda päevas.

Kasutamine lastel

6...11-aastased lapsed - 1 kaetud tablett 3 korda päevas.

Sinupret tabletid neelatakse alla tervelt, vähese koguse veega (nt klaasi veega)

Maohäirete korral on ravimit soovitatav võtta pärast sööki.

Sinupret tablette ei tohiks võtta kauem kui 7...14 päeva (vt Hoiatused ja ettevaatusabinõud).

Kui te kasutate Sinupret´ti rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud Sinupret´ti rohkem lubatud annusest, siis võtke ühendust oma arstiga, kes otsustab missugused abinõud tuleks kasutusele võtta.

Üleannustamine võib võimendada kõrvaltoimeid.

Kui te unustate Sinupret´ti võtta

Ärge võtke kahekordset annust kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravimi võtmist vastavalt instruktsioonile.

Kui te lõpetate Sinupret´i võtmise

Sinupret tablettide võtmise lõpetamine ei põhjusta probleeme.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimeid hinnatakse järgmiselt:

väga sage ($\geq 1/10$)

sage ($\geq 1/100$, kuni $< 1/10$)

aeg-ajalt ($\geq 1/1000$ kuni $< 1/100$)

harv ($\geq 1/10000$) kuni $< 1/1000$)
väga harv ($< 1/10000$)
teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Aeg-ajalt esinevad seedetrakti häired (nt iiveldus, maovalu).
Harva tekivad naha ülitundlikkusreaktsioonid (nt nahalööve, nahapunetus, sügelus).
Harva võivad ilmned ka allergilised reaktsioonid (nt lokaalne nahaturse, raskendatud hingamine, näoturse).

Esimeste ülitundlikkuse/allergilise reaktsiooni nähtude ilmnedes ei tohi Sinupret´ti edasi võtta.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Sinupret´ti säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ravimit hoida originaalpakendis, kaitstuna valguse ja niiskuse eest.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sinupret sisaldab

Toimeained

Üks kaetud tablett sisaldab järgmisi pulbristatud drooge

Raudürdiürt 18 mg

Emajuurejuur 6 mg

Nurmenukuõis 18 mg

Hapu oblikas 18 mg

Leedriõis 18 mg

Abiained

Klorofüll, kaltsiumkarbonaat, veevaba kolloidne räni, dekstriin, eudragit E 12,5, želatiin, indigokarmiin-alumiiniumlakk (E132), riboflaviin (E101), laktoosmonohüdraat, kerge magneesiumoksiid, vedel pihustuskuivatatud glükoos, maisitärklis, montaanglükoolvaha, kartulitärklis, puhastatud vesi, šellak, sorbitool, steariinhape, sahharoos, talk, titaandioksiid, rafineeritud riitsinusõli.

Kuidas Sinupret välja näeb ja pakendi sisu

Ümmargused, kaksikkumerad, rohelised sileda pinnaga tabletid, 25 tableti kaupa blisterpakendis.

Pakendid: 50, 100, 200 ja 500 kaetud tabletti pappkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Bionorica SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
D-92318 Neumarkt
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Miecys-Pharm OÜ
Vitamiini 4
Tartu 51014
Eesti
Tel.:+372 738 0676.

Infoleht on viimati koostöölstatud märtsis 2015