PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Cyklokapron 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Traneksaamhape

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Cyklokapron ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Cyklokapron'i võtmist
3. Kuidas Cyklokapron'it võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Cyklokapron'it säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON CYKLOKAPRON JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Cyklokapron kuulub antifibrinolüütikute nime all tuntud ravimite rühma. Neid ravimeid kasutatakse veritsuse vähendamiseks. Teile võidakse seda välja kirjutada järgnevatel põhjustel: pärast eesnäärmeoperatsiooni, suurte verejooksude korral menstruatsiooni ajal, ninaverejooksude puhul, emakakaela operatsioonide puhul, hamba väljatõmbamise korral hemofiilikutel, päriliku haiguse puhul, mida nimetatakse angioneurootiliseks turseks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE CYKLOKAPRON`I VÕTMIST

Ärge võtke Cyklokapron'i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) traneksaamhappe või Cyklokapron'i mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on aktiivne trombembooliline haigus**.**
- kui teil on raske neerupuudulikkus

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cyklokapron
- ebakorrapärase menstruatsiooni verejooksu puhul
- kui teil on kunagi esinenud trombi, nt jalas või kopsus
- neeruhaiguse korral
- dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni korral
- vere esinemisel uriinis

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Kliinilised kogemused Cyklokapron'i kasutamisest rasedatel on piiratud. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Cyklokapron eritub rinnapiima, kuid terapeutiliste annuste kasutamisel on toime imikule ebatõenäoline. Igatahes pidage enne ravi alustamist arstiga nõu.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim ei oma toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.

3. KUIDAS CYKLOKAPRON'I VÕTTA

Võtke Cyklokapron'i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanutele on 2…3 tabletti 2…3 korda ööpäevas. Olenevalt, mis näidustusel teile seda rohtu antakse, võivad annused olla erinevad.

Menorraagia.
Soovitatav annus on 2…3 tabletti 3…4 korda ööpäevas niikaua kui vaja kuni 4 päeva. Väga tugevate menstruatsiooni verejooksude korral võib annust suurendada 2 tabletini 6 korda ööpäevas. Ravi ei tohi alustada enne menstruatsiooni vereerituse algust.
Raskekujuline ninaverejooks.
Kui on oodata korduvaid verejookse, tuleb rakendada suukaudset manustamist 3 tabletti (1,5 g) 3 korda ööpäevas 4…10 päeva vältel.
Emakakaela konisatsioon.
3 tabletti 3 korda ööpäevas 12…14 päeva jooksul pärast operatsiooni.
Pärilik angioneurootiline turse.
Mõned patsiendid on teadlikud oma haigushoo algusest; nendel patsientidel on sobivaks annuseks 2…3 tabletti vahelduvalt 2..3 korda ööpäevas mõne päeva jooksul. Teistel patsientidel tuleb sama annusega jätkata pidevat ravi.

Tablette tuleb võtta koos klaasitäie veega. Tabletid tuleb tervelt alla neelata. Ärge purustage või närige tablette.

Kui teil on tunne, et Cyklokapron'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Cyklokapron'it rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate kogemata liiga palju Cyklokapron'i tablette, pöörduge viivitamatult meditsiinilise abi saamiseks arsti poole.
Üleannustamise sümptomid: pearinglus, peavalu, iiveldus, kõhulahtisus.

Kui te unustate Cyklokapron'it võtta
Kui te unustasite tablette võtta, võtke järgmine annus harilikul ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Cyklokapron põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage (>1/100, <1/10): iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Kõrvaltoimed kaovad annuse vähendamisel. Konsulteerige sellel teemal oma arstiga.

Harv (<1/10000, <1/1000): värvide nägemise häired.
allergilised nahareaktsioonid.

Väga harv (≤1/10 000): trombemboolia juhud.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS CYKLOKAPRON'IT SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitada temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Cyklokapron'it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Cyklokapron sisaldab

- Toimeaine on traneksaamhape. Iga Cyklokapron'i õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg traneksaamhapet.
- Abiained on mikrokristalne tselluloos, hüdroksüpropüültselluloos, talk, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba räni ja povidoon. Tabletid on kaetud metakrülaatpolümeeri, titaandioksiidi (E 171), talgi, magnesiumstearaadi, polüetüleenglükool 8000 ja vaniliiniga.

Müügiloa hoidja
Meda AB,
Box 906,
17004 Solna,
Rootsi.

Tootja:
MEDA Manufacturing GmbH
Neurather Ring 1
DE-51063 Cologne
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Meda Pharma SIA
Narva mnt. 11D
10151 Tallinn
Tel: +372 62 61 025
Faks: +372 62 61 485

Infoleht on viimati kooskõlastatud: jaanuaris 2010