

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Co-Diovan 80 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Co-Diovan 160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Co-Diovan 160 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Co-Diovan 320 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Co-Diovan 320 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Valsartaan/hüdroklorotiasiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Co-Diovan ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Co-Diovan'i võtmist
3. Kuidas Co-Diovan'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Co-Diovan'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON CO-DIOVAN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Co-Diovan õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad kahte toimeainet, mida nimetatakse valsartaaniks ja hüdroklorotiasiidiks. Mõlemad toimeained aitavad langetada kõrget vererõhku (hüpertensioon).

- **Valsartaan** kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse "angiotensiin II retseptorite antagonistideks" ning mis aitavad kõrget vererõhku kontrolli all hoida. Angiotensiin II on aine organismis, mis põhjustab veresoonte pingule tõmbumist, mille tagajärjel tõuseb vererõhk. Valsartaani toime seisneb angiotensiin II blokeerimises. Selle tulemusena veresooned lõdveneivad ja vererõhk langeb.
- **Hüdroklorotiasiid** kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse tiasiiddiureetikumideks (nimetatakse ka "vett väljaviiivateks tablettideks"). Hüdroklorotiasiid suurendab uriinieritust, mille tulemusena alaneb samuti vererõhk.

Co-Diovan'i kasutatakse kõrgvererõhu raviks, mille piisavat langust ei ole õnnestunud saavutada ainult ühe ravimi kasutamisel.

Kõrge vererõhk suurendab südame ja arterite koormust. Ravimata jätmisel võib see kahjustada aju, südame ja neerude veresooni ning põhjustada insulti või südame- või neerupuudulikkust. Kõrge vererõhk suurendab infarktirisiki. Vererõhu langetamine normaalse tasemeni vähendab nende häirete tekkeriski.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE CO-DIOVAN'I VÕTMIST

Ärge võtke Co-Diovan'i

- kui te olete allergiline (ülitundlik) valsartaani, hüdroklorotiasiidi, sulfoonamiidi derivaatide (hüdroklorotiasiidiga keemiliselt sarnased ained) või Co-Diovan'i mõne koostisosa suhtes.
- kui te olete **rohkem kui 3 kuud rase** (ka raseduse alguses on parem Co-Diovan'i mitte kasutada – vt lõik raseduse kohta).
- kui teil on **raske** maksahaigus, väikeste sapijuhade hävinemine maksas (sapitsirroos), mis viib sapi kuhjumisele maksas (kolestaas).
- kui teil on **raskekujuline** neeruhaigus.
- kui teil puudub kuseeritus (anuuria).
- kui te saate dialüüsravi („kunstneer“).
- kui teie vere kaaliumi- või naatriumisisaldus on normaalsest madalam või kaltsiumisisaldus ravist hoolimata normaalsest kõrgem.
- kui teil on podagra.
- kui teil on suhkurtõbi või neerufunktsiooni kahjustus ja te võtate samal ajal vererõhku alandavat ravimit, mida kutsutakse aliskireeniks.

Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, siis ärge seda ravimit võtke ja pidage nõu oma arstiga.

Eriiline ettevaatus on vajalik ravimiga Co-Diovan

- kui te võtate kaaliumi säästvaid ravimeid, kaaliumipreparaate, kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid või teisi vere kaaliumisisaldust suurendavaid ravimeid, nagu hepariin. Arst võib regulaarselt kontrollida teie vere kaaliumisisaldust.
- kui teie veres on madal kaaliumisisaldus.
- kui teil esineb kõhulahtisus või tugev oksendamine.
- kui te võtate suurtes annustes vett väljaviiavaid tablette (diureetikumid).
- kui teil on raske südamehaigus.
- kui teil on südamepuudulikkus või teil on esinenud südameinfarkt. Järgige hoolega oma arsti juhiseid ravimi algannuse kohta. Teie arst võib samuti kontrollida teie neerufunktsiooni.
- kui teil esineb neeruarteri ahenemine.
- kui teile on hiljuti siirdatud uus neer.
- kui teil on hüperaldosteronism. Selle haiguse puhul toodavad teie neerupealised liiga palju hormoon aldosteroon. Sellisel juhul ei ole Co-Diovan'i kasutamine soovitatav.
- kui te põete maksa- või neeruhaigust.
- kui teil on kunagi esinenud teiste ravimite (sealhulgas AKE inhibiitorite) võtmise ajal allergilist reaktsiooni, mida nimetatakse angioödeemiks ja mis põhjustab keele ja näo turset, rääkige oma arstiga. Kui teil tekivad Co-Diovan'i võtmise ajal sellised sümptomid, lõpetage kohe Co-Diovan'i võtmine ja ärge enam kunagi Co-Diovan'i võtke (vt ka lõik 4 “Võimalikud kõrvaltoimed“).
- kui teil esineb palavik, nahalööve ja liigesevalu, mis võivad olla süsteemse erütematoosse luupuse nähtudeks (SLE, niinimetatud autoimmuunhaigus).
- kui teil on suhkurtõbi, podagra, kõrge kolesterooli- või triglütseriidide sisaldus veres.
- kui teil on esinenud allergilisi reaktsioone teiste selle klassi (angiotensiin II retseptorite antagonistid) vererõhku langetavate ravimite kasutamisel või kui teil esineb allergia või astma.
- kui teil on halvenenud nägemine või silmavalu. Need võivad olla suurenenud silmarõhu sümptomid ja võivad esineda tundide kuni nädala jooksul alates Co-Diovan'i võtmisest. See võib ravimata jätmise korral viia püsivale nägemisekaotusele. Kui teil on varem esinenud allergiat penitsilliinide või sulfoonamiidi derivaatide suhtes, võib teil olla suurenenud risk selle tekkeks.
- suureneda võib naha tundlikkus päikese suhtes.
- kui teil ravitakse kõrget vererõhku ükskõik millise järgneva ravimiga:
 - o „AKE inhibiitorid“, nt enalapriil, lisinopriil jt.
 - o Aliskireen.

Kui mõni nendest seisunditest kehtib teie kohta, rääkige oma arstiga.

Co-Diovan'i kasutamine lastel ja noorukitel (alla 18 eluaasta) ei ole soovitatav.

Kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda), peate sellest rääkima oma arstile. Co-Diovan'i ei soovitata kasutada raseduse alguses ning seda ei tohi kasutada juhul, kui te olete üle 3 kuu rase, sest selles raseduse staadiumis kasutatuna võib ravim põhjustada tõsist lootekahjustust (vt lõik raseduse kohta).

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Co-Diovan'i võtmine koos teatavate teiste ravimitega võib mõjutada selle toimet. Seetõttu võib osutuda vajalikuks muuta annust, võtta kasutusele muid ettevaatusabinõusid või mõnel juhul ühe ravimi kasutamine katkestada. Eriti kehtib see järgmiste ravimite kohta:

- liitium, mida kasutatakse teatud tüüpi psühhiaatriliste haiguste raviks.
- ravimid või ained, mis võivad tõsta vere kaaliumisisaldust. Nende hulka kuuluvad kaaliumipreparaadid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, kaaliumisäästvad ravimid ja hepariin.
- ravimid, mille toimel võib väheneda vere kaaliumisisaldus, nt diureetikumid (vett väljaviivad tabletid), kortikosteroidid, lahtistid, karbenoksoloon, amfoteritsiin või penitsilliin G.
- mõned antibiootikumid (rifamütsiini rühm), ravimid, mida kasutatakse siirdamisel äratõukereaktsiooni ennetamiseks (tsüklosporiin) või antiretroviirusravimid, mida kasutatakse HIV/AIDS raviks (ritonaviir). Need ravimid võivad Co-Diovan'i toimet tugevdada.
- ravimid, mis võivad esile kutsuda *torsades de pointes*'i (ebaregulaarne südamerütm) tekke, nt antiarütmikumid (ravimid, mida kasutatakse südameprobleemide raviks) ja mõned antipsühhootikumid.
- ravimid, mis võivad vähendada naatriumi hulka veres, nagu antidepressandid, antipsühhootikumid, antiepileptikumid.
- podagra ravimid (nt allopurinool, probenetsiid, sulfiinpüraasoon).
- D-vitamiini ja kaltsiumi ravipreparaadid.
- suhkurtõve ravimid (suukaudsed ravimid, nt metformiin või insuliinid).
- muud vererõhku langetavad ravimid, sealhulgas metüüldopa, AKE inhibiitorid (nt enalapriil, lisinopriil jt) või aliskireen.
- ravimid, mis tõstavad vererõhku, nt noradrenaliin või adrenaliin.
- digoksiin või teised südameglükosiidid (ravimid, mida kasutatakse südameprobleemide raviks).
- ravimid, mis võivad tõsta veresuhkrutaset, nt diasoksiid või beetablokaatorid.
- tsütotoksilised ravimid (kasutatakse vähi ravis), nagu metotreksaat või tsüklofosfamiid.
- valuvaigistid, nagu mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA'd), sealhulgas selektiivsed tsüklooksügenaas-2 inhibiitorid (Cox-2 inhibiitorid) ja atsetüülsalitsüülhape > 3 g.
- lihaseid lõõgastavad ravimid, nt tubokurariin.
- antikoliinergilised ravimid (ravimid, mida kasutatakse erinevate haiguste, nagu seedetrakti krampide, kusepõie spasmi, astma, merehaiguse, lihasspasmide, Parkinsoni tõve raviks ja anesteetias).
- amantadiin (ravim, mida kasutatakse Parkinsoni tõve raviks ja teatud viiruste poolt põhjustatud haiguste ennetamiseks).
- kolestüramiin ja kolestipool (ravimid, mida kasutatakse peamiselt veres lipiidide kõrge taseme langetamiseks).
- tsüklosporiin, mida kasutatakse elundisiirdamise järgselt siiriku äratõukereaktsiooni vältimiseks.
- alkohol, unerohud ja anesteetikumid (ravimid, millel on uinutav või valuvaigistav toime ja mida kasutatakse näiteks kirurgias).
- joodi sisaldavad kontrastained (ained, mida kasutatakse radioloogilistel uuringutel).

Co-Diovan'i võtmine koos toidu ja joogiga

Co-Diovan'i võib võtta koos toiduga või ilma.

Hoiduge alkoholi tarvitamisest, kuni olete rääkinud oma arstiga. Alkohool võib põhjustada vererõhu suuremat langust ja/või suurendada riski pearingluse või minestuse tekkeks.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- te peate rääkima oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda).

Arst soovib teil üldjuhul enne rasestumist või niipea kui teate, et olete rase, Co-Diovan'i kasutamise katkestada ning võtta Co-Diovan'i asemel teist ravimit. Co-Diovan'i kasutamine ei ole soovitatav raseduse algetapil ning seda ei tohi kasutada rohkem kui 3-kuulise raseduse ajal, sest ravimi kasutamine pärast kolmandat raseduskuud võib imikut tõsiselt kahjustada.

- rääkige oma arstile, kui te imetate või kavatsete oma last imetada.

Imetamise ajal ei ole soovitatav Co-Diovan'i kasutada ja arst võib valida teile muu ravimi, kui soovite imetamist jätkata, eriti kui teil on vastsündinu või enneaegselt sündinud laps.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Enne sõiduki juhtimist, tööriistade või masinate käsitlemist või muid keskendumist nõudvaid tegevusi veenduge, et teate, millist toimet Co-Diovan teile avaldab. Nagu paljud teisedki vererõhuravimid, võib Co-Diovan põhjustada harvadel juhtudel pearinglust ja kahjustada keskendumisvõimet.

3. KUIDAS CO-DIOVAN'I VÕTTA

Võtke Co-Diovan'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. See aitab saavutada parimad ravitulemused ja vähendada kõrvaltoimete riski. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõrge vererõhu nähte sageli ei märgata. Paljudel võib olla enesetunne täiesti normaalne. Seetõttu on teil seda tähtsam oma arsti visiitidel käia ka siis, kui teie enesetunne on hea.

Arst ütleb teile täpselt, kui palju Co-Diovan'i tablette võtta. Sõltuvalt ravivastusest võib arst soovitada suuremat või väiksemat annust.

- Co-Diovan'i tavaline annus on üks tablett päevas.
- Ärge muutke annust ega lõpetage tablettide võtmist ilma arstiga nõu pidamata.
- Ravimit tuleb võtta iga päev samal kellaajal, tavaliselt hommikul.
- Co-Diovan'i võib võtta koos toiduga või ilma.
- Neelake tablett koos klaasi veega.

Kui te võtate Co-Diovan'i rohkem kui ette nähtud

Raske pearingluse ja/või minestuse korral heitke pikali ja võtke kohe ühendust oma arstiga.

Kui olete juhuslikult võtnud liiga palju tablette, pöörduge oma arsti või apteekri poole või haiglasse.

Kui te unustate Co-Diovan'i võtta

Kui olete annuse võtmise unustanud, võtke ravimit kohe, kui teile meenub. Kui on aga juba peaaegu aeg võtta järgmist annust, ärge vahelejäanud annust võtke.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Co-Diovan'i võtmise

Ravi lõpetamine Co-Diovan'iga võib põhjustada vererõhu tõusu. Ärge lõpetage ravimi kasutamist enne, kui arst selleks juhised annab.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Co-Diovan põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimeid võib tekkida teatavate sagedustega, mis on määratletud järgmiselt

- väga sage: esineb rohkem kui 1 kasutajal 10st
- sage: esineb 1...10 kasutajal 100st
- aeg-ajalt: esineb 1...10 kasutajal 1000st
- harv: esineb 1...10 kasutajal 10 000st
- väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000st
- teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised ja vajada kohest arstiabi:

Pöörduge otsekohe oma arsti poole, kui teil tekivad angioödeemi sümptomid, näiteks:

- näo-, keele- või kõriturse
- raskused neelamisel
- lööve ja raskendatud hingamine.

Kui teil tekib ükskõik milline neist sümptomitest, lõpetage Co-Diovan'i kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga (vt ka lõik 2 "Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Co-Diovan").

Muud kõrvaltoimed on järgmised:

Aeg-ajalt

- köha
- madal vererõhk
- peapööritus
- dehüdratsioon e veetustumine (mille sümptomiteks on janu, suu ja keele kuivus, harv urineerimine, tume uriin, kuiv nahk)
- lihasvalu
- väsimus
- surinad või tuimus
- ähmane nägemine
- helid (nt kohin, kumin) kõrvus.

Väga harv

- pearinglus
- kõhulahtisus
- liigesvalu.

Teadmata

- hingamisraskus
- tugevalt vähenenud uriinieritus

- madal naatriumisaldus veres (mis võib tekitada väsimust, segasust, lihaste tõmbulisi ja/või rasketel juhtudel krampe)
- madal kaaliumisisaldus veres (mõnikord koos lihasnõrkuse, lihasspasmide, südame rütmihäiretega)
- madal vere valgeliblede arv (koos sümptomitega nagu palavik, nahainfektsioonid, infektsioonidest tingitud kurguvalu või suuhaavandid, nõrkus)
- vere bilirubiinisalduse suurenemine (mis võib tõsistel juhtudel põhjustada naha ja silmavalgete kollasust)
- uurealämmastiku ja kreatiniinisalduse suurenemine veres (mis võib viidata neerufunktsiooni häiretele)
- vere kusi happesalduse suurenemine (mis võib tõsistel juhtudel vallandada podagra)
- minestus.

Järgnevaid kõrvaltoimeid on kirjeldatud ainult valsartaani või hüdroklorotiasiidi sisaldavate toodete kasutamisel:

Valsartaan

Aeg-ajalt

- pöörlemistunne
- kõhuvalu.

Teadmata

- nahalööve koos sügelusega või ilma, millega kaasnevad mõned järgmistest sümptomitest: palavik, liigesvalu, lihasvalu, lümfisõlmede suurenemine ja/või gripitaolised sümptomid
- nahalööve, lillakaspunased täpid, palavik, sügelus (veresoonte põletiku sümptomid)
- madal vereliistakute arv (mõnikord koos ebahariliku veritsuse või verevalumite tekkega)
- kõrge vere kaaliumisisaldus (mõnikord koos lihasspasmide, südame rütmihäiretega)
- allergilised reaktsioonid (koos sümptomitega nagu nahalööve, sügelus, nõgestõbi, hingamis- või neelamisraskus, pearinglus)
- peamiselt näo- ja kõriturse; nahalööve; sügelus
- maksafunktsiooni näitajate tõus
- hemoglobiinisalduse langus ja vere punaliblede protsendi langus veres (mis võib rasketel juhtudel põhjustada aneemiat)
- neerufunktsiooni häire
- madal naatriumisaldus veres (mis võib tekitada väsimust, segasust, lihaste tõmbulisi ja/või rasketel juhtudel krampe).

Hüdroklorotiasiid

Väga sage

- madal kaaliumitase veres
- lipiidide taseme tõus veres.

Sage

- madal naatriumitase veres
- madal magneesiumitase veres
- kõrge kusi happetase veres
- sügelev lööve või muud tüüpi lööve
- söögiisu vähenemine
- kerge iiveldus ja oksendamine
- pearinglus, minestus püstitõusmisel

- võimetus saada või säilitada erektsiooni.

Harv

- naha turse ja villide teke (suurenenud tundlikkuse tõttu päikese suhtes)
- kõrge kaltsiumitase veres
- kõrge suhkrutase veres
- suhkur uriinis
- diabeedi ägenemine
- kõhukinnisus, kõhulahtisus, ebamugavustunne maos või soolestikus, maksafunktsiooni häired, mis võivad esineda koos kollase naha ja silmavalgetega
- ebakorrapärane südametegevus
- peavalu
- unehäired
- kurb meeleolu (depressioon)
- madal vereliistakute arv (mõnikord koos veritsuse või nahaaluste verevalumite tekkega)
- pearinglus
- surin või tuimus
- nägemishäired.

Väga harv

- veresoonte põletik koos sümptomitega nagu lööve, lillakaspunased täpid, palavik (vaskuliit)
- lööve, sügelus, nõgestõbi, hingamis- või neelamisraskus, pearinglus (ülitundlikkusreaktsioonid)
- raske nahahaigus, mis põhjustab löövet, naha punetust, villide teket huultel, silmadel või suus, naha koorumist, palavikku (toksiline epidermaalne nekrolüüs)
- lööve näol, liigesevalu, lihaste häired, palavik (erütematoosne luupus)
- tõsine ülakõhuvalu (panreatiit)
- hingamisraskus koos palavikuga, kõha, vilistav hingamine, õhupuudus (respiratoorne distress sealhulgas pneumoniit ja pulmonaarne ödeem)
- palavik, valus kurk, sagedasemad infektsioonid (agranulotsütoos)
- kahvatu nahk, väsimus, õhupuudus, tume uriin (hemolüütiline aneemia)
- palavik, infektsioonidest põhjustatud valus kurk või suuhaavandid (leukopeenia)
- segasus, väsimus, lihaste tõmblused ja spasmid, kiire hingamine (hüpokloreemiline alkaloos).

Teadmata

- nõrkus, verevalumid ja sagedased infektsioonid (aplastiline aneemia)
- oluliselt vähenenud urineerimine (neerukahjustuse või neerupuudulikkuse võimalikud nähud)
- kõrgest rõhust silmas põhjustatud nägemise halvenemine või valu silmades (ägeda suletud nurga glaukoomi võimalikud nähud)
- lööve, nahapunetus, villid huultel, silmadel või suus, naha irdumine, palavik (multiformse erüteemi võimalikud sümptomid)
- lihasspasmid
- palavik (püreksia)
- nõrkus (asteenia).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS CO-DIOVAN'I SÄILITADA

- Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

- Ärge kasutage Co-Diovan'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
- Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
- Ärge kasutage Co-Diovan'i pakendit, mis on rikunud või nähtavalt kahjustatud.
- Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Co-Diovan sisaldab

- Toimeained on valsartaan ja hüdroklorotiasiid. Iga tablett sisaldab vastavalt 80 mg, 160 mg või 320 mg valsartaani ja vastavalt 12,5 mg või 25 mg hüdroklorotiasiidi.
- Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat.
- Tableti kate: hüpromelloos, makrogool 8000 (ainult 80 mg/12,5 mg ja 160 mg/12,5 mg), makrogool 4000 (ainult 160 mg/25 mg, 320 mg/12,5 mg ja 320 mg/25 mg), talk, punane raudoksiid (E172, ei sisaldu 320 mg/25 mg), kollane raudoksiid (E172, ainult 80 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg ja 320 mg/25 mg), must raudoksiid (E172, ainult 160 mg/25 mg ja 320 mg/12,5 mg), titaandioksiid (E171).

Kuidas Co-Diovan välja näeb ja pakendi sisu

Co-Diovan 80/12,5 õhukese polümeerikattega tabletid on heleoranžid ovaalsed tabletid, mille ühel küljel on tähed HGH ja teisel küljel tähed CG.

Co-Diovan 160/12,5 õhukese polümeerikattega tabletid on tumepunased ovaalsed tabletid, mille ühel küljel on tähed HHH ja teisel küljel tähed CG.

Co-Diovan 160/25 õhukese polümeerikattega tabletid on pruunid ovaalsed tabletid, mille ühel küljel on tähed HXH ja teisel küljel tähed NVR.

Co-Diovan 320/12,5 õhukese polümeerikattega tabletid on roosad ovaalse kujuga faasitud servadega tabletid, mille ühel küljel on tähed NVR ja teisel küljel tähed HIL.

Co-Diovan 320/25 õhukese polümeerikattega tabletid on kollased ovaalse kujuga faasitud servadega tabletid, mille ühel küljel on tähed NVR ja teisel küljel tähed CTI.

Tabletid on blisterpakendis, kus on 7 (ainult Co-Diovan 320 mg/12,5 mg ja 320 mg/25 mg), 14, 28 (kalendreeritud pakend), 30 (ainult Co-Diovan 80 mg/12,5 mg), 56, 98 (kalendreeritud pakend) või 280 õhukese polümeerikattega tabletti. Saadaval on ka üheannuselised perforeeritud blisterpakendid, kus on 56 x 1, 98 x 1 või 280 x 1 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Soome

Tootja

Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Novartis Pharma Services Inc. Eesti filiaal
Pärnu mnt. 141
11314 Tallinn
Telefon: 6630810

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgimiste nimetustega:

Taani, Soome, Island, Norra, Rootsi	Diovan Comp
Austria, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Läti, Leedu, Malta, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Ühendkuningriik	Co-Diovan
Austria, Saksamaa, Portugal, Hispaania	Co-Diovan forte
Austria	Co-Diovan fortissimum
Belgia, Luksemburg	Co-Diovane
Prantsusmaa, Itaalia	Co-Tareg
Ungari	Diovan HCT

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2014