

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Claritine, 10 mg tabletid Loratadiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Claritine ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Claritine'i võtmist
3. Kuidas Claritine'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Claritine'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Claritine ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on Claritine'i tabletid.

Mis ravim on Claritine

Claritine'i tabletid sisaldavad toimeainet loratadiin, mis kuulub antihistamiinsete ravimite gruppi.

Kuidas Claritine toimib

Claritine aitab vähendada histamiini toimet pärssides allergilisi sümptomeid. Histamiin on organismiomane allergilisi reaktsioone vallandav aine.

Millal Claritine'i võtta

Claritine vähendab allergilise riniidi (nt heinanohu) haigustunnuseid, nagu aevastamine, vesine nohu, nina sügelemine, silmade sügelemine ja punetus täiskasvanutel ja 2-aastastel ning vanematel lastel, kes kaaluvad rohkem kui 30 kg.

Claritine'i tablette kasutatakse ka urtikaaria haigustunnuste, nagu sügelemise, punetuse ja kuplade arvu ning suuruse vähendamiseks.

Claritine'i toime kestab kogu päeva ning võimaldab teile taas normaalse päevase tegevuse ja rahuliku une.

Pidage nõu oma arstiga, kui te ei tunne ennast paremini või kui teie enesetunne halveneb.

2. Mida on vaja teada enne Claritine'i võtmist

Ärge võtke Claritine'i

- kui olete loratadiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Claritine'i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega

- kui teil on maksahaigus.
- kui teile plaanitakse allergiate põhjuse väljaselgitamiseks teha nahateste. Ärge võtke Claritine'i kaks päeva enne neid test. See on vajalik, sest võib mõjutada testide tulemusi.

* selgitus – 30 ja 100 tk pakendis - retseptiravim, 10 tk pakendis - käsimüügiravim

Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta (või te ei ole kindel), pidage enne Claritine'i võtmist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Lapsed

Ärge manustage Claritine'i alla 2-aastastele lastele või lastele vanuses 2...12 aastat, kes kaaluvad vähem kui 30 kg. 2...12-aastastele lastele kehakaaluga alla 30 kg on teisi sobivamaid ravimvorme.

Muud ravimid ja Claritine

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid.

Claritine koos alkoholiga

Claritine ei tugevda alkoholi toimet.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal ärge Claritine'i kasutage.

Rinnaga toitmise ajal ärge Claritine'i kasutage. Loratadiin imendub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Soovitatud annuses ei põhjusta Claritine unisust või tähelepanu langust. Väga harva tunnevad mõned inimesed end siiski unisena ja sel juhul tuleks hoiduda liiklusvahendi juhtimisest või mehhanismide käsitlemisest.

Claritine sisaldab laktoosi

Claritine'i tabletid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

3. Kuidas Claritine'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes ja nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, kui teil on raskusi terve tableti allaneelamisega.

Täiskasvanud ja 12-aastased ning vanemad lapsed:

Võtke üks tablett üks kord ööpäevas klaasi veega, söögiaegadest sõltumatult.

2...12-aastased lapsed:

Kehakaaluga üle 30 kg:

Üks tablett üks kord ööpäevas klaasi veega, söögiaegadest sõltumatult.

Kehakaaluga 30 kg või vähem:

Ärge manustage Claritine'i. 2...12-aastastele lastele kehakaaluga alla 30 kg on teisi sobivamaid ravimvorme.

Loratadiin ei ole soovitatav alla 2-aastastele lastele.

Tõsiste maksaprobleemidega täiskasvanud ja lapsed:

Täiskasvanud ja lapsed, kes kaaluvad üle 30 kg:

Võtke üks tablett ülepäeviti klaasi veega, söögiaegadest sõltumatult. Enne selle ravimi võtmist peate siiski pidama nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui te võtate Claritine'i rohkem kui ette nähtud

Võttes liiga suure annuse, teatage sellest kohe oma arstile või apteekrile. Tõsiseid probleeme tõenäoliselt ei teki, kuid teil võib tekkida peavalu, teie südametegevus võib olla kiirenenud või te võite tunda end unisena.

Kui te unustate Claritine'i võtta

- Kui unustasite ravimit võtta, tehke seda niipea kui see teile meelde tuleb ning pöörduge tagasi regulaarse annustamise juurde.
- Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedamini selle ravimi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed täiskasvanutel ning 12-aastastel ja vanematel lastel on:

- unisus;
- peavalu;
- suurenenud söögiisu;
- unehäired.

Kõige sagedamini selle ravimi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed 2...12-aastastel lastel on:

- peavalu;
- närvilisus;
- väsimus.

Claritine'i turustamise ajal on väga harva (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10 000-st) teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

- rasked allergilised reaktsioonid;
- pearinglus;
- ebaregulaarne või kiirenenud südametegevus;
- iiveldus (halb enesetunne);
- suukuivus;
- seedehäired;
- maksafunktsiooni häired;
- juuste väljalangemine;
- lööve;
- väsimus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Claritine'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate muutusi tableti välimuses.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Claritine sisaldab

- Toimeaine on loratadiin. Üks tablett sisaldab 10 mg loratadiini.
- Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, magneesiumstearaat.

Kuidas Claritine välja näeb ja pakendi sisu

Claritine'i tabletid on valged kuni kollakasvalged ovaalsed tabletid, mille ühel küljel on kolvi- ja kausikujuline märg, poolitusjoon ja „10“ ning mille teine külg on tühi. Muud lisandid puuduvad.

Claritine 10 mg tabletid on pakendatud ühe annuse kaupa blisterpakendisse, 30 või 100 tabletti pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

Bayer UAB
Žirmunu 68A
LT-09124 Vilnius
Leedu

Tootja: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Bayer OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn
Tel: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2014

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Claritine, 10 mg tabletid Loratadiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Claritine ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Claritine'i võtmist
3. Kuidas Claritine'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Claritine'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Claritine ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on Claritine'i tabletid.

Mis ravim on Claritine

Claritine'i tabletid sisaldavad toimeainet loratadiin, mis kuulub antihistamiinsete ravimite gruppi.

Kuidas Claritine toimib

Claritine aitab vähendada histamiini toimet pärssides allergilisi sümptomeid. Histamiin on organismiomane allergilisi reaktsioone vallandav aine.

Millal Claritine'i võtta

Claritine vähendab allergilise riniidi (nt heinanohu) haigustunnuseid, nagu aevastamine, vesine nohu, nina sügelemine, silmade sügelemine ja punetus täiskasvanutel ja 2-aastastel ning vanematel lastel, kes kaaluvad rohkem kui 30 kg.

Claritine'i tablette kasutatakse ka urtikaaria haigustunnuste, nagu sügelemise, punetuse ja kuplade arvu ning suuruse vähendamiseks.

Claritine'i toime kestab kogu päeva ning võimaldab teile taas normaalse päevase tegevuse ja rahuliku une.

Pidage nõu oma arstiga, kui te ei tunne ennast paremini või kui teie enesetunne halveneb.

2. Mida on vaja teada enne Claritine'i võtmist

Ärge võtke Claritine'i

- kui olete loratadiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Claritine'i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega

- kui teil on maksahaigus.

- kui teile plaanitakse allergiate põhjuse väljaselgitamiseks teha nahatest. Ärge võtke Claritine'i kaks päeva enne neid test. See on vajalik, sest võib mõjutada testide tulemusi.

Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta (või te ei ole kindel), pidage enne Claritine'i võtmist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Lapsed

Ärge manustage Claritine'i alla 2-aastastele lastele või lastele vanuses 2...12 aastat, kes kaaluvad vähem kui 30 kg. 2...12-aastastele lastele kehakaaluga alla 30 kg on teisi sobivamaid ravimvorme.

Muud ravimid ja Claritine

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid.

Claritine koos alkoholiga

Claritine ei tugevda alkoholi toimet.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal ärge Claritine'i kasutage.

Rinnaga toitmise ajal ärge Claritine'i kasutage. Loratadiin imendub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Soovitatud annuses ei põhjusta Claritine unisust või tähelepanu langust. Väga harva tunnevad mõned inimesed end siiski unisena ja sel juhul tuleks hoiduda liiklusvahendi juhtimisest või mehhanismide käsitlemisest.

Claritine sisaldab laktoosi

Claritine'i tabletid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

3. Kuidas Claritine'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes ja nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, kui teil on raskusi terve tableti allaneelamisega.

Täiskasvanud ja 12-aastased ning vanemad lapsed:

Võtke üks tablett üks kord ööpäevas klaasi veega, söögiaegadest sõltumatult.

2...12-aastased lapsed:

Kehakaaluga üle 30 kg:

Üks tablett üks kord ööpäevas klaasi veega, söögiaegadest sõltumatult.

Kehakaaluga 30 kg või vähem:

Ärge manustage Claritine'i. 2...12-aastastele lastele kehakaaluga alla 30 kg on teisi sobivamaid ravimvorme.

Loratadiin ei ole soovitatav alla 2-aastastele lastele.

Tõsiste maksaprobleemidega täiskasvanud ja lapsed:

Täiskasvanud ja lapsed, kes kaaluvad üle 30 kg:

Võtke üks tablett ülepäeviti klaasi veega, söögiaegadest sõltumatult. Enne selle ravimi võtmist peate siiski pidama nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

* selgitus – 30 ja 100 tk pakendis - retseptiravim, 10 tk pakendis - käsimüügiravim

Kui te võtate Claritine'i rohkem kui ette nähtud

Võttes liiga suure annuse, teatage sellest kohe oma arstile või apteekrile. Tõsiseid probleeme tõenäoliselt ei teki, kuid teil võib tekkida peavalu, teie südametegevus võib olla kiirenenud või te võite tunda end unisena.

Kui te unustate Claritine'i võtta

- Kui unustasite ravimit võtta, tehke seda niipea kui see teile meelde tuleb ning pöörduge tagasi regulaarse annustamise juurde.
- Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedamini selle ravimi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed täiskasvanutel ning 12-aastastel ja vanematel lastel on:

- unisus;
- peavalu;
- suurenenud söögiisu;
- unehäired.

Kõige sagedamini selle ravimi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed 2...12-aastastel lastel on:

- peavalu;
- närvilisus;
- väsimus.

Claritine'i turustamise ajal on väga harva (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10 000-st) teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

- rasked allergilised reaktsioonid;
- pearinglus;
- ebaregulaarne või kiirenenud südametegevus;
- iiveldus (halb enesetunne);
- suukuivus;
- seedehäired;
- maksafunktsiooni häired;
- juuste väljalangemine;
- lööve;
- väsimus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Claritine'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab sellele kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate muutusi tableti välimuses.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Claritine sisaldab

- Toimeaine on loratadiin. Üks tablett sisaldab 10 mg loratadiini.
- Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, magneesiumstearaat.

Kuidas Claritine välja näeb ja pakendi sisu

Claritine'i tabletid on valged kuni kollakasvalged ovaalsed tabletid, mille ühel küljel on kolvi- ja kausikujuline märg, poolitusjoon ja „10“ ning mille teine külg on tühi. Muud lisandid puuduvad.

Claritine 10 mg tabletid on pakendatud ühe annuse kaupa blisterpakendisse, 10 tabletti pakendis.

Müügiloa hoidja:

Bayer UAB
Žirmunu 68A
LT-09124 Vilnius
Leedu

Tootja: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Bayer OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn
Tel: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2014