

PAKENDI INFOLEHT: TEAVE KASUTAJALE

Aescuven forte, 30 mg, kaetud tabletid
Hobukastaniseemnete kuivekstrakt

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
- Kui pärast 8 nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehes antakse ülevaade

1. Mis ravim on *Aescuven forte* ja milleks seda kasutatakse.
2. Mida on vaja teada enne *Aescuven forte* kasutamist.
3. Kuidas *Aescuven forte*'t kasutada.
4. Võimalikud kõrvaltoimed.
5. Kuidas *Aescuven forte*'t säilitada.
6. Pakendi sisu ja muu teave.

1. MIS RAVIM ON AESCUVEN FORTE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Aescuven forte on taimne ravim, mis sisaldab hobukastaniseemnete kuivekstrakti, mille toimeaineks on estsiin. Hobukastaniseemnete kuivekstrakt on suurendanud uuringutes verevoolu kiirust ja veenide toonust ning vähendanud veenide mahtu, toimides tursevastaselt. *Aescuven forte*'t kasutatakse täiendava ravimina jalaveenide kroonilisest puudulikkusest põhjustatud tursete korral. Veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse korral on jala/jalgade turse, valulikkus, raskustunne, öised säärelihaste krampid, jalanaha atroofia korral ka sügelus.

Samuti soovitakse preparaati operatsiooni- või traumajärgse pehmete kudede turse korral.

Alati tuleb järgida ka arsti ettekirjutatud teisi ravimeetodeid, nagu sidemete ja rõhksukkade kandmine ning külmaveevannid.

Kui pärast 8 nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE AESCUVEN FORTE KASUTAMIST

Ärge kasutage *Aescuven forte*'t,

- kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- Enne *Aescuven forte* kasutamist pidage nõu oma arstiga.
- Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.
- Kui ilmnevad tõsised veenitromboosile viitavad kaebused (eriti juhul, kui kaebused on ainult ühel jalal): jala turse, naha loomuliku värvuse kadumine, pinge- ja kuumatunne ning valu.

Lapsed

Lapsed ei tohi *Aescuven forte*´t kasutada.

Muud ravimid ja *Aescuven forte*

Uuringuid koostoimete kohta teiste ravimitega ei ole tehtud. Teoreetiliselt võib taimne ravim tugevdada antikoagulantide toimet.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

***Aescuven forte* koos toidu, joogi ja alkoholiga**

Ei ole erinõudeid, mida tuleb järgida.

Rasedus, imetamine, viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete raseduda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Aescuven forte´t võib raseduse ajal kasutada ainult arsti loal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Eriline ettevaatus ei ole vajalik.

3. KUIDAS AESCUVEN FORTE´T KASUTADA

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitav annus, kui arst ei ole määranud teisiti:

1...2 tabletti *Aescuven forte*´t hommikul ja õhtul. Kaetud tablett tuleb manustada söögi ajal või pärast sööki, neelates selle tervelt piisava koguse vedelikuga, nt klaasi veega.

Ravimi kasutamise aeg ei ole piiratud.

Kui haigusnähtumid kestavad üle 8 nädala, tuleb konsulteerida arstiga.

Kui te võtate *Aescuven forte*´t rohkem, kui ette nähtud

Palun informeerige oma arsti. Tema otsustab, milliseid abinõusid vajadusel tarvitada.

Üleannustamine võib suurendada edaspidi loetletud kõrvaltoimeid.

Kui te unustate *Aescuven forte*´t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata, vaid jätkake ravi nii, nagu on kirjeldatud pakendi infolehes või on määranud arst.

Kui te lõpetate *Aescuven forte* kasutamise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Hobukastaniseemnete ekstrakti kasutamise tagajärjel tekkinud kõrvaltoimed on kerged ja pöörduvad. Kõige sagedasemad ($\geq 1/10$) kõrvaltoimed on maoärritusnähtud või harvadel juhtudel ($\geq 1/10\ 000$, $\leq 1/1000$) naha sügelemine.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka niisugune, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. KUIDAS AESCUVEN FORTE'T SÄILITADA

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas ära visata ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. PAKENDI SISU JA MUU TEAVE

Mida Aescuven forte sisaldab

Toimeaine on 93,3...162,1 mg hobukastaniseemnete kuivekstrakti (5-7:1), mis vastab 30 mg veevabale estsiinile.

Ekstraerimislahusti on 50%-line (V/V) etanool.

Teised koostisosad

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, veevaba kolloidne ränidioksiid, povidoon K25, tselluloosipulber, krospovidoon, talk, magneesiumstearaat.

Tableti kate: [polü (metakrüülhappemetüülmetakrülaad)(1:1)]-dibutüülftalaat (10:1), nõrgalt aluseline magneesiumkarbonaat, akaatsiakummi, titaandioksiid (E 171), veeldatud pihustuskuivatatud glükoos, *Macrogol* 6000, povidoon K25, kaltsiumkarbonaat, sahharoos, raud(II,III)oksiid (E172), raud(III)oksiid (E172), raudhüdroksiid (E172), pleegitatud vaha, karnauba vaha, šellak.

Kuidas Aescuven forte välja näeb ja pakendi sisu

Aescuven forte on ümarad pruunikasoranžid kaetud tabletid.

Pakendis 40 või 100 kaetud tabletti.

Müügiloahoidja ja tootja

Cesra Arzneimittel
GmbH & Co. KG
Braunmattstraße 20
76532 Baden-Baden
Saksamaa

Telefon: +49-7221-95400

Fax: +49-7221-54026

E-mail: cesra@cesra.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Miecys-Pharm OÜ

Vitamiini 4
Tartu 51014
Eesti
tel. +372 738 0676
E-mail: info@micys.ee.

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2012.