

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Pikovit, siirup Multivitamiinsiirup

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Pikovit'i täpselt juhiste vastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Pikovit ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Pikovit'i võtmist
3. Kuidas Pikovit'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Pikovit'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON PIKOVIT JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Pikovit siirup sisaldab üheksat elutähtsat vitamiini, mis reguleerivad organismis paljusid keerulisi biokeemilisi protsesse. B-grupi vitamiinid (vitamiinid B₁, B₂, B₆, pantoteenhape ja nikotiinamiid) osalevad süsivesikute, valkude ja rasvade ainevahetuses ning närvisüsteemi talitluses. Vitamiin A on vajalik naha epiteelrakkude arenguks ning nägemispigmenti sünteesiks. Vitamiin D reguleerib kaltsiumi ainevahetust ja etendab tähtsat rolli luude ja hammaste arengus. Vitamiin C kiirendab raua imendumist ja võtab osa paljudest oksüdatsiooniprotsessidest organismis.

Pikovit siirupit kasutatakse vitamiinide puuduse vältimiseks lastel.

Pikovit siirup katab organismi suurenenud vitamiinivajaduse ja kompenseerib nende puuduse toidus kui igapäevased meetmed (mitmekesine ja regulaarne toitumine) neid vajadusi ei rahulda.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PIKOVIT'I VÕTMIST

Ärge võtke Pikovit'i

- kui teie laps on allergiline (ülitundlik) toimeainete või Pikovit'i mõne koostisosa suhtes.
- kui on diagnoositud vitamiinide A või D hüpervitaminoos.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Pikovit

Suhkurtõvega patsientidel ei ole Pikovit siirup kasutamine soovitatav, sest 5 ml siirupit (1 mõõtelusikas) sisaldab 3 g suhkrut ja päevane annus (10 ml kuni 20 ml) sisaldab 6 g kuni 12 g suhkrut.

Kui teie lapsel esineb ülitundlikkusreaktsioon, lõpetage ravimi võtmine.

Enne mõne teise vitamiini, vitamiine ja mineraalaineid või ainult mineraalaineid sisaldava preparaadi samaaegset kasutuselevõttu konsulteerige oma arsti või apteekriga.

Lastele vanuses alla 1 aasta võib Pikovit siirupit anda ainult arsti vastaval soovitusel ja arsti järelvalve all.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui teie laps kasutab või on hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Puuduvad teated selle ravimi mõju kohta teistele ravimitele.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või toidate last rinnaga, arvate et võite olla rase või planeerite rasedust, küsige oma arstilt või apteekrilt nõu enne selle ravimi kasutamist.

Rasedad naised ja rinnaga toitvad emad peaksid vitamiini võtma arsti vastaval soovitusel. Pikovit siirupi koostis on kohandatud eelkõige laste vajadusi arvestades.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teadaolevalt ei oma ravim toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

Pikovit sisaldab sahharoosi, glükoosi ja asovärvainet E124

Kui arst on teile öelnud, et teil esineb talumatus mõningate suhkrute suhtes, rääkige oma arstiga enne ravimi võtmist. See võib olla hammastele kahjulik.

Asovärvaine E124 võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

3. KUIDAS PIKOVIT'I VÕTTA

Võtke Pikovit'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed vanuses 1...3 aastat: 1 mõõtelusikatäis (5 ml) siirupit 1-2 korda ööpäevas.

Lapsed vanuses 4...6 aastat: 1 mõõtelusikatäis (5 ml) siirupit 2-3 korda ööpäevas.

Lapsed vanuses 7...14 aastat: 1 mõõtelusikatäis (5 ml) siirupit 3-4 korda ööpäevas.

Siirupit manustatakse lapsele pärast sööki, mõõtelusikaga või siis segatult tee, mahla või puuviljapüreega.

Pikovit siirupit tuleks võtta 1 kuu vältel.

Kui teil on tunne, et Pikovit'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui te võtate Pikovit'i rohkem kui ette nähtud

Ärge andke lapsele soovitatust suuremaid annuseid. Soovitatud annuste võtmisel intoksikatsiooni ei teki.

Pikaajalisel väga suurte annuste manustamisel võib tekkida vitamiinide A ja D hüpervitaminoos. Siirupi kasutamisel on üleannustamise oht siiski minimaalne.

Kui te unustate Pikovit'i võtta

Ärge andke lapsele kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid võib ka Pikovit põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harvad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l patsiendil 10000-st):

- ülitundlikkusreaktsioon. Ülitundlikkusreaktsiooni ilmnemisel lõpetage siirupi võtmine ja rääkige arsti või apteekriga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS PIKOVIT'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Pikovit'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Pärast pudeli esmast avamist on kõlblikkusaeg 2 kuud.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Pikovit sisaldab

- Toimeained on vitamiin A, vitamiin D₃, vitamiin C, vitamiin B₁, vitamiin B₂, vitamiin B₆, vitamiin B₁₂, vitamiin PP ja vitamiin B₅.
 - 5 ml (1 mõõtelusikatais) siirupit sisaldab järgmisi koostisosi:
 - 900 RÜ vitamiini A (retinool),
 - 100 RÜ vitamiini D₃ (kolekaltsiferool),
 - 50 mg vitamiini C (askorbiinhape),
 - 1 mg vitamiini B₁ (tiamiinvesinikkloriid),
 - 1 mg vitamiini B₂ (riboflaviin),
 - 0,6 mg vitamiini B₆ (püridoksiin),
 - 1 µg vitamiini B₁₂ (tsüanokobalamiin),
 - 5 mg vitamiini PP (nikotiinamiid) ja
 - 2 mg vitamiini B₅ dekspantenooli.
 - Abiained on agar-agar, tragakant (E413), sahharoos, veeldatud glükoos, apelsini lõhna- ja maitseaine, apelsini kontsentraat, greipfruudi kontsentraat, polüsorbaat 80 (E433), veevaba sidrunhape (E330), punane värvaine 4R (E124), naatriumbensoaat (E211), puhastatud vesi.

Kuidas Pikovit välja näeb ja pakendi sisu

Siirup on oranži värvi ja meeldiva maitsega.

150 ml siirupit pudelis ja karbis koos mõõtelusikaga.

Käsimüügiravim

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati koostõlastatud oktoobris 2012