

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Carsil, 22,5 mg kaetud tabletid Silümarin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Carsil ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Carsil'i võtmist
3. Kuidas Carsil'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Carsil'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Carsil ja milleks seda kasutatakse

Carsil kaetud tabletid on ravim, mis sisaldab toimeainena silümarini, mis on eraldatud hariliku maarjaohaka seemnetest. Silümarin aktiveerib kahjustatud maksarakkudes valkude ja fosfolipiidide sünteesi, stabiliseerib rakkude membraane, seondub vabade radikaalidega (antioksidatiivne toime), kaitstes seeläbi maksarakke kahjulike mõjude eest.

Carsil'i kasutatakse maksakahjustuse toetusravis.

2. Mida on vaja teada enne Carsil-i võtmist

Ärge võtke Carsil'i

- kui olete silümarini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui tegu on alla 12-aastase lapsega, kuna lastele manustamise kohta ei ole piisavalt kliinilisi kogemusi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige enne Carsil'i võtmist oma arsti või apteekriga.

Kui teil esineb hormonaalsete häiretega seonduvaid haigusi (nt emaka-, munasarja, rinnanäärme või eesnäärme kasvaja), peate te enne Carsil kaetud tablettide võtmise alustamist pidama nõu oma arstiga. Carsil kaetud tablette kasutatakse maksakahjustuse toetusravis, mistõttu ravi ajal peab jätkama õiget toitumist ja hoiduma alkoholi tarvitamisest.

Muud ravimid ja Carsil

Teavitage oma arsti või apteekrit, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtte mis tahes muid ravimeid.

Carsil kaetud tabletid võivad vähendada östrogeenasendusravi, suukaudsete rasestumisvastaste ravimite ja tamoksifeeni efektiivsust.

Carsil võib tugevdada selliste ravimite nagu diasepaami, alprasolaami, ketokonasooli, lovastatiini ja vinblastiini toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rääkige enne Carsil'i võtmist oma arstile, kui te olete rase või püüate rasestuda. Teie arst otsustab, kas te võite sellel ajal Carsil'i võtta.

Kui te imetate, otsustab teie arst, kas te tohite Carsil'i võtta.

Carsil'i võib manustada raseduse ajal ja imetamise perioodil ainult meditsiinilisel näidustusel ja kui ravimi manustamisest saadav kasu emale kaalub üle riski lootele.

Autojuhtimine ja masinate töötamine

Carsil ei mõjuta autojuhtimisel ja masinate käsitlemise võimet.

Carsil' sisaldab

- Abiainena nisutärklis. See on sobili tsöliaakiaga (gluteenitalumatus) patsientidele. Nisule allergilised patsiendid (ei ole sama mis tsöliaakia) ei tohi seda ravimit võtta.
- Abiainetena laktoosmonohüdraari ja sukroosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.
- Kaetud tableti koostisesse kuuluvad metüülparahüdroksübensoaat (E218) ja propüülparahüdroksübensoaat (E 216). Need ained võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (mis võivad olla hilis-tüüpi).

3. Kuidas Carsil-i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu teie arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Carsil kaetud tablette manustatakse enne söögikordi suukaudselt, tervelt, koos piisava koguse vedelikuga.

Täiskasvanud ja noorukid

Raskematel juhtudel on algannus 4 tabletti 3 korda päevas; kergematel juhtudel ja säilitusravina 1– 2 tabletti 2...3 korda päevas.

Ravikuuri kestus peab olema vähemalt 3 kuud.

Alla 12-aastased lapsed

Andmed selle ravimi manustamise kohta lastele ei ole piisavad, seetõttu ei ole see alla 12-aastastele lastele soovitatav.

Kui te võtate Carsil'i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud soovituslikust annusest suurema koguse, pöörduge oma arsti poole.

Kui te unustate Carsil'i võtta

Kui teil on annus vahele jäänud, võtke see ära niipea kui võimalik. Kui järgmise annuse aeg on juba peaaegu käes, jätkake nagu tavaliselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravimi võtmist nagu teile määratud on.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Carsil' talutakse hästi. Väga harva on võimalikud allergilised nahareaktsioonid, nagu sügelus ja lööbed või anafülaktiline šokk (raske allergiline reaktsioon, millega kaasnevad hingamishäired ja pearinglus). Harvadel juhtudel on täheldatud olemasolevate vestibulaarsete häirete tugevnemist. Harva võib täheldada kõhulahtisust või iiveldust, oksendamist ja seedetrakti häired koos soolegaasidega (meteorism).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Carsil-i säilitada

Hoidke seda ravimit originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil . Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Carsil sisaldab

- Toimeaine on 40,9...56,3 mg hariliku maarjaohaka kuivekstrakti (*Silybi mariani fructus extractum siccum*), mis vastab 22,5 mg silümariniinile silibiniinina.
- Teised abiained on:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, nisutärklis, povidoon, mikrokristalne tselluloos, magneesiumstearaat, talk, mannitool (E421), krospovidoon, polüsorbaat 80, naatriumvesinikkarbonaat.

Tableti kate: tselluloosatsetaattalaat, dietüülftalaat, sukroos, akaatsia, želatiin, talk, titaandioksiid (E171), makrogool 6000, glütserool, must raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172), metüülparahüdroksübensoaat (E218), propüülparahüdroksübensoaat (E216).

Kuidas Carsil välja näeb ja pakendi sisu

Tavapärase ümmarguse kujuga pruuni värvi, lõhnatud, kaetud tabletid.

10 kaetud tabletti PVC/Alumiinium blisteris;

8 blisterit (80 kaetud tabletti) pappkarbis koos pakendi infolehega.

Müügiloo hoidja:

Sopharma PLC
16 Iliensko Shosse
1220 Sofia
Bulgaaria

Partii vabastamise eest vastutav tootja

Bulgarian Rose Sevtopolis AD
110, 23rd Pehoten Shipchenski Polk Blvd.
6100 Kazanlak
Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Hagarex
Uusaru 5
Saue 76505
Tel: 56480207

Infoleht viimati kooskõlastatud: juulis 2014