

PAKENDI INFOLEHT:INFORMATSIOON KASUTAJALE

Septolete D, losengid

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama ravimit Septolete D täpselt juhistelevastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui pärast 3 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Septolete D ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Septolete D võtmist
3. Kuidas Septolete D´d kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Septolete D´d säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON SEPTOLETE D JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Kuidas Septolete D toimib?

Septolete D losengid sisaldavad antiseptilist ainet bensalkooniumkloriidi, mis hävitab mitmeid baktereid ja mõningaid seeni. Levomentool ja piparmündiõli vähendavad valulikkust ja seeläbi leevendavad subjektiivseid sümptomeid, näiteks neelamisel tekkivat valulikkust. Sarnaselt bensalkooniumkloriidiga on ka tümoolil antiseptiline toime ja ta suurendab ravimi efektiivsust. Eukalüptiõli soodustab lima tootmist ülemistes hingamisteedes ja kergendab seeläbi hingamist.

Milleks Septolete D´d kasutatakse?

Septolete D losengid on näidustatud suuõõne ja neelu antiseptikaks bakterite ja seente poolt põhjustatud põletike korral.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE SEPTOLETE D KASUTAMIST

Ärge võtke Septolete D´d

- kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine või Septolete D mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Septolete D

Septolete D losenge ei soovitata kasutada alla 4-aastastel lastel.

Ei ole soovitatav kasutada määratud annustest suuremaid annuseid.

Püsiva häälekäheduse korral pöörduge oma arsti poole.

Diabeediga patsiendid peavad meeles pidama, et iga loseng sisaldab 0,8 g maltitooli.

Septolete D kasutamine koos toidu ja joogiga

Septolete D´d ei ole soovitatav manustada vahetult enne söömist ega ka koos piimaga.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Rasedad ja rinnaga toitvad emad võivad losenge kasutada vaid arsti ettekirjutusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Septolete D losengid ei mõjusta teadaolevalt autojuhtimise ega masinate käsitlemise võimet.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ei ole teada, et Septolete D losengid avaldaksid mõju teistele ravimitele.

Oluline teave mõningate Septolete D koostisainete suhtes

Suures annuses glütserool võib põhjustada peavalu ja seedetrakti häireid.

Losengid sisaldavad polüoole (maltitooli, mannitooli), suur annus võib põhjustada kõhulahtisust eriti lastel.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS SEPTOLETE D´d KASUTADA

Annustamine ja manustamisviis

Üks loseng iga 2...3 tunni järel suus sulada lasta.

Üle 4-aastastele lastele võib manustada kuni neli losengi päevas ja üle 10-aastastele lastele kuni kuus losengi päevas. Täiskasvanutel ja üle 12 aasta vanustel lastel on soovitatav kasutada kuni kaheksa losengi päevas.

Kui teil on tunne, et Septolete D toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui võtate Septolete D´d rohkem, kui ette nähtud

Üleannustamise puhul pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arvestades igas losengis sisalduva toimeaine kogusega, on üleannustamise võimalus minimaalne.

Suures koguses losengide manustamine võib põhjustada seedetrakti häireid: iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust. Nimetatud toimete ilmnemisel lõpetage ravimi kasutamine, jooge palju vett või piima ja pidage nõu oma arstiga.

Kui te unustate Septolete D´d võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Septolete D põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui Septolete D losenge kasutatakse vastavalt juhiste, ilmnevad kõrvaltoimed väga harva.

Ülitundlikel patsientidel võivad soovituslikust suuremad annused põhjustada seedetrakti häireid.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS SEPTOLETE D´d SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Septolete D´d pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6. LISAINFO

Mida Septolete D sisaldab

- Toimeained on: bensalkooniumkloriid, levomentool, piparmündiõli, eukalüptiõli, tümool. Üks loseng (imemistablett) sisaldab 1,0 mg bensalkooniumkloriidi, 1,2 mg levomentooli, 1,0 mg piparmündiõli, 0,6 mg eukalüptiõli ning 0,6 mg tümooli.
- Abiained on: maltitooli lahus, mannitool, glütserool, riitsinusõli, külmpressitud, kolloidne ränidioksiid, veevaba, magneesiumstearaat, titaandioksiid (E171), Capol 600 Pharma (karnaubavaha, šellak, valge vaha), povidoon, maltitool ja värvaine kinoliinkollane (E104).

Kuidas Septolete D välja näeb ja pakendi sisu

30 kollast ümarat kaksikkumerat losengi blisterpakendis ja karbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. + 372 6671658

Infoleht on viimati koostöölstatud: märtsis 2011