

Pakendi infoleht: teave kasutajale

CIRRUS, 5 mg/120 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Tsetirisiindivesinikkloriid
Pseudoefedriinvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Cirrus ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Cirrus'e võtmist
3. Kuidas Cirrus't võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Cirrus't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Cirrus ja milleks seda kasutatakse

Cirrus sisaldab kahte toimeainet. Tsetirisiindivesinikkloriid vabaneb tabletist kiiresti (toime avaldub kiirelt), pseudoefedriinvesinikkloriid vabaneb pikaajaliselt (toime püsib kauem).

Cirrus't kasutatakse allergilise nohu (nii aastaringse kui sesoonse) sümptomaatiliseks raviks (eriti ninakinnisuse, aevastamise, vesise nohu, nina ja silmade sügeluse korral). Cirrus on mõeldud lühiajaliseks raviks.

2. Mida on vaja teada enne Cirrus'e võtmist

Ärge võtke Cirrus't:

- kui te olete ülitundlik (allergiline) piperasiini-rea allergiavastaste ravimite, efedriini või Cirrus'e mõne koostisosa suhtes;
- kui teil on raske hüpertensioon;
- kui teil on südame pärgarterite raske haigus;
- kui teil on raske arütmia;
- kui teil on glaukoom või suurenenud silmasisene rõhk;
- kui teil on uriinipeetus;
- kui teil on raske neerupuudulikkus;
- kui teil on hüpertüreoidism;
- kui teil on feokromotsütoom;
- kui arst on teile öelnud, et teil on kõrgenenud oht saada insult;
- kui teil on olnud insult;

Cirrus't ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.

Cirrus on vastunäidustatud, kui te saate samaaegset ravi järgmiste ravimitega:

- dihidroergotamiin
- monoamiinioksüdaasi (MAO) inhibiitorid (k.a 2 nädalat pärast ravi lõpetamist)

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Cirrus'e võtmist pidage nõu oma arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cirrus:

- kui te olete eakas;
- kui teil on suhkurtõbi, kilpnäärme ületalitus, kõrge vererõhk, südame veresoonte haigus või muu südamehaigus (südamepekslemine või südame rütmihäired);
- kui teil on mõõdukas neeru- või maksapuudulikkus;
- kui te kasutate järgmisi ravimeid: adrenomimeetikumid (ninakinnisuse vastased ravimid, nt fenüülpropanolamiin, fenüülefriin, efedriin), isupärssijad, psühhostimulandid (nt amfetamiini derivaadid);
- kui te kasutate ravimeid depressiooni raviks (tritsüklilised antidepressandid), kõrgvererõhuvastaseid ravimeid, digitaalset ja allergiavastaseid ravimeid;
- kui teil on soolte põletikuline haigus, suurenenud verehüübivus, kui te tarvitate mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid;
- kui teil on kõrge oht insuldi tekkeks;
- kui te tarvitate juba teisi ravimeid, palun lugege informatsiooni lõikust „Võtmine koos teiste ravimitega“

Lõpetage ravimi kasutamine 3 päeva enne allergiatesti sooritamist.

Sarnaselt teiste tsentraalse toimega stimulaatoritega, on võimalik pseudoefedriini kuritarvitamine.

Pikaaegne kasutamine võib tekitada tolerantsust ja suurendada üleannustamise ohtu. Ravi järsul katkestamisel võib tekkida depressioon.

Muud ravimid ja Cirrus

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Cirrus't ei tohi võtta samaaegselt järgmiste ravimitega:

- monoamiinioksüdaasi (MAO) inhibiitorid (ravimid parkinsonismi ja depressiooni puhul), k.a 2 nädalat pärast ravi lõpetamist;
- vererõhuvastaste ravimite (guanetidiini, metüüldopa, reserpiini, südame glükosiidide (nt digoksiin)) toime võib väheneda;
- linesoliidi (antibiootikum) manustamine koos pseudoefedriiniga võib põhjustada normaalse vererõhuga patsientidel vererõhu tõusu;

Kui teil on südamestimulaator, esineb südame rütmihäireid, siis teavitage sellest oma arsti.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal Cirrus't ekslikult kasutanud naistel kahjulikku toimet täheldatud ei ole, kuid ravi tuleb lõpetada niipea kui võimalik.

Ravimit ei tohi raseduse ajal kasutada.

Pseudoefedriini kasutamist raseduse esimesel trimestril seostatakse suurenenud gastroskiisi (kaasasündinud kõhuseina lõhestumus, mille kaudu sooled kõhuõõnest välja tungivad) esinemisega. Pseudoefedriini veresooni ahendava toime tõttu ei tohi kasutada raseduse esimesel trimestril, kuna võib vähendada platsenta verevarustust.

Ravimi kasutamisest imetamise ajal tuleb hoiduda, kuna ravim eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Soovitatud raviannustes ei oma Cirrus autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele negatiivset toimet. Tuleb järgida soovitatud annuseid. Kui tunnete end unise või uimasena, ei tohi juhtida autot.

Cirrus sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kaasasündinud galaktoositalumatusega, täieliku laktaasivaegusega või glükoosi-galaktoosi imendumishäiretega patsiendid Cirrus't võtta ei tohi.

3. Kuidas Cirrus't võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele on üks tablett hommikul ja üks õhtul.

Tablett võetakse vedelikuga tervelt, katki närimata ja purustamata. Cirrus't võib võtta koos söögiga või ilma.

Ravikuuri pikkus peab olema nii lühike kui võimalik ning ravi tuleb lõpetada kohe kui sümptomid on saadud kontrolli alla. Soovitatav on piirduda 2...3-nädalase ravikuuriga, sest pseudoefedriini toime kaob pikaaegsel manustamisel. Kui allergilise nohu sümptomid taanduvad, siis vajadusel jätkatakse ravi tsetirisiiniga.

Mõõduka neeru- ja maksapuudulikkusega haigetel tuleb annust vähendada ühe tabletini päevas.

Kui teil on tunne, et Cirrus'e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Cirrus't rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud Cirrus't rohkem kui ette nähtud, siis võivad tekkida mürgistusnähud (diarröa, pearinglus, nõrkus, peavalu, ebamugavustunne, pupillide laienemine, kusepeetus, südame pekslemine, rütmihäired, kõrge vererõhk kuni eluohtlikud sümptomid). Võtke ühendust arstiga või pöörduge raviasutusse. Ägeda mürgistuse ravi toimub enamasti haiglatingimustes.

Kui te unustate Cirrus't võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Vahe tablettide võtmisel peab olema 12 tundi.

Ärge võtke rohkem kui kaks tabletti 24 tunni jooksul.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Cirrus on tavaliselt hästi talutav.

Sagedus on defineeritud järgmiselt:

väga sage (rohkem kui ühel 10-st patsiendist)

sage (rohkem kui ühel 100-st, kuid vähem kui ühel 10-st patsiendist)

aeg-ajalt (rohkem kui ühel 1000-st, kuid vähem kui ühel 100-st patsiendist)

harv (rohkem kui ühel 10 000-st, kuid vähem kui ühel 1000-st patsiendist)

väga harv (vähem kui ühel 10 000-st patsiendist)

teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest:

Sage:	tahhükardia (kiirenenud südametegevus), suukuivus, iiveldus, asteenia (jõuetus), pearinglus, vertiigo (peapööritus), peavalu, unisus, närvilisus, unetus
Aeg-ajalt:	ängistus, agiteeritus (ärevusseisund)
Harv:	arütmia, oksendamine, maksafunktsiooni häired (transaminaaside, alkaalse fosfataasi, gamma-GT aktiivsuse suurenemine, bilirubiini sisalduse suurenemine), ülitundlikkus, krampid, treemor (värin), hallutsinatsioonid, düsuuria (urineerimishäire), kuiv nahk, lööve, suurenenud higistamine, urtikaaria (nõgestõbi), kahvatus, hüpertensioon (kõrge vererõhk)
Väga harv:	isheemiline koliit (jämesoolepõletik), düsgeusia (maitsehäire), tserebrovaskulaarne insult (ajuhalvatus), psühhootilised häired, raskekujuline lööve, angioneurootiline turse (kudede paikne turse), tsirkulatoorne kollaps (minestamine)
Teadmata:	akommodatsiooni (silma kohanemisvõime) häired, hägune nägemine, müdriaas (pupilli laienemine), valu silmas, nägemise kahjustus, fotofoobia (silmade valguskartus), düspnoe (raskendatud hingamine)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Cirrus't säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni kaudu ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cirrus sisaldab

- Toimeained on tsetirisiindivesinikkloriid ja pseudoefedriinvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 5 mg tsetirisiindivesinikkloriidi ja 120 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi.
- Teised abiained on hüpromelloos, mikrokristalne tselluloos, kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat, laktoosmonohüdraat, kroskarmelloosnaatrium, titaandioksiid (E171), makrogool 400.

Kuidas Cirrus välja näeb ja pakendi sisu

Valge kuni valkjas ümmargune kaksikkumer tablett.

Blister (PVC/alumiinium), 14 või 28 tabletti pakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

UCB Pharma Oy Finland

Itsehallintokuja 6

FI-02600 Espoo

Soome

Tootja

Aesica Pharmaceuticals S.r.l.

Via Praglia 15

I-10044 Pianezza (TO)

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Medfiles

Vasara 50

50113 Tartu

Telefon 730 5415

Faks 730 5401

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2014