

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ferretab comp., toimeainet prolungeeritult vabastavad kõvakapslid Raud(II)fumaraat, foolhape

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Ferretab comp. ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne ravimi Ferretab comp.-i võtmist
3. Kuidas ravimit Ferretab comp.-i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Ravimi Ferretab comp.-i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Ferretab comp. ja milleks seda kasutatakse

See ravimpreparaat sisaldab kahte toimeainet: raudfumaraati ja foolhapet.

Raudfumaraat on raua keemiline vorm ning foolhape kuulub B-rühma vitamiinide hulka. Organism vajab nii raua kui foolhapet punaste vererakkude loomeks. Kui organismis ei ole neid aineid piisavas koguses, võib tekkida kehvveresus e aneemia (punaste vererakkude vähesus). Rauavaegusaneemia võib tekkida ka raseduse ajal, kui organismi raua- ja foolhappevajadus on suurenenud.

Ferretab comp. aitab täiendada organismi raua- ja foolhappevarusid, kui organism ei saa neid aineid piisavalt.

Ferretab comp.-i kasutatakse raua- ja foolhappevaeguse, sh rasedusaegse rauavaegusaneemia korral.

2. Mida on vaja teada enne Ferretab comp.-i võtmist

Ärge kasutage ravimit Ferretab comp.:

- Kui olete selle ravimi (toimeained on raudfumaraat ja foolhape) või mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergiline reaktsioon võib avalduda lööbena, sügelusena, hingamisraskusena või näo, huulte, kõri või keele tursena.
- Kui teil on aneemia, mis ei ole tingitud raua või foolhappe puudusest.
- Kui teie organismis on kõrge rauasisaldus või teil on seisund, mis takistab raua imendumist täielikult.
- Kui teil on verepigmenti ainevahetushäired (hemoglobiнопaatia).
- Kui teil on hemolüütiline aneemia, so punaste vererakkude arvu langus nende lagunemise tõttu.
- Kui teil on aplastiline aneemia, so seisund, mille korral luuüdi ei tooda piisaval hulgal uusi vererakke.
- Kui teil on pernitsiosne aneemia, so aneemia, mis on tingitud B₁₂-vitamiini puudusest.
- Kui teil on söögitoru kitsenemine.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- Enne ravimi võtmist on soovitatav nõu pidada arstiga, et teha kindlaks rauavaeguse põhjus. Punaste vererakkude arvu taastumise jälgimiseks on soovitatav teha vereanalüüsi iga 4 nädala järel.
- Ferretab comp.-i võtmise ajal võib väljaheide mõnikord värvuda mustaks, kuid see ei ole haiguslik ilming.

- Raua üleannustamise vältimiseks peab arvestama toidu või toidulisandite rauasisaldusega.
- Teatage apteekrile või arstile, kui teil on mao-soolkonna haigus, nt põletikuline soolehaigus, soolevalendiku kitsenemine, sooleseina sopistus, gastriit, mao- või soolehaavand.

Muud ravimid ja Ferretab comp.

Teatage oma apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes muid ravimeid.

Ferretab comp.-ga samaaegsel kasutamisel võivad esineda koostoimed järgnevate ravimitega:

- antibiootikumid (klooramfenikool, tetratsükliin), mida kasutatakse erinevate bakteriaalsete infektsioonide raviks - võib vähendada nende ja Ferretab comp.-i toimet;
- antatsiidid, nt naatriumbikarbonaat - raua imendumine võib väheneda;
- ravimid, mis sisaldavad kaltsiumbromiidlaktobionaati - raua imendumine võib väheneda;
- penitsillamiin, kasutatakse Wilson'i tõve (ainevahetushaigus) ja reumatoidartriidi korral - ravimisisaldus veres võib väheneda ning toime nõrgeneda;
- E-vitamiin (tokoferool) - raua imendumine võib väheneda;
- tsinki sisaldavad ravimid - Ferretab comp.-i toimel võib tsingi sisaldus veres väheneda;
- askorbiinhape (C-vitamiin): raua imendumine võib suurened.

Ferretab comp. koos toidu ja joogiga

Ärge võtke Ferretab comp.-i koos piimatoodetega, munade või kofeiini sisaldavate jookidega (tee, kohv), sest need tooted vähendavad ravimi toimet. Ferretab comp. kapslid tuleb alla neelata tervelt ja katki närimata koos klaasitäie veega. Soovitav on võtta tühja kõhuga.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Ferretab comp.-i võib kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ferretab comp. ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitlemise võimet.

Ferretab comp. sisaldab laktoosmonohüdraati (piimasuhkur). Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Ferretab comp. sisaldab asorubiini (E122), mis võib tekitada allergilisi reaktsioone.

3. Kuidas Ferretab comp.-i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitav annus täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele on üks kapsel päevas. Tõsistel juhtudel võib ööpäevast annust suurendada kuni 1 kapslini 2...3 korda päevas.

Raseduse ajal on maksimaalne soovitatav ööpäevane annus 2 kapslit.

Kapsel tuleb tervelt alla neelata koos klaasitäie veega enne sööki.

Ärge närige ega imege kapslit, sest see võib lisada kõrvaltoimeid.

Võtke Ferretab comp.-i vähemalt 8 nädalat. Iga 4 nädala järel on soovitatav arsti määratud vereprooviga kontrollida rauasisaldust vereseerumis ja punaste vererakkude arvu.

Kui te võtate Ferretab comp.-i rohkem kui ette nähtud

Võtke kohe ühendust lähima haigla või arstiga. Juua tuleb piima ja toorest muna, et aeglustada raua imendumist.

Võtke kaasa ülejäänud kapslid ja pakendi infoleht, et tervishoiutöötaja teaks, mis ravimiga on tegemist.

See ravim on väga ohtlik lastele ja seda tuleb hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Üleannustamise sümptomid võivad olla järgnevad:

1...6 tundi pärast manustamist: kõhuvalu, oksendamine, tavaliselt tumedat värvi väljaheide, kooma, verejooks seedetraktist, kollaps vereringe häirest (šokk).

6...24 tundi pärast manustamist: palavik, valgete vererakkude arvu suurenemine (leukotsütoos), vere happelisuse suurenemine (metaboolne atsidoos), hüübivushäired, maksa ja neerude kahjustus.

Kui te unustate Ferretab comp.-i võtta

Võtke annus nii pea kui teile meenub. Järgmine annus võtke tavapärasel ajal.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ferretab comp. võib põhjustada allergilisi reaktsioone, tõsiseid reaktsioone esineb väga harva.

Teavitage kohe oma arsti kui teil tekib mõni järgnevatest sümptomitest: hingamisraskus, nahalööve või kollaps.

Teised kõrvaltoimed:

Väga harv (esineb vähem kui 1 inimesel 10000-st Ferretab comp.-i kasutajast)

Ravi rauapreparaadiga võib põhjustada verepigmenti ainevahetushäireid (paroksüsmaalsed öist hemoglobiinuuriat, erütropoeetilist porfüüriat või porfüüriat koos nahanähtude ja maksatalitlushäiretega)

Esinemissagedus teadmata:

Täiskõhutunne

Ebamugavustunne maos

Kõhuvalu

Iiveldus

Oksendamine

Kõhulahtisus

Tume väljaheide

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas Ferretab comp.-i säilitada

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida sisepakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ferretab comp. sisaldab

- Toimeained on raud(II)fumaraat ja foolhape. Üks kapsel sisaldab 152,10 mg raud(II)fumaraati (vastab 50 mg kahevalentssele rauale) ja 0,50 mg foolhapet.
- Abiained on laktoosmonohüdraat, polüakrülaadidispersioon 30% (sisaldab nonoksünool 100), kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos, asorubiin (E 122), kinoliinkollane (E 104), titaandioksiid (E 171), želatiin.

Kuidas Ferretab comp. välja näeb ja pakendi sisu

Kapslid on punast värvi. Üks kõvakapsel sisaldab kolme punakaspruuni raudfumaraadi minitabletti ja ühte kollast foolhapet minitabletti.

PVC/alumiinium blisterpakendis on 30 või 100 kapslit.

Müügiloa hoidja ja tootja

G.L. Pharma GmbH., Schlossplatz 1, A-8502 Lannach, Austria.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Covalent OÜ

Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, Eesti

Tel: +3726600945, fax: +3726600946

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2011