

Pakendi infoleht: teave kasutajale Iberogast, suukaudne vedelik

Enne ravimi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Iberogast ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Iberogast'i võtmist
3. Kuidas Iberogast'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Iberogast'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Iberogast ja milleks seda kasutatakse

Iberogast on taimne ravim, mida kasutatakse seedetrakti funktsionaalsetest ja liikuvuse häiretest (funktsionaalne seedehäire ja ärritunud soole sündroom) tingitud sümptomite (täiskõhutunne, kõhupuhitus, spastilised valud) leevendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Iberogast'i võtmist

Ärge võtke Iberogast'i

- kui te olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Piisava kogemuse puudumise tõttu ei tohi Iberogast'i anda alla 3-aastastele lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

See ravim sisaldab annuse kohta 31 mahu% etanooli (alkohol), st kuni 240 mg, mis vastab 6,2 ml õllele või 2,6 ml veinile. Ravim on kahjulik alkoholismi põdevatele patsientidele. Seda tuleb arvestada ka rasedate või rinnaga toitvate naiste puhul, samuti annustamisel lastele ja riskirühma kuuluvatele (nt maksahaiguse või epilepsiaga) patsientidele.

Kui teie kaebused püsivad või kui ravimi kasutamisest oodatav toime ei ole saanud 14 päeva jooksul, konsulteerige oma arstiga.

Muud ravimid ja Iberogast

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Iberogast sisaldab etanooli

See ravim sisaldab annuse kohta 31 mahu% etanooli (alkohol).

3. Kuidas Iberogast'i võtta

Kui arst ei ole määranud teisiti, siis tuleb Iberogast'i võtta koos vähese vedelikuga enne sööki või söögi ajal järgmiselt:

- **täiskasvanud ja üle 13-aastased noorukid:** 20 tilka korraga 3 korda päevas;
- **6...12-aastased lapsed:** 15 tilka korraga 3 korda päevas;
- **3...5-aastased lapsed:** 10 tilka korraga 3 korda päevas.

Põhimõtteliselt ei ole ravimi kasutamise kestus piiratud, see sõltub haigusest, selle raskusastmest ja kulust.

Enne kasutamist loksutada!

Kui te võtate Iberogast'i rohkem kui ette nähtud

Jätkake järgmine kord ravimi võtmist nii, nagu arst on teile määranud või nagu on kirjeldatud selles infolehes.

Seni ei ole täheldatud ägeda üleannustamise nähte.

Kui te unustate Iberogast'i võtta

Jätkake järgmine kord ravimi võtmist nii, nagu arst on teile määranud või nagu on kirjeldatud selles infolehes.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva võivad ilmnedä ülitundlikkusreaktsioonid nagu nahalööve, sügelus ja hingeldushood. Nende kõrvaltoimete ilmnemisel tuleks Iberogast'i kasutamine lõpetada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Iberogast'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Pärast pudeli esmast avamist võib ravimit kasutada 8 nädalat.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Iberogast sisaldab

100 ml vedeliku koostis:

Alkoholi ekstrakt värsketest taimedest:

Mõru iberis - värsked taim

(1 : 1,5-2,5) 15,0 ml

(ekstrahent: 50% etanool (v/v))

Alkoholi ekstrakt droogidest:

Kikkaputke juured	(1 : 2,5-3,5)	10,0 ml
Kummeli õied	(1 : 2-4)	20,0 ml
Köömned	(1 : 2,5-3,5)	10,0 ml
Hariliku maarjaohaka viljad	(1 : 2,5-3,5)	10,0 ml
Melissi lehed	(1 : 2,5-3,5)	10,0 ml
Piparmündi lehed	(1 : 2,5-3,5)	5,0 ml
Vereurmarohi	(1 : 2,5-3,5)	10,0 ml
Lagritsa juured	(1 : 2,5-3,5)	10,0 ml

(ekstrahent: 30% etanool (v/v))

Ravim sisaldab 31 mahu% etanooli.

Kuidas Iberogast välja näeb ja pakendi sisu

Iberogast'i vedelik on pruunist klaasist pudelis, millel on tilguti ja keeratav kork.

Pudel on 20 ml, 50 ml või 100 ml vedelikku.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

Bayer UAB
Žirmunu 68A
LT-09124 Vilnius
Leedu

Tootja:

STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH
Havelstraße 5
64295 Darmstadt
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Bayer OÜ
Lõotsa 2
11415 Tallinn
Tel: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2014