

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nerheel tabletid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis preparaat on Nerheel ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Nerheel'i kasutamist.
3. Kuidas Nerheel'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Nerheel'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. MIS RAVIM ON NERHEEL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Nerheel on homöopaatiline preparaat.

Nerheel on kõrgkvaliteetne preparaat.

Naturaalsed spetsiifilised komponendid tagavad ravimi suurepärase taluvuse ja efektiivsuse.

Kaks nendest põhjustavad ravimi Nerheel spetsiifilise lõhna ja värvuse.

Tumedavärviline toimeaine Sepia põhjustab tablettide tumedat tooniseäralik lõhn on tingitud palderjanist.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE NERHEEL'I KASUTAMIST

Ärge võtke Nerheeli, kui

- te olete allergiline või ülitundlik Nerheel'i. mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.
- kui Teil on ülitundlikkus bromile.

Muud ravimid ja Nerheel

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Nerheel'i kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismide ja masinatega töötamist.

Nerheel sisaldab laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS NERHEEL'i KASUTADA

Võtke Nerheel'i alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Tavaline annus on 1 tablett 3 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni.

Kui teil on tunne, et Nerheeli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Nerheeli rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisest ei ole teavitatud

Kui te unustate Nerheeli võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Nerheeli võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Nerheel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse) reaktsioone nt. nahalööve või seedetraktivaevused (vähem kui 1 juhtum 10 000 kasutajate kohta).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. KUIDAS NERHEEL'i SÄILITADA

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Nerheel'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.>

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nerheel sisaldab

Toimeained: 1 tablett sisaldab:

1. *Acidum phosphoricum D4* 60 mg;
2. *Strychnos ignatii D4* 60 mg;
3. *Sepia officinalis D4* 60 mg;
4. *Kalium bromatum D4* 30 mg;
5. *Zincum isovalerianicum D4* 30 mg.

Abiained:

1. Laktoosmonohüdraat 60 mg;
2. Magneesiumstearaat 1,5 mg

Kuidas Nerheel välja näeb ja pakendi sisu

Pappkarp, milles plastpurk 50 või 250 tabletiga.

Tableti kirjeldus: ümar, valge, siledapinnaline tablett kaldservaga, halli varjundiga, kohati on nähtavad mustad laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

Müügiloa hoidja ja tootja Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel. +49 7221 501-00

Faks. +49 7221 501 485

E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS

Võru tn 11

13612 Tallinn

Eesti

Tel. +372 - 6328 830

e-mail: info@aconit.ee

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014