

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Diclac 1%, geel Diklofenak

Enne ravimi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabei saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust oma arstiga.

Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on Diclac 1% ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Diclac 1% kasutamist
3. Kuidas Diclac 1% kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Diclac 1% säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Diclac 1% ja milleks seda kasutatakse

Diclac 1% geel kuulub valuvaigistavate ja põletikuvastaste ravimpreparaatide rühma (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid).

Diclac 1% kasutatakse nõrga kuni mõõduka valu ja põletiku paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.

2. Mida on vaja teada enne Diclac 1% kasutamist

Ärge kasutage Diclac 1% järgmistel juhtudel

- kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui atsetüülsalitsüülhappe või teised mittesteroidsed põletikuvastased ained kutsuvad teile esile astma-, nõgestõve- (urtikaaria-) või ägeda nohu hoogusid;
- kui teil on raseduse viimane trimester.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Üldised soovitusused

- kui te kasutate ravimit suurtel nahapindadel pikema aja jooksul. Juhul kui selline ravi on plaanis, siis tuleks teil tutvuda diklofenaki süsteemsete vormide pakendi infolehega.
- Diclac 1% geeli tohib manustada ainult tervele nahapinnale (kus ei ole lahtisi haavu ega vigastusi). Vältida tuleb selle sattumist silma või limaskestadele ning samuti geeli allaneelamist.

Diclac 1% geeli tohib kasutada tavaliste sidemetega, kuid mitte õhukindlate sidemetega.

Diclac 1% geel sisaldab abiainena propüleenglükooli, mis võib osal inimestel põhjustada kerget lokaalset nahaärritust.

Muud ravimid ja Diclac

Diclac 1% geeli õigel kasutamisel ei ole koostoimeid teiste ravimitega täheldatud. Siiski palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Ärge kasutage Diclac 1% geeli kui te olete rase, eriti raseduse viimasel kolmel kuul, kuna see võib kahjustada teie sündimata last ning põhjustada probleeme sünnitusel. Loomkatsed ei ole näidanud otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüonaalsele/loote arengule, sünnitusele ega sünnitusjärgsele arengule .

Imetamine

Ei ole teada, kas paikselts kasutatav diklofenak eritub rinnapiima ja seetõttu ei soovitata Diclac 1% geeli imetamise ajal kasutada. Kui Diclac 1% geeli kasutamine on imetamise ajal vältimatult vajalik, siis ei tohi seda manustada rindadele või suurtele kehapiindadele, samuti ei tohi seda kasutada pika perioodi vältel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Diklofenaki kutaanne manustamine ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

3. Kuidas Diclac 1% kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Järgnevad andmed kehtivad juhul, kui teie arst ei ole Diclac 1% geeli teile teistsuguses annuses või kestuses ette kirjutanud. Palun pidage kinni kasutusjuhistest, sest vastasel korral ei toimi Diclac 1% geel õigesti!

Diclac 1% kasutatakse kolm korda päevas. Vajitava ravimi kogus sõltub valutava piirkonna suurusel. Tavaliselt on piisavaks koguseks kirsiki kuni kreeka pähkli suurusel vastav kogus geeli (selle kogusega saab katta vastavalt 400...800 cm² naha piirkonna).

Manustamisviis ja kestus

Diclac 1% on mõeldud ainult välispidiseks kasutamiseks.

Diclac 1% geeli määratakse õhukese kihina ravi vajavale kehapiinnale ja hõõrutakse kergelt sisse.

Diclac 1% geel peab kuivama mõne minuti enne kehapiinna riietega katmist. Kehapiinda ei soovitata sidemega katta.

Diclac 1% geeli võib kasutada ka abistava ravina koos teiste diklofenakki sisaldavate ravimvormidega.

Arst määrab manustamise kestuse.

Lapsed

Diclac 1% geeli ei soovitata kasutada lastel.

Eakad

Eakate puhul võib kasutada tavalisi täiskasvanutele mõeldud annuseid.

Kui te kasutate Diclac 1% rohkem kui ette nähtud

Kui nahale on sattunud soovitatud annusest rohkem geeli, tuleb see eemaldada ja nahka veega pesta. Kui kasutatud on soovitatud annusest oluliselt suuremaid koguseid või kui Diclac 1% geeli on kasutatud tahtmatult, tuleb sellest teatada arstile. Puuduvad spetsiaalsed vastumürgid.

Kui unustate Diclac 1% kasutada

Kui te olete unustanud õigeaegselt geeli manustada, püüdke edaspidi geeli regulaarselt kasutada. Palun pidage nõu oma arstiga, kui te ei ole kindel, kas ravi katkestada või enneaegselt lõpetada.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Diclac 1% põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud kõrvaltoimed on järgmised:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (ilmnevad 1 kuni 10-l inimesel 100-st):

- nahapõletik e dermatiit (sealhulgas kontaktdermatiit), lööve, nahapunetus (erüteem), ekseem, sügelus

Harva esinevad kõrvaltoimed (ilmnevad 1 kuni 10 kasutajal 10000-st):

- villiline nahapõletik (bulloosne dermatiit)

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (ilmnevad vähem kui 1 kasutajal 10000-st):

- mädavilliline (pustuloosne) nahalööve;
- ülitundlikkus (sealhulgas nõgestõbi e urtikaaria), angiödeem (allergiline reaktsioon näo, huulte, kõri ja/või keele tursega);
- astma;
- valgustundlikkuse reaktsioonid

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Diclac 1% säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diclac 1% sisaldab

- Toimeaine on diklofenaknaatrium. 1 g geeli sisaldab 10 mg diklofenaknaatriumi.
- Teised abiained on ammoniaagi 10% lahus, ikarbomeer (980), deküüloleaat, naatriumedetaat (FE), oktüüldodekanool (FE), letsitiin, isopropüülalkohol, RRR-alfa-tokoferool, lõhnaained, puhastatud vesi.

Kuidas Diclac 1% välja näeb ja pakendi sisu

Diclac 1% on kergelt kollakas emulsioongeel iseloomuliku isopropüülalkoholi lõhnaga.

Diclac 1% on 25g, 50g ja 100g tuubides saadaval.

Kõiki pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Sandoz d.d.

Verovškova 57

1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootjad

Salutas Pharma GmbH
Otto-vonGuericke-Allee 1
39179 Barleben
Saksamaa

Salutas Pharma GmbH
Lange Göhren 3
39171 Osterweddingen
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Sandoz d.d. Eesti filiaal
Pärnu mnt 105
11312 Tallinn
Tel + 372 6652400

Infoleht on viimati koostöölstatud veebruaris 2014.