

PAKENDI INFOLEHT:INFORMATSIOON KASUTAJALE

Septolete Lemon, 1.2 mg losengid Tsetüülpüridiinkloriid

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Septolete Lemon'it täpselt vastavalt juhistele.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Kui pärast 3 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti poole.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Septolete Lemon ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Septolete Lemon'i võtmist
3. Kuidas Septolete Lemon'it võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Septolete Lemon'it säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON SEPTOLETE LEMON JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Septolete Lemon'i losengid (imemistabletid) avaldavad paikset mikroobivastast toimet. Need sisaldavad antiseptilist tsetüülpüridiinkloriidi, mis lagundab baktereid ja seeni ning mõningal määral pärsib see ka viiruste arenemist. Imemistabletid desinfitseerivad suuõõnt ja kurku, leevendades seeläbi suuõõne- ja kurgupõletikku.

Septolete Lemon on näidustatud suuõõne ja neelu antiseptikaks bakterite ja seente poolt põhjustatud infektsioonide korral.

Tänu oma heale märgumisvõimele ja väikesele pindpinevusele tungib tsetüülpüridiinkloriid ka suu ja neelu limaskestade raskesti ligipääsetavatesse osadesse ning pärsib bakterite kasvu.

Septolete Lemon'i imemistablettidel on meeldiv ja värskendav sidruni maitse.

Nad ei sisalda sahharoosi, mida bakterid kasvuks vajavad, seetõttu ei põhjusta nad hammaste lagunemist; antiseptikumi toime on palju parem suhkruvabas aluses.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE SEPTOLETE LEMON'I VÕTMIST

Ärge kasutage Septolete Lemon'it

- kui te olete allergiline (ülitundlik) tsetüülpüridiinkloriidi või Septolete Lemon'i mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Septolete Lemon

- kui teil on suus lahtised haavad (näiteks peale hamba väljatõmbamist, kurgumandlite kirurgilist eemaldamist jne.), sest tsetüülpüridiinkloriid võib aeglustada haavade paranemist;
- kui teil on tõsine nakkus, millega kaasneb kõrge palavik, peavalu ja oksendamine; võtke ühendust oma arstiga, eriti kui teie seisund ei parane 3 päeva jooksul;

- kui teil on suhkurtõbi, peate te meeles pidama, et iga imemistablett sisaldab umbes 1 g maltitooli. Aeglase hüdrolyüsumise ja imendumise tõttu seedetraktis on maltitoolil mõningane toime veresuhkru tasemele.

Imemistablette ei soovitata anda alla 4-aastastele lastele.

Ei soovitata kasutada suuremaid annuseid, kui on välja kirjutatud.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ei ole täheldatud, et Septolete Lemon'i imemistabletid avaldaksid mõju teistele ravimitele.

Septolete Lemon'i võtmine koos toidu ja joogiga

Ärge võtke imemistablette koos piimaga, sest piim vähendab Septolete Lemon'i efektiivsust. Ärge võtke Septolete Lemon'it vahetult enne sööki või söögi ajal. Pärast ravimi võtmist ärge sööge ega jooge vähemalt üks tund.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Et ravimi ohutu kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal on andmed piiratud, ei soovitata seda raseduse ja imetamise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Septolete Lemon losengide mõjust autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele teateid ei ole.

Oluline teave mõningate Septolete Lemon'i koostisainete suhtes

Imemistabletid sisaldavad looduslikku värvainet, seetõttu võib nende värv aja jooksul pleekida, kui neid hoitakse valgusküllases kohas.

Septolete Lemon sisaldab maltitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, siis võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

3. KUIDAS SEPTOLETE LEMON'IT VÕTTA

Kasutage Septolete Lemon losenge alati täpselt nii, nagu on kirjas selles infolehes või arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed

Iga 2...3 tunni järel lasta 1 imemistabletil suus lahustuda, kuni 8 imemistabletti päevas.

10...12-aastased lapsed

Iga 3...4 tunni järel lasta 1 imemistabletil suus lahustuda, kuni 6 imemistabletti päevas.

4...10-aastased lapsed

Iga 3...4 tunni järel lasta 1 imemistabletil suus lahustuda, kuni 4 imemistabletti päevas.

Ärge võtke imemistablette vahetult enne sööki või söögi ajal. Pärast ravimi võtmist ärge sööge ega jooge vähemalt üks tund.

Kui teil on tunne, et Septolete Lemon'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Septolete Lemon'it rohkem kui ette nähtud

Arvestades toimeainete kogust igas imemistabletis on üleannustamise võimalus minimaalne. Suure arvu imemistablettide allaneelamine võib põhjustada seedetraktihäireid, iiveldust, oksendamist ja

kõhulahtisust. Sellisel juhul lõpetage ravimi kasutamine, jooge palju vett või piima ja pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Septolete Lemon'it võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Septolete Lemon põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage	Esineb rohkem kui 1- patsiendil 10-st
Sage	Esineb 1-l kuni 10-l patsiendil 100-st
Aeg-ajalt	Esineb 1-l kuni 10-l patsiendil 1000-st
Harv	Esineb 1-l kuni 10-l patsiendil 10000-st
Väga harv	Esineb vähem kui 1-l patsiendil 10000-st
Sagedus teadmata	Sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Harv (esineb 1-l kuni 10-l patsiendil 10000-st):

- seedetraktihäired, eriti tundlikel inimestel ja ettenähtust suuremate annuste kasutamisel.

Väga harv (esineb vähem kui 1-l patsiendil 10000-st):

- ülitundlikkusreaktsioonid nagu ärritus ja lööve.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS SEPTOLETE LEMON'IT SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

6. LISAINFO

Mida Septolete Lemon sisaldab

- Toimeaine on tsetüülpiridiinkloriid. 1 loseng (imemistablett) sisaldab 1,2 mg tsetüülpiridiinkloriidi.
- Abiained on: vedel maltitool, maltitool (E965), mannitool (E421), levomentool, sidruniõli, glütserool (E422), riitsinusõli, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat (E572), povidoon, farmatseutilised vahad (mesilasvaha (E901), karnaubavaha (E903), šellak (E904)), titaandioksiid (E171), laimi maitseaine, sidruni maitseaine, apelsiniõli maitseaine, kollane värvaine (kurkumiin (E100), vesi, kummiaraabik (E414), maltodekstriin, sidrunhape (E330), rasvhapete mono- ja diglütseriidide sidrunhappeestrid (E472c), naatriumbensoaat (E211) ja kaaliumsorbaat (E202)).

Kuidas Septolete Lemon välja näeb ja pakendi sisu

Imemistabletid on kollast värvi, ümmargused ja kergelt kaksikkumerad.

Imemistabletid on saadaval 18 kaupa karpides. Karbid sisaldavad 2 mullpakendit, kummaski 9 imemistabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati kooskõlastatud: juulis 2011