

## PAKENDI INFOLEHT:INFORMATSIOON KASUTAJALE

### Septolete Cherry, 1.2 mg losengid Tsetüülpüridiinkloriid

#### **Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Septolete Cherry't täpselt juhistele vastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui pärast 3 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti poole.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

#### **Infolehes antakse ülevaade:**

1. Mis ravim on Septolete Cherry ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Septolete Cherry võtmist
3. Kuidas Septolete Cherry't võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Septolete Cherry't säilitada
6. Lisainfo

## **1. MIS RAVIM ON SEPTOLETE CHERRY JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE**

Septolete Cherry losengid (imemistabletid) avaldavad paikset mikroobivastast toimet. Need sisaldavad antiseptilist tsetüülpüridiinkloriidi, mis lagundab baktereid ja seeni ning mõningal määral pärsib see ka viiruste arenemist. Imemistabletid desinfitseerivad suuõont ja kurku, leevendades seeläbi suuõõne- ja kurgupõletikku.

Septolete Cherry on näidustatud suuõõne ja neelu antiseptikaks bakterite ja seente poolt põhjustatud infektsioonide korral.

Tänu oma heale märgumisvõimele ja väikesele pindpinevusele tungib tsetüülpüridiinkloriid ka suu ja neelu limaskestade raskesti ligipääsetavatesse osadesse ning pärsib bakterite kasvu.

Septolete Cherry imemistablettidel on meeldiv ja värskendav maguskirsi maitse. Nad ei sisalda sahharoosi, mida bakterid kasvuks vajavad, seetõttu ei põhjusta nad hammaste lagunemist; antiseptikumi toime on palju parem suhkruvabas aluses.

## **2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE SEPTOLETE CHERRY VÕTMIST**

#### **Ärge kasutage Septolete Cherry't**

- kui te olete allergiline (ülitundlik) tsetüülpüridiinkloriidi või Septolete Cherry mõne koostisosa suhtes.

#### **Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Septolete Cherry**

- kui teil on suus lahtised haavad (näiteks peale hamba väljatõmbamist, kurgumandlite kirurgilist eemaldamist jne.), sest tsetüülpüridiinkloriid võib aeglustada haavade paranemist;
- kui teil on tõsine nakkus, millega kaasneb kõrge palavik, peavalu ja oksendamise; võtke ühendust oma arstiga, eriti kui teie seisund ei parane 3 päeva jooksul;

- kui teil on suhkurtõbi, peate te meeles pidama, et iga imemistablett sisaldab umbes 1 g maltitooli. Aeglase hüdrolyüsumise ja imendumise tõttu seedetraktis on maltitoolil mõningane toime veresuhkru tasemele.

Imemistablette ei soovitata anda alla 4-aastastele lastele.

Ei soovitata kasutada suuremaid annuseid, kui on välja kirjutatud.

### **Võtmine koos teiste ravimitega**

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ei ole täheldatud, et Septolete Cherry imemistabletid avaldaksid mõju teistele ravimitele.

### **Septolete Cherry võtmine koos toidu ja joogiga**

Ärge võtke imemistablette koos piimaga, sest piim vähendab Septolete Cherry efektiivsust. Ärge võtke Septolete Cherry't vahetult enne sööki või söögi ajal. Pärast ravimi võtmist ärge sööge ega jooge vähemalt üks tund.

### **Rasedus ja imetamine**

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Et ravimi ohutu kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal on andmed piiratud, ei soovitata seda raseduse ja imetamise ajal kasutada.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Septolete Cherry losengide mõjust autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele teateid ei ole.

### **Oluline teave mõningate Septolete Cherry koostisainete suhtes**

Imemistabletid sisaldavad looduslikku värvainet, seetõttu võib nende värv aja jooksul pleekida, kui neid hoitakse valgusküllases kohas. See ei mõjuta losengide efektiivsust.

Septolete Cherry sisaldab maltitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, siis võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

## **3. KUIDAS SEPTOLETE CHERRY'T VÕTTA**

Kasutage Septolete Cherry losenge alati täpselt nii, nagu on kirjas selles infolehes või arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### *Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed*

Iga 2...3 tunni järel lasta 1 imemistabletil suus lahustuda, kuni 8 imemistabletti päevas.

#### *10...12-aastased lapsed*

Iga 3...4 tunni järel lasta 1 imemistabletil suus lahustuda, kuni 6 imemistabletti päevas.

#### *4...10-aastased lapsed*

Iga 3...4 tunni järel lasta 1 imemistabletil suus lahustuda, kuni 4 imemistabletti päevas.

Ärge võtke imemistablette vahetult enne sööki või söögi ajal. Pärast ravimi võtmist ärge sööge ega jooge vähemalt üks tund.

Kui teil on tunne, et Septolete Cherry toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **Kui te võtate Septolete Cherry't rohkem kui ette nähtud**

Arvestades toimeainete kogust igas imemistabletis on üleannustamise võimalus minimaalne. Suure arvu imemistablettide allaneelamine võib põhjustada seedetraktihäireid, iiveldust, oksendamist ja

kõhulahtisust. Sellisel juhul lõpetage ravimi kasutamine, jooge palju vett või piima ja pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### **Kui te unustate Septolete Cherry't võtta**

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

#### **4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu kõik ravimid, võib ka Septolete Cherry põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

<b>Väga sage</b>	Esineb rohkem kui 1- patsiendil 10-st
<b>Sage</b>	Esineb 1-l kuni 10-l patsiendil 100-st
<b>Aeg-ajalt</b>	Esineb 1-l kuni 10-l patsiendil 1000-st
<b>Harv</b>	Esineb 1-l kuni 10-l patsiendil 10000-st
<b>Väga harv</b>	Esineb vähem kui 1-l patsiendil 10000-st
<b>Sagedus teadmata</b>	Sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Harv (esineb 1-l kuni 10-l patsiendil 10000-st):

- seedetraktihäired, eriti tundlikel inimestel ja ettenähtust suuremate annuste kasutamisel.

Väga harv (esineb vähem kui 1-l patsiendil 10000-st):

- ülitundlikkusreaktsioonid nagu ärritus ja lööve.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

#### **5. KUIDAS SEPTOLETE CHERRY'T SÄILITADA**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

#### **6. LISAINFO**

##### **Mida Septolete Cherry sisaldab**

- Toimeaine on tsetüülpiridiinkloriid. 1 loseng (imemistablett) sisaldab 1,2 mg tsetüülpiridiinkloriidi.
- Abiained on: vedel maltitool, maltitool (E965), mannitool (E421), levomentool, sidruniõli, glütserool (E422), riitsinusõli, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat (E572, povidoon, farmatseutilised vahad (mesilasvaha (E901), karnaubavaha (E903), šellak (E904)), titaandioksiid (E171), maguskirsimaitseaine, looduslik punane värvaine (karminhape (E120), naatriumhüdroksiidi vesilahus, sidrunhape).

##### **Kuidas Septolete Cherry välja näeb ja pakendi sisu**

Imemistabletid on violetset värvi, ümmargused ja kergelt kaksikkumerad.

Imemistabletid on saadaval 18 kaupa karpides. Karbid sisaldavad 2 mullpakendit, kummaski 9 imemistabletti.

**Müügiloa hoidja ja tootja**

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati kooskõlastatud: juulis 2011