

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Anastrozole SanoSwiss 1 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Anastrosool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Anastrozole SanoSwiss 1 mg ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Anastrozole SanoSwiss 1 mg' võtmist
3. Kuidas Anastrozole SanoSwiss 1 mg' võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Anastrozole SanoSwiss 1 mg' säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Anastrozole SanoSwiss 1 mg ja milleks seda kasutatakse

Anastrozole SanoSwiss 1 mg kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse aromataasi inhibiitoriteks. Anastrosooli kasutatakse rinnanäärmevähi raviks naistel pärast menopausi.

Anastrosool viib organismis miinimumini kehas toodetava hormooni östrogeeni koguse, takistades organismis aromataasi, kehaomase aine (ensüüm) tootmist.

2. Mida on vaja teada enne Anastrozole SanoSwiss 1 mg' võtmist

Ärge võtke Anastrozole SanoSwiss 1 mg':

- kui olete **anastrosooli või selle ravimi mis tahes koostisosade** (loetletud lõigus 6) **suhtes allergiline**;
- kui te olete **rase või toidate last rinnaga** (vt lõik „Rasedus ja imetamine“).

Ärge võtke Anastrozole SanoSwiss 1 mg', kui midagi eelnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Anastrozole SanoSwiss 1 mg' võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Anastrozole SanoSwiss 1 mg' kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

- kui teil esineb veel menstruatsioone ja teil ei ole veel olnud **menopausi**.
- kui te võtate ravimit, mis sisaldab **tamoksifeeni** või ravimeid, mis sisaldavad östrogeeni (vt lõik „Muud ravimid ja Anastrozole SanoSwiss 1 mg“).
- kui te olete kunagi põdenud haigust, mis mõjutab **luude** tugevust (osteoporoos).
- kui teil on probleeme **maksa või neerudega**.

Kui te ei ole kindel, kas midagi eelnevast võib kehtida teie kohta, pidage enne Anastrozole SanoSwiss 1 mg' võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te lähete haiglaravile, teavitage meditsiinipersonali, et te võtate Anastrozole SanoSwiss 1 mg'.

Muud ravimid ja Anastrozole SanoSwiss 1 mg

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid. Siia kuuluvad ka ilma retseptita ostetud ravimid ja taimsed preparaadid. Selle soovitusel aluseks on asjaolu, et anastrosool võib mõjutada mõningate teiste ravimite toimet ja mõningad teised ravimid võivad mõjutada anastrosooli toimet.

Ärge võtke Anastrozole SanoSwiss 1 mg', kui te võtate juba mõnda järgmistest ravimitest:

- teatud ravimid, mida kasutatakse rinnanäärmevähi raviks (östrogeenretseptorite selektiivsed modulaatorid), nt ravimid, mis sisaldavad **tamoksifeeni**, sest need ravimid võivad pärssida Anastrozole SanoSwiss 1 mg' toimet.
- **östrogeeni** sisaldavad ravimid, näiteks hormoonasendusravi (HAR).

Kui see kehtib teie kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

- ravim, mida nimetatakse LHRH analoogiks. Siia kuuluvad gonadoreliin, busereliin, gosereliin, leuproreliin ja triptoreliin. Neid ravimeid kasutatakse rinnanäärmevähi, teatud naistehaiguste (günekoloogiliste haiguste) ja viljatuse raviks.

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke Anastrozole SanoSwiss 1 mg', kui te olete rase või toidate last rinnaga. Rasestumise korral lõpetage Anastrozole SanoSwiss 1 mg' võtmine ja pidage nõu oma arstiga.

Enne ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Anastrozole SanoSwiss 1 mg ei tohiks mõjutada teie autojuhtimise ja masinate või tööriistadega töötamise võimet. Siiski võib aeg-ajalt mõnedel inimestel selle ravimi võtmisel tekkida nõrkus või unisus. Kui see juhtub teiega, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Anastrozole SanoSwiss 1 mg sisaldab laktoosi

Anastrozole SanoSwiss 1 mg sisaldab **laktoosi**, mis on teatud tüüpi suhkur. Kui arst on teile öelnud, et te **ei talu teatud suhkruid**, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas Anastrozole SanoSwiss 1 mg' võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Tavaline annus on üks tablett üks kord ööpäevas.
- Püüdke tablett võtta iga päev samal kellaajal.
- Neelake tablett alla tervelt, koos joogiveega.
- Ei oma tähtsust, kas võtta Anastrozole SanoSwiss 1 mg' enne sööki, söögi ajal või pärast sööki.

Jätkake Anastrozole SanoSwiss 1 mg' võtmist nii kaua, kuni arst on teile seda soovitanud. Tegemist on pikaajalise raviga ning on võimalik, et te peate seda võtma mitmeid aastaid.

Kasutamine lastel

Anastrozole SanoSwiss 1 mg' ei tohi anda lastele ja noorukitele.

Kui te kasutate Anastrozole SanoSwiss 1 mg' rohkem kui ette nähtud

Kui võtsite liiga palju Anastrozole SanoSwiss 1 mg tablette, pöörduge koheselt oma arsti poole.

Kui te unustate Anastrozole SanoSwiss 1 mg' võtta

Kui te unustate annuse võtmata, võtke lihtsalt järgmine annus tavapärasel ajal.

Ärge võtke kahekordset annust (kaht annus üheaegselt), kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Anastrozole SanoSwiss 1 mg' võtmise

Ärge lõpetage tablettide võtmist enne kui arst teile seda ütleb.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 inimesel 10-st)

Peavalu • kuumahood • iiveldus • nahalööve • liigeste valu või jäikus • liigeste põletik (artriit) • luukoe hõrenemine (osteoporoos) • nõrkustunne

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 inimesel 100-st)

Söögiisu kadumine • teatud rasvaine - kolesterooli - taseme tõus või kõrge tase veres; see on nähtav vereanalüüsides • unisus • karpaalkanali sündroom (käelaba teatud osade kipitus, valu, külmatunne, nõrkus) • kõhulahtisus • oksendamine • maksa tööd kajastavate vereanalüüsides tulemuste muutused • juuste hõrenemine (väljalangemine) • allergilised (ülitundlikkus-) reaktsioonid, mis haaravad nägu, huuli või keelt • luuvalu • tupekuivus • tupeverejooks (tavaliselt paaril esimesel ravinädalal - kui verejooks kestab kauem, pidage nõu oma arstiga)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 inimesel 1000-st)

Muutused spetsiifilistes vereanalüüsides, mis näitavad maksa tööd (gamma-GT ja bilirubiin) • maksapõletik (hepatiit) • nõgestõbi e urtikaaria • päästiksõrm (seisund, mille korral teie sõrm või põial lukustub painutatud asendisse)

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 inimesel 10 000-st)

Harvaesinev nahapõletik, mille korral võivad tekkida punased laigud või villid • nahalööve, mille põhjuseks on ülitundlikkus (see võib olla tingitud allergilisest või anafülaktoidsest reaktsioonist) • väikeste veresoonte põletik, mis põhjustab naha värvumist punakaks või lillakaks. Väga harva liigessümptomid, kõhuõõne sümptomid ja neeruvalu, mida nimetatakse Hensch-Schönlein'i purpuriks.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 kasutajal 10 000-st)

Äärmiselt raskekujuline nahareaktsioon haavandumiste või villistumisega (seda nimetatakse Stevensi-Johnsoni sündroomiks) • allergilised (ülitundlikkus-) reaktsioonid koos kõritusega, mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskust - seda nimetatakse angioödemiks

Kui midagi sellist juhtub teiega, kutsuge koheselt kiirabi või pöörduge arsti poole - te võite vajada kiiret arstiabi.

Toimed luudele

Anastrosool langetab östrogeenide - kehaomaste hormoonide - taset organismis. See võib vähendada mineraalide sisaldust luudes. Teie luude tugevus väheneb ja teil võivad kergemini tekkida luumurrud. Teie arst maandab seda riski vastavalt ravijuhistele, mis kehtivad menopausijärgses eas naiste luutervise suhtes. Konsulteerige riskide ja ravivõimaluste teemal oma arstiga.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas Anastrozole SanoSwiss 1 mg' säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoidke tabletid ohutus kohas, kus lapsed neid ei märka ja kust nad neid kätte ei saa. Teie tabletid võivad olla neile kahjulikud.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni:“. Kaks esimest numbrit tähistavad kuud ja neli viimast aastat. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Anastrozole SanoSwiss 1 mg sisaldab

- Toimeaine on anastrosool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg anastrosooli.
- Teised koostisosad tableti sisus on laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), povidoon (E1201) ja magneesiumstearaat (E572).
Teised koostisosad tableti kattes on makrogool 400, hüpromelloos (E464) ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Anastrozole SanoSwiss 1 mg välja näeb ja pakendi sisu

Valged ümmargused kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on tähised “ANA” ja “1”.

Anastrozole SanoSwiss 1 mg on saadaval blistrites, mis sisaldavad 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 või 300 tabletti ja haiglablistrites, mis sisaldavad 28, 50, 84, 98, 300 või 500 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

UAB „SanoSwiss“
Aukštaičių g. 26 A
Kaunas, LT-44157
Leedu Vabariik
info@sanoswiss.com

Tootja:

Synthon BV
Microweg 22
6545 CM Nijmegen
Holland

Synthon Hispania, S.L.
Polígono Las Salinas
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
Hispaania

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste

nimetustega:

Austria	Anastrozol Synthon 1 mg, Filmlabletten
Belgia	Anastrarom 1 mg
Eesti	Anastrozole SanoSwiss 1 mg
Hispaania	Anastrozol Synthon 1 mg comprimidos EFG
Holland	Anastrozol Synthon 1 mg
Iirimaa	Anastrozole Synthon 1 mg
Island	Astrozol 1 mg
Kreeka	Londer 1 mg
Läti	Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes
Leedu	Anastrozole SanoSwiss 1 mg, plēvele dengtos tabletēs
Luksemburg	Astrozol 1 mg
Norra	Anastrozol Synthon 1 mg
Poola	Anastrozol Synthon 1 mg
Portugal	Anastrozol Generis 1 mg comprimidos revestidos por película
Prantsusmaa	Anastrozole Sandoz 1 mg, comprimé pelliculé
Saksamaa	Anastrozol Sandoz 1 mg
Sloveenia	Anastrozol Synthon 1 mg
Slovakkia	Anastrozol Synthon 1 mg
Soome	Anazol 1 mg tabletti, kalvopaalysteinen
Taani	Anastrozol Synthon 1 mg
Tšehhi	Anastrozol Synthon 1 mg
Ungari	Anastrozol Alvogen 1 mg filmlableteta

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2013