

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Mirtazapin Orion, 15 mg suus dispergeeruvad tabletid
Mirtazapin Orion, 30 mg suus dispergeeruvad tabletid
Mirtazapin Orion, 45 mg suus dispergeeruvad tabletid
Mirtasapiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Mirtazapin Orion ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Mirtazapin Orion`i kasutamist
3. Kuidas Mirtazapin Orion`i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Mirtazapin Orion`i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Mirtazapin Orion ja milleks seda kasutatakse

Mirtazapin Orion kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antidepressantideks. Mirtazapin Orion`i kasutatakse depressiooni raviks.

2. Mida on vaja teada enne Mirtazapin Orion`i võtmist

Ärge võtke Mirtazapin Orion`i:

- kui olete mirtasapiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Kui see nii on, rääkige sellest oma arstile esimesel võimalusel enne Mirtazapin Orion`i võtmist;
- kui te võtate või olete hiljuti (viimase kahe nädala jooksul) võtnud ravimeid, mida kutsutakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoriteks (MAOI-d).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Mirtazapin Orion`i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid

Reeglina ei tohi Mirtazapin Orion`i kasutada laste ja alla 18-aastaste noorukite ravimisel, kuna efektiivsus ei ole tõestatud. Samuti tuleb silmas pidada, et alla 18-aastastel lastel esineb antud ravimite rühma kuuluvate ravimite kasutamisel suurenenud risk kõrvaltoimete tekkeks, nt enesetapukatsed, suitsiidimõtted ja vaenulik käitumine (peamiselt agressiivsus, vastandlik käitumine ja viha). Sellele vaatamata võib arst määrata Mirtazapin Orion`i ka alla 18-aastastele patsientidele, kui ta leiab, et see on patsiendile kõige kasulikum. Kui teie arst on Mirtazapin Orion`i välja kirjutanud alla 18-aastasele patsiendile ning te soovite seda läbi arutada, pöörduge palun uuesti oma arsti poole. Teavitage oma arsti, kui alla 18-aastaselt Mirtazapin Orion`i kasutajal tekib või süveneb mõni ülal nimetatud kõrvaltoimetest. Lisaks sellele ei ole antud vanusegrupis veel tõestatud Mirtazapin Orion`i kasutamise pikaajaline ohutus

kasvamisele, küpsemisele ja kognitiivsele (tunnetuslikule) ning käitumuslikule arengule. Lisaks on täheldatud selles vanuserühmas mirtasapiiniga ravimisel sagedamini olulist kehakaalu tõusu võrreldes täiskasvanutega.

Enesevigastamise- ja enesetapumõtted ning depressiooni süvenemine

Kui teil on depressioon võib teil vahel tekkida enesevigastamise- või enesetapumõtteid. Kui hakkate antidepressante võtma, võivad need mõtted alguses tekkida sagedamini, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega, tavaliselt ligikaudu kaks nädalat, kuid vahel ka kauem.

Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida,

- kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele;
- kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega alla 25-aastastel täiskasvanutel, keda raviti antidepressandiga.

Kui teil tekib enesevigastamise- või enesetapumõtteid ükskõik mis ajal, võtke otsekohe ühendust oma arstiga või minge haiglasse.

Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis ning paluge neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie depressioon süveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Eriline ettevaatus on Mirtazapin Orion'iga vajalik ka siis,

- kui teil on või on kunagi olnud ükski allpooltoodud seisunditest. Kui te varem seda teinud pole, rääkige oma arstile nendest seisunditest enne Mirtazapin Orion'i võtmist:
 - **krambid** (epilepsia). Kui teil tekivad krambid või teie krambihood muutuvad sagedamaks, lõpetage Mirtazapin Orion'i võtmine ja pöörduge otsekohe oma arsti poole;
 - **maksahaigused**, sh kollasus. Kui teil tekib kollasus, lõpetage Mirtazapin Orion'i võtmine ja pöörduge otsekohe oma arsti poole;
 - **neeruhaigus**;
 - **südamehaigus** või **madal vererõhk**;
 - **skisofreenia**. Kui psühhootilised sümptomid, nt paranoilised mõtted muutuvad sagedamaks või raskemaks, pöörduge otsekohe oma arsti poole;
 - **maniakaalne depressioon** (kõrgendatud meeleolu/üliaktiivsuse perioodide vaheldumine depressiivse meeleoluga). Kui teil tekib kõrgendatud meeleolu või olete väga erutunud, lõpetage Mirtazapin Orion'i võtmine ja pöörduge otsekohe oma arsti poole;
 - **suhkurtõbi** (võimalik, et peate oma insuliini või teiste antidiabeetiliste ravimite annust korrigeerima);
 - **silmahaigus**, nt silmasisese rõhu tõus (glaukoom);
 - **urineerimishäired**, mis võib olla põhjustatud eesnäärme suurenemisest;
- kui teil ilmneb nakkushaiguse nähte, nt põhjendamatult kõrge palavik, kurguvalu ja suuhaavandid.
 - Lõpetage Mirtazapin Orion'i võtmine ja pöörduge otsekohe vereanalüüsi tegemiseks oma arsti poole. Harvaesinevatel juhtudel võivad need sümptomid viidata vereloomehäiretele luuüdis. Neid sümptomeid esineb harva, kuid kui neid ilmneb, siis kõige sagedamini pärast 4...6-nädalast ravi;
- kui olete eakas inimene. Võimalik, et olete antidepressantide kõrvaltoimete suhtes tundlikum.

Muud ravimid ja Mirtazapin Orion

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge võtke Mirtazapin Orion'i samaaegselt koos

- **monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega** (MAO inhibiitorid). Samuti ärge võtke Mirtazapin Orion'i kahe nädala jooksul peale MAO inhibiitorite võtmise lõpetamist. Kui lõpetate Mirtazapin Orion'i võtmise, ärge järgmise kahe nädala jooksul võtke MAO inhibiitoreid. MAO inhibiitorid on sellised ravimid nagu näiteks moklobemiid, tranüültsüpromiin (mõlemad on antidepressandid) ja selegeliin (kasutatakse Parkinsoni tõve raviks).

Tähelepanu on vajalik, kui võtate Mirtazapin Orion'i samaaegselt koos järgmiste ravimitega:

- **antidepressandid, nt SSRI-d, venlafaksiin ja L-trüptofaan või triptaanid** (kasutatakse migreeni raviks), **tramadool** (valuvaigisti), **linesoliid** (antibiootikum), **liitium** (kasutatakse psühhiaatriliste seisundite raviks) ja **liht-naistepuna – *Hypericum perforatum*'i preparaadiid** (ravimtaim depressiooni raviks). Väga harvaesinevatel juhtudel võib ainult Mirtazapin Orion või Mirtazapin Orion'i samaaegne kasutamine nende ravimitega põhjustada nn serotoniinisündroomi. Selle sündroomi mõned sümptomid on: põhjendamatu palavik, higistamine, südame löögisageduse kiirenemine, kõhulahtisus, (tahtmatud) lihastõmbused, värinad, ülemäära aktiivsed refleksid, rahutus, meeleolu muutused ja teadvuse kaotus. Kui teil ilmneb nende sümptomite kombinatsioon, rääkige sellest otsekohe oma arstile;
- **antidepressant nefasodoon**. See ravim võib tõsta Mirtazapin Orion'i taset veres. Teavitage oma arsti, kui te seda ravimit kasutate. Vajalik võib olla Mirtazapin Orion'i annust vähendada või nefasodooniga ravi lõpetamisel Mirtazapin Orion'i annust taas tõsta;
- **ärevuse või unetuse** raviks kasutatavad ravimid, nt bensodiasepiinid;
- **skisofreenia** raviks kasutatavad ravimid, nt olansapiin;
- **allergia** raviks kasutatavad ravimid, nt tsetirisiin;
- **tugeva valu** vastased ravimid, nt morfiin;
Nende ravimitega kooskasutamisel võib Mirtazapin Orion võimendada nende ravimite poolt põhjustatavat unisust.
- **infektsioonide** raviks kasutatavad ravimid; bakteriaalsete infektsioonide raviks (nt erütromütsiin), seeninfektsioonide raviks (nt ketokonasool), HIV/AIDS-i raviks (HIV proteaasi inhibiitorid) ja maohaavandite raviks (nt tsimetidiin) kasutatavad ravimid.
Mirtazapin Orion'i samaaegsel kasutamisel nende ravimitega võib Mirtazapin Orion' tase veres tõusta. Teavitage oma arsti, kui te neid ravimeid kasutate. Vajalik võib olla Mirtazapin Orion'i annust vähendada või, kui ravi nende ravimitega lõpetatakse, Mirtazapin Orion'i annust taas tõsta;
- **epilepsia** raviks kasutatavad ravimid, nt karbamasepiin ja fentütoiin;
- **tuberkuloosi** raviks kasutatavad ravimid, nt rifampitsiin.
Mirtazapin Orion'i samaaegne kasutamine nende ravimitega võib Mirtazapin Orion'i taset veres langetada. Teavitage oma arsti, kui te neid ravimeid kasutate. Vajalik võib olla Mirtazapin Orion'i annust suurendada või, kui ravi nende ravimitega lõpetatakse, Mirtazapin Orion'i annust taas vähendada;
- **vere hüübimist ärahoidvad** ravimid, nt varfariin.
Mirtazapin Orion võib varfariini toimet verele suurendada. Teavitage oma arsti, kui te seda ravimit kasutate. Nende ravimite samaaegsel kasutamisel on soovitatav, et arst teie vere näitajaid hoolega jälgiks.

Mirtazapin Orion koos toidu, joogi ja alkoholiga

Kui tarvitate Mirtazapin Orion'i võtmise ajal alkoholi, võib see põhjustada unisust.

Soovitatav on alkoholi mitte tarvitada.

Võite võtta Mirtazapin Orion'i koos toiduga või ilma.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Piiratud kogemused, mis on olemas Mirtazapin Orion`i kasutamisest rasedate naiste ravimisest, ei näita riski suurenemist. Sellegipoolest peab raseduse ajal ravimit kasutama ettevaatusega.

Kui võtate Mirtazapin Orion`i kuni sünnituseni või vahetult enne sünnitust, peab vastsündinut jälgima võimalike kõrvaltoimete suhtes.

Raseduse ajal võtmisel võivad seda tüüpi ravimid (SSRI-d) suurendada imikutel riski tõsise seisundi tekkeks, mida nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaalseks hüpertensiooniks (PPHN), mis põhjustab lapse kiiremat hingamist ja naha muutumist sinakaks. Need sümptomid avalduvad tavaliselt esimese 24 tunni jooksul pärast lapse sündi. Kui see juhtub teie lapsega, võtke otsekohe ühendust oma ämmaemanda ja/või arstiga.

Küsi oma arsti käest, kas te võite Mirtazapin Orion`i võtmise ajal rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mirtazapin Orion võib mõjutada teie keskendumisvõimet või erksust. Veenduge, et need võimed ei ole kahjustunud, enne kui asute autot juhtima või masinaid käsitsema. Kui teie arst on Mirtazapin Orion`i välja kirjutanud alla 18-aastasele patsiendile, veenduge enne tema liiklusesse laskmist (nt jalgrattal), et tema keskendumis- ja tähelepanuvõime ei ole nõrgenenud.

Mirtazapin Orion sisaldab aspartaami

Aspartaam on fenüülalaniini allikaks, mis võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga patsientidele.

3. Kuidas Mirtazapin Orion`i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju võtta

Tavaline algannus on 15 või 30 mg ööpäevas. Pärast paaripäevast ravi võib arst teil soovitada annust tõsta kuni teie jaoks sobivaima annuseni (vahemikus 15...45 mg ööpäevas). Reeglina on annus kõikidele vanusegruppidele sama. Siiski, kui olete eakas inimene või teil on neeru- või maksahaigus, võib teie arst annust teie jaoks kohandada.

Millal Mirtazapin Orion`i võtta

Võtke Mirtazapin Orion`i iga päev samal ajal.


Kõige parem on võtta Mirtazapin Orion`i ühekordse annusena enne magamaminekut. Siiski võib arst pakkuda välja võimaluse jagada Mirtazapin Orion`i annus kaheks - üks kord hommikul ja üks kord õhtul enne magamaminekut. Suurema annuse peaks võtma enne magamaminekut.

Võtke suus dispergeeruvaid tablette järgmiselt

Võtke tablette suu kaudu.

1. Ärge purustage suus dispergeeruvat tabletti


Et vältida suus dispergeeruva tableti purunemist, ärge vajutage tabletti pesast välja (Joonis A).



Joonis A

2. Rebige välja üks tabletipesa


Iga blisterleht sisaldab kuus tabletipesa, mis on omavahel augustatud joontega eraldatud. Rebige üks tabletipesa mööda augustatud jooni välja (Joonis 1).



Joonis 1

3. Eemaldage kate

Eemaldage kattefoolium ettevaatlikult alustades noolega märgistatud nurgast (Joonised 2 ja 3).



Joonis 2



Joonis 3

4. Võtke suus dispergeeruv tablett välja

Võtke suus dispergeeruv tablett välja kuivade kätega ja pange see keelele (Joonis 4).



Joonis 4

Tablett laguneb kiiresti ja seda on soovitatav neelata alla veega.

Millal võite oodata enesetunde paranemist

Tavaliselt hakkab Mirtazapin Orion toimima 1...2 nädala pärast ja 2...4 nädala möödudes võite hakata ennast paremini tundma.

On oluline, et te esimeste ravinädalate jooksul räägiksite oma arstiga sellest, kuidas Mirtazapin Orion toimib:

- 2...4 nädalat pärast ravi alustamist Mirtazapin Orion'iga rääkige oma arstile, kuidas see ravim teile on mõjunud.

Kui teie enesetunne ei parane, võib arst teile määrata suurema annuse. Sellisel juhul rääkige oma arstiga uuesti järgmise 2...4 nädala pärast. Reeglina on tarvis Mirtazapin Orion'i võtta 4...6 kuu jooksul kuni depressiooni-sümptomid on taandunud.

Kui te võtate Mirtazapin Orion`i rohkem kui ette nähtud

Kui teie või keegi teine on võtnud liiga palju Mirtazapin Orion`i, helistage otsekohe arstile. Mirtazapin Orion`i üleannustamise (ilma teiste ravimite või alkoholita) kõige tõenäolisemateks ilminguteks on **unisus, segasusseisund ja südame löögisageduse kiirenemine.**

Kui te unustate Mirtazapin Orion`i võtta

Kui teil on ette nähtud annus võtta **üks kord päevas** ja te olete unustanud oma Mirtazapin Orion`i annuse võtmata, ärge võtke vahelejäänud annust. Jätke see lihtsalt vahele. Järgmine annus võtke ettenähtud ajal.

Kui teil on ette nähtud annus võtta **kaks korda päevas**

- kui te olete unustanud võtmata oma hommikuse annuse, võtke see lihtsalt koos õhtuse annusega;
- kui te olete unustanud võtmata oma õhtuse annuse, ärge võtke seda koos järgmise hommikuse annusega; jätke see lihtsalt vahele ja jätkake tavapäraselt ettenähtud hommikuste ja õhtuste annustega;
- kui te olete unustanud võtmata mõlemad annused, ärge üritage vahelejäänud annuseid tasa teha. Jätke mõlemad annused lihtsalt vahele ja jätkake järgmisel päeval tavapäraste hommikuste ja õhtuste annustega.

Kui te lõpetate Mirtazapin Orion`i võtmise

Lõpetage Mirtazapin Orion`i võtmine ainult siis, kui olete arstiga konsulteerinud.

Kui lõpetate võtmise liiga vara, võib teil depressioon tagasi tulla. Kui teie enesetunne paraneb, rääkige sellest oma arstiga. Teie arst otsustab, millal ravi võib lõpetada.

Ärge lõpetage Mirtazapin Orion`i võtmist järsult, isegi kui teie depressioon on taandunud. Kui lõpetate Mirtazapin Orion`i võtmise järsult, võib teil tekkida halb enesetunne, võite tunda pearinglust, rahutust

või ärevust ja teil võib pea valutada. Neid sümptomeid saab vältida kui lõpetate ravimi võtmise järkjärgult. Teie arst selgitab teile, kuidas annust järkjärgult vähendada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Mõned kõrvaltoimed ilmnevad suurema tõenäosusega kui teised. Mirtazapin Orion'i võimalikud kõrvaltoimed on toodud järgnevas loetelus:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

- söögiisu suurenemine ja kehakaalu suurenemine,
- uimasus või unisus,
- peavalu,
- suukuivus.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

- letargia,
- pearinglus,
- värisemine või treemor,
- iiveldus,
- kõhulahtisus,
- oksendamine,
- lööve või nahahäired (eksanteem),
- liigesevalu (artralgia) või lihasevalu (müalgia),
- seljavalu,
- pearingluse või minestamise tunne kui tõusete äkki püsti (ortostaatiline hüpotensioon),
- tursed (tüüpiliselt hüppeliigese või labajalgade tursed), mis on põhjustatud vedelikupeetusest (ödeem),
- väsimus,
- värvikad unenäod,
- segasustunne,
- ärevustunne,
- unehäired.

Alla 18-aastastel lastel täheldati kliinilistes uuringutes sageli järgmisi kõrvaltoimeid: oluline kehakaalu tõus, lööve ja suurenenud vere triglütseriidide tase.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

- kõrgeenenud meeleolu või emotsionaalselt kõrgendatud meeleseisund (mania),
 - Lõpetage Mirtazapin Orion'i võtmine ja rääkige sellest kohe oma arstile.
- ebatavalised nahaärritused, nt põletus-, torkimistunne, kihelus või surisemine (paresteesia), rahutud jalad,
- minestamine (sünkoop),
- tuimustunne suus (oraalne hüpoesteesia),
- madal vererõhk,
- hirmunenäod,
- agiteeritus (erutus),
- hallutsinatsioonid,
- liikumistung.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

- silmade või naha kollasus, mis võib viidata maksafunktsiooni häirele (ikterus),
 - Lõpetage Mirtazapin Orion'i võtmine ja rääkige sellest kohe oma arstile.
- lihastõmbused või -kontraktsioonid (müokloonus),
- agressioon
- kõhunäärme põletik (pankreatiit).

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

- infektsiooninähud, nt äkki tekkiv põhjendamatu kõrge palavik, kurguvalu, haavandid suus (agranulotsütoos),
 - Lõpetage Mirtazapin Orion'i võtmine ja pöörduge otsekohe vereanalüüsi tegemiseks oma arsti poole. Harvaesinevatel juhtudel võib Mirtazapin Orion põhjustada vereloomehäireid (luuüdi supressioon). Mõne inimese puhul langeb nende vastupanuvõime infektsioonidele (nakkustele), sest Mirtazapin Orion võib põhjustada ajutist vere valgeliblede vähesust (granulotsütopeeniat). Samuti võib Mirtazapin Orion harvaesinevatel juhtudel põhjustada vere puna- ja valgeliblede ning ka trombotsüütide vähesust (aplastiline aneemia), trombotsüütide vähesust (trombotsütopeeniat) või vere teatud tüüpi valgeliblede arvu suurenemist (eosinofiilia);
- epilepsiahood (krambid),
 - Lõpetage Mirtazapin Orion'i võtmine ja rääkige sellest kohe oma arstile.
- kõne häire (düsartria),
- selliste sümptomite kombinatsioon, nagu põhjendamatu palavik, higistamine, südame löögisageduse kiirenemine, kõhulahtisus, (tahtmatud) lihastõmbused, värinad, ülemäära aktiivsed refleksid, rahutus, meeleolu muutused ja teadvuse kaotus. Väga harvaesinevatel juhtudel võivad need nähud viidata serotoniinisündroomile,
 - Lõpetage Mirtazapin Orion'i võtmine ja rääkige sellest kohe oma arstile.
- enesevigastamise- või enesetapumõtted,
 - Võtke otsekohe oma arstiga ühendust või minge haiglasse.
- ebanormaalsed aistingud suus (oraalne paresteesia),
- turse suus (suu ödeem),
- süljeerituse suurenemine,
- hüponatreemia (naatriumi vähesus veres),
- antidiureetilise hormooni mittevastav sekretsioon,
- Stevensi-Johnsoni sündroom,
- autoimmuunse villiline nahakahjustus (bulloosne dermatiit),
- põletikuline nahalööve (multiformne erüteem),
- marrasknaha villiline lööve ja koorumine (toksiline epidermaalne nekrolüüs),
- unes kõndimine (somniaambulism).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Mirtazapin Orion'i säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate värvuse muutust või muid riknemise märke.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Mirtazapin Orion sisaldab

- Toimeaine on mirtasapiin. Üks suus disperseeruv tablett sisaldab 15 mg, 30 mg või 45 mg mirtasapiini.
- Teised koostisosad on krospovidoon, mannitool (E 421), mikrokristalne tselluloos, aspartaam (E 951), maasika-guaraana lõhna- ja maitseaine, piparmündi lõhna- ja maitseaine, kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumsteraraat.

Kuidas Mirtazapin Orion välja näeb ja pakendi sisu

15 mg tablett: valge, ümmargune, ühel küljel märgistus "36" ja teisel küljel "A".

30 mg tablett: valge, ümmargune, ühel küljel märgistus "37" ja teisel küljel "A".

45 mg tablett: valge, ümmargune, ühel küljel märgistus "38" ja teisel küljel "A".

Pakendis on 30 (5x6) või 90 (15x6) tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

Tootja:

Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Orion Pharma Eesti OÜ
Tammsaare tee 47
11316, Tallinn
Tel: +372 66 44 550

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2014