

## PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

### Rupafin, 10 mg tabletid

Rupatadiin

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

#### **Infolehes antakse ülevaade:**

1. Mis ravim on Rupafin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Rupafin'i kasutamist
3. Kuidas Rupafin'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Rupafin'i säilitada
6. Lisainfo

### **1. MIS RAVIM ON RUPAFIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE**

Rupatadiin on antihistamiinikum.

Rupafin leevendab allergilise riniidi sümptomeid, nagu aevastamine, nina tilkumine, silmade ja nina sügelemine.

Rupafin'i kasutatakse ka urtikaaria (allergiline nahalööve) sümptomite, nagu sügelus ja kublad (lokaalne nahapunetus ja –paistetus) leevendamiseks.

### **2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE RUPAFIN'I KASUTAMIST**

#### **Ärge kasutage Rupafin'i**

Kui te olete allergiline (ülitundlik) rupatadiini või Rupafin'i mõne koostisosa suhtes.

#### **Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Rupafin**

Kui teil on neeru- või maksapuudulikkus, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Rupafin 10 mg tablette ei soovitata kasutada patsientidel, kellel on halvenenud neeru- või maksafunktsioon. Kui teil on madal vere kaaliumitase ja/või kui teil on teatud südame rütmihäired (nimetatakse pikenenud QTc-intervalliks EKG-s), mis võivad esineda mõnede südamehaiguste korral, pidage nõu oma arstiga.

See ravim ei ole mõeldud kasutamiseks alla 12-aastastel lastel.

Kui te olete vanem kui 65-aastane, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### **Kasutamine koos teiste ravimitega**

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui te võtate Rupafin'i, ärge võtke samal ajal ravimeid, mis sisaldavad ketokonasooli või erütromütsiini.

Kui te võtate kesknärvisüsteemi depressante või statiine, pidage enne Rupafin'i võtmist nõu oma arstiga.

### **Kasutamine koos toidu ja joogiga**

**Rupafin´i ei tohi kasutada koos greipfruudi mahlagaga, kuna see võib suurendada Rupafin´i taset organismis.**

Rupafin´i soovitatud annus (10 mg) ei suurenda alkoholist põhjustatud unisust.

### **Rasedus ja imetamine**

Ärge kasutage Rupafin´i raseduse või imetamise ajal, kui arst ei ole seda teile määranud.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Soovitatud annuses ei tohiks Rupafin avaldada mõju autojuhtimisele ja masinate käsitlemise võimele. Siiski, kui te kasutate Rupafin´i esmakordselt, tuleb olla ettevaatlik enne autojuhtimist või masinate käsitlemist, kuni selgub kuidas ravim teile mõjub.

### **Oluline teave mõningate Rupafin´i koostisainete suhtes**

**See ravim sisaldab laktoosi.**

**Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi võtmist konsulteerima oma arstiga.**

## **3. KUIDAS RUPAFIN´I KASUTADA**

Kasutage Rupafin´i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rupafin on mõeldud kasutamiseks noorukitel (alates 12-aastased) ja täiskasvanutel. Tavaline annus on 1 tablett (10 mg rupatadiini) 1 kord ööpäevas, sõltumata söögiaegadest.

Neelake tablett piisava koguse vedelikuga (nt klaasitäie veega).

Teie arst ütleb teile, kui kaua ravi Rupafin´iga peaks kestma.

### **Kui te kasutate Rupafin´i rohkem kui ette nähtud**

Kui te olete kogemata võtnud ravimit suuremas annuses kui ette nähtud, võtke otsekohe ühendust oma arsti või apteekriga.

### **Kui te unustate Rupafin´i kasutada**

Võtke vahelejäädud annus nii kiiresti kui võimalik, edasi võtke tablette tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

## **4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu kõik ravimid, võib ka Rupafin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st) on unisus, peavalu, pearinglus, suukuivus, nõrkus ja väsimus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st) on söögiisu tõus, ärrituvus, tähelepanuhäired, ninaverejooks, ninakuivus, köha, kurgu kuivus, kurguvalu, nohu, iiveldus, kõhuvalu, kõhulahtisus, seedehäired, oksendamine, kõhukinnisus, nahalööve, seljavalu, liigesvalu, lihasvalu, janu, üldine ebamugavustunne, palavik, muutused maksfunktsiooni analüüsides ja kehakaalu tõus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st) on südamepekslemine ja südame löögisageduse tõus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsisemaks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

## 5. KUIDAS RUPAFIN'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Rupafin'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida blister välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## 6. LISAINFO

### Mida Rupafin sisaldab

- Toimeaine on rupatadiin. Üks tablett sisaldab 10 mg rupatadiini (fumaraadina).
- Abiained on preželatiniseeritud maisitärklis, mikrokristalne tselluloos, punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172), laktoosmonohüdraat ja magneesiumstearaat.

### Kuidas Rupafin välja näeb ja pakendi sisu

Rupafin on ümmargused, lõheroosat värvi tabletid, mis on pakendatud blistrisse 3, 7, 10, 15, 20, 30, 50 ja 100 tableti kaupa. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

### Müügiloa hoidja ja tootja

J. Uriach & Cía., S.A.

Av. Camí Reial, 51-57

E-08184 Palau-solità i Plegamans, Barcelona

Hispaania

### See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Rupatall 10 mg Tablets	Belgia, Luksemburg
Rinialer 10 mg Tablets	Portugal, Malta
Rupafin 10 mg Tablets	Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Eesti, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Iirimaa, Island, Läti, Leedu, Liechtestein, Holland, Norra, Poola, Sloveenia, Slovakkia Vabariik, Hispaania, Ühendkuningriik
Wystamm 10 mg Tablets	Prantsusmaa
Tamalis 10 mg Tablets	Ungari, Tšehhi Vabariik, Rumeenia
Pafinur 10 mg Tablets	Soome, Rootsi

**Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2015**