

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Amlodipine Medochemie, 5 mg tabletid Amlodipine Medochemie, 10 mg tabletid Amlodipiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Äрге andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Amlodipine Medochemie ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Amlodipine Medochemie võtmist
3. Kuidas Amlodipine Medochemie'd võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Amlodipine Medochemie'd säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON AMLODIPINE MEDOCHEMIE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Amlodipine Medochemie kuulub kaltsiumikanali blokaatoriteks nimetatavate ravimite rühma. Amlodipine Medochemie't kasutatakse:

- kõrge vererõhu raviks;
- südamelihase pärgarterite ahenemisest põhjustatud valu korral rinnus (rinnaangiin e stenokardia) või harvematel juhtudel südamelihase pärgarterite kokkutõmbumisest tekkinud valu korral (vasospastiline stenokardia).

Kui teil on kõrge vererõhk, siis Amlodipine Medochemie lõõgastab veresooni ja selle tulemusel saab veri neis kergemini edasi liikuda.

Kui teil on stenokardia, siis Amlodipine Medochemie parandab südamelihase verevarustust, mille tulemusel saab südamelihase enam hapnikku ja sellega hoitakse ära rindkerevalu teke. Amlodipine Medochemie ei leevenda stenokardilist rindkerevalu koheselt.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE AMLODIPINE MEDOCHEMIE VÕTMIST

Äрге võtke Amlodipine Medochemie'd

- kui te olete allergiline (ülitundlik) amlodipiini või Amlodipine Medochemie mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on väga madal vererõhk.
- šokiseisundis.
- kui teil on hemodünaamiliselt ebastabiilne südamepuudulikkus pärast ägedat südamelihaseinfarkti.
- kui teil on aordi kitsenemine (aordi stenoos).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Amlodipine Medochemie

- kui teil on südamepuudulikkus
- kui teil on maksafunktsiooni häire
- kui te käite dialüüsravis
- kui te olete eakas ja vajalik on annuse suurendamine.

Amlodipine Medochemie'd ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ebapiisava kogemuse tõttu.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Õelge alati oma arstile või apteekrile, kui te võtate või saate mõnda järgnevatest ravimitest lisaks Amlodipine Medochemie'le:

- ketokonasool, itrakonasool (seeninfektsioonide vastu) või ritonaviir (AIDS'i ravim), kuna need ravimid võivad suurendada amlodipiini kontsentratsiooni.
- rifampitsiin, kuna see võib amlodipiini kontsentratsiooni vähendada.
- loodusravimid, mis sisaldavad naistepuna (*Hypericum perforatum*), kuna amlodipiini kontsentratsioon võib väheneda.
- teised vererõhku alandavad ravimid ja diureetikumid, kuna amlodipiin võib tugevdada nende toimet.

Amlodipine Medochemie võtmine koos toidu ja joogiga

Amlodipine Medochemie't võib võtta koos toidu ja joogiga.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Võtke Amlodipine Medochemie't ainult vastavalt arsti juhistele.

Imetamine

Kui te toidate rinnaga, ärge võtke Amlodipine Medochemie'd.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Amlodipine Medochemie kasutamine võib anda kõrvaltoimeid, nagu nt pearinglus, peavalu, väsimus või iiveldus, mis rohkemal või vähemal määral võivad mõjutada masinate käsitlemist ja autojuhtimise võimet.

3. KUIDAS AMLODIPINE MEDOCHEMIE'D VÕTTA

Võtke Amlodipine Medochemie'd alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Tavaline annus on 5 mg üks kord päevas. Vajadusel võib teie arst seda suurendada annuseni 10 mg üks kord päevas.

Eakad

Annust tuleb kohandada. Järgige arsti juhiseid. Igasugune annuse suurendamine nõuab ettevaatust.

Maksafunktsioonihäirega patsiendid

Annust tuleb vähendada. Järgige arsti juhiseid.

Tablett tuleb sisse võtta koos klaasitäie veega.

10 mg tableti poolitamine: hoidke tabletti mõlema käega, nii et poolitusjoon jääb pöidla eemale. Suruge tabletile õrnalt peale, et seda kaheks murda.

Kui teil on tunne, et Amlodipine Medochemie toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Amlodipine Medochemie'd rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate juhuslikult liiga palju tablette, võivad ilmned järgmised sümptomid: tugev pearinglus ja/või uimasus, hingamisraskus, sage urineerimine.

Võtke kohe ühendust oma arsti või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga.

Kui te unustate Amlodipine Medochemie'd võtta

Kui olete unustanud tableti võtta, võite seda teha veel kuni 12 tundi pärast õiget aega. Kui aega on kulunud üle 12 tunni, peaksite selle tabletikorra vahele jätma ja võtma järgmise tableti tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Amlodipine Medochemie võtmise

Ravi võib muuta või lõpetada ainult arstiga konsulteerides.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Amlodipine Medochemie põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed:

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel patsiendil kümnest tuhandest, sh üksikjuhud):

- Tõsised nahareaktsioonid, nt nahapõletik ja haavandumine, näo, kõri, käte ja jalgade tursed ning hingamisraskused (angioödeem).
- Valu rindkeres või kahtlustatav südameatakk.
- Silmavalgete või naha kollasus (ikterus).
- Seletamatu palavik, gripi-laadsed sümptomid, nt kurguvalu. Need võivad olla vere valgeliblede vähesuse tunnuseks (leukopeenia).
- Suurenenud kalduvus sinikate või ninaverejooksu tekkeks. Need võivad olla vereliistakute vähenenud arvu tunnuseks (trombotsütopeenia).

Kui ilmneb mõni neist kõrvaltoimetest, pöörduge koheselt oma arsti poole.

Muud kõrvaltoimed:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel patsiendil kümnest, kuid rohkem kui ühel patsiendil sajast):

peavalu (eriti ravi alguses), unisus, pearinglus, iiveldus, kõhuvalud, näo punetus koos kuumatundega, pahklude turse ja üldised tursed (ödeemid) ning nõrkus (väsimus).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel patsiendil sajast, kuid rohkem kui ühel patsiendil tuhandest):

rinnanäärmete turse meestel, seedehäired, suukuivus, torkimistunne nahal, naha puuetundlikkuse langus (hüpesteesia), suurenenud higistamine, nägemishäired, tinnitus (helin kõrvus), unetus, meeoleolu muutused (sh ärevus), depressioon, värinad, minestamine, ebatavaline südamepekslemine (palpitatsioonid), valu.

Madal vererõhk, hingeldamine, vesine nina, oksendamine, kõhulahtisus, maitsetundlikkuse muutused, kõhukinnisus, nahalööve, sügelus, juuste väljalangemine, nahavärvuse muutus, punased täpid naha all (purpura), krambid, seljavalu, lihas- ja liigesevalu, suurenenud urineerimisvajadus (sagenenud urineerimispakitsus), öise uriinihulga ebatavaline suurenemine, suurenenud urineerimissagedus, impotentsus, kehakaalu suurenemine või vähenemine, üldine halb enesetunne.

Harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel patsiendil tuhandest, kuid rohkem kui ühel patsiendil kümnest tuhandest): segasus,.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel patsiendil kümnest tuhandest, sh üksikjuhud):

Kõrge veresuhkru tase, närvitundlikkusehäired (perifeerne neuropaatia), suurenenud lihasjäikus (hüpotoonia), köha, kõhunäärme- maksa või maolimaskestade põletik, maksaensüümide aktiivsuse

tõus veres, igemete turse, veresoonte põletik, allergilised reaktsioonid, millega kaasnevad sügelus ja lööve (mõnikord raskes villilises vormis), nõgeslööve, ebataoline või ebaregulaarne südamerütm, naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS AMLODIPINE MEDOCHEMIE'D SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Amlodipine Medochemie't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Amlodipine Medochemie sisaldab

- Toimeaine on amlodipiin. Üks tablett sisaldab kas 5 mg või 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina).
- Abiained on mikrokristalne tselluloos, veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A) ja magneesiumstearaat.

Kuidas Amlodipine Medochemie välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on valged ja ümmargused. 10 mg tablettidel on ühel küljel poolitusjoon ja tabletti saab jagada kaheks võrdseks osaks.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Medochemie Ltd

1-10 Astronafton & Constantinoupoleos,

3505-Limassol,

Küpros

tel: +357 25 867600

faks: +357 25 560863

Tootjad

Medochemie Ltd

1-10 Astronafton & Constantinoupoleos,

3505-Limassol,

Küpros

tel: +357 25 867600

faks: +357 25 560863

või

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara,

12351 Athens,

Kreeka

tel: +30 210 5401500
faks: +30 210 5401600
e-mail: info@specifar.gr

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Tšehhi:	AFITEN
Küpros:	AFITEN
Eesti:	AMLODIPINE MEDOCHEMIE
Läti:	AMLODIPINE - MEDOCHEMIE
Leedu:	AMLODIPINE - MEDOCHEMIE
Rumeenia:	AMLODIPINE- MEDOCHEMIE
Bulgaaria:	ACCEL
Slovakkia:	ACCEL

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Netdoktor,
Seebi 3,
11316 Tallinn,
tel: 620 8000

Infoleht on viimati koostöölstatud septembris 2011