

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Septolete Plus, losengid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Septolete Plus ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Septolete Plusi võtmist
3. Kuidas Septolete Plusi võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Septolete Plusi säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Septolete Plus ja milleks seda kasutatakse

Septolete Plus imemistabletid avaldavad paikset valuvaigistavat ja mikroobidevastast toimet, Nad desinfitseerivad suuõõnt ja neelu ning leevendavad paikset valu.

Imemistablettides sisalduv antiseptiline aine tsetüülpüridiinkloriid lõhustab mitmesuguseid baktereid ning pärsib mõningal määral ka viiruste ja seente arenemist. Sellisel viisil leevendab ta suuõõnes ja neelus esinevat põletikku ning aitab ära hoida märksa raskema bakteriaalse põletiku teket. Kuna tsetüülpüridiinkloriid jaotub kergesti ning vähendab pindpinevust, tungib ta ka suuõõne ja neelu limaskestast raskesti ligipääsetavatesse piirkondadesse ja pärsib ka seal bakterite kasvu.

Bensokaiin on lokaalne valuvaigisti, mis sobib suuõõne ja neelu infektsioonide ning põletikega sageli kaasneva valuliku neelamise leevendamiseks.

Septolete Plus imemistabletid sisaldavad polüoole maltitooli ja mannitooli. Ravim ei sisalda suhkrut, mida bakterid kasvuks vajavad. Septolete Plus imemistabletid sobivad diabeetikutele, nad ei põhjusta hambakaariest ning nende antiseptiline toime on märksa parem kui suhkrut sisaldavatel preparaatidel.

Millal on soovitatav Septolete Plus imemistablette kasutada?

Septolete Plus imemistablette kasutatakse desinfitseeriva ja valu leevendava vahendina suuõõne ja neelu põletike korral.

2. Mida on vaja teada enne Septolete Plusi võtmist

Ärge võtke Septolete Plusi:

- kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Septolete Plus ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele.

Ärge võtke soovitatutest suuremaid annuseid!

Teadmiseks diabeetikutele: Üks imemistablett sisaldab umbes 1 g maltitooli. Kuna maltitool hüdrolüüsib ning imendub seedetraktist aeglaselt, avaldab ta veresuhkru tasemele vähest mõju. Samuti on maltitooli energeetiline väärtus (10 kJ/g ehk 2,4 kcal/g) tunduvalt madalam suhkru omast.

Muud ravimid ja Septolete Plus

Ühtegi koostoimet ei ole seni täheldatud.

Septolete Plus koos toidu ja joogiga

Ärge manustage Septolete Plusi vahetult enne sööki ega koos piimaga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedad ja last rinnaga toitvad naised võivad Septolete Plus imemistablette kasutada ainult oma arsti soovitusel, kui ravist oodatav kasu ületab võimaliku ohu lootele/lapsele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teateid Septolete Plus imemistablettide autojuhtimis- või liikuvate mehhanismidega töötamise võimekust halvendava toime kohta ei ole.

Septolete Plus imemistabletid sisaldavad polüoole. Polüoolid võivad suurtes annustes põhjustada kõhulahtisust, seda ennekõike lastel.

3. Kuidas Septolete Plusi võtta

Soovitatav annus täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele on kuni 8 imemistabletti ööpäevas. Laske iga 2...3 tunni järel ühel imemistabletil suus sulada.

Soovitatavaks annuseks 6...12-aastastele lastele on kuni 4 imemistabletti ööpäevas. Selles vanuses lapsed peaksid iga 4 tunni järel ühel imemistabletil suus sulada laskma.

Kui te võtate Septolete Plusi rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral konsulteerige oma arsti või apteekriga.

Arvestades imemistablettide toimeainete väikest sisaldust on üleannustamise oht minimaalne. Liiga suure koguse imemistablettide sissevõtmisel võivad tekkida seedetrakti häired: iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Selliste nähtude tekkimisel katkestage imemistablettide võtmine, jooge rohkelt vett või piima ja konsulteerige oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui Septolete Plus imemistablette kasutatakse vastavalt soovitudele, tekib kõrvaltoimeid väga harva. Tundlikel inimestel võivad soovitatust suuremate annuste kasutamisel seedetrakti limaskesta ärrituse tõttu tekkida seedetrakti häired.

Inimestel, kellel esineb ülitundlikkust ravimi mõne koostisosa suhtes, võivad tekkida allergilised reaktsioonid.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas Septolete Plusi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Septolete Plus sisaldab

- Toimeained on bensokaiin ja tsetüülpüridiinkloriid. Üks loseng (imemistablett) sisaldab toimeainetena 5 mg bensokaiini ja 1 mg tsetüülpüridiinkloriidi.
- Abiained: piparmündi eeterlik õli, levomentool, maltitoolsiirup, maltitool, mannitool, glütserool, kastoorõli, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba räni, povidoon, farmatseutilised vahad, titaandioksiid (E171), sinine värvaine V (E131).

Pakendi sisu

18 või 30 imemistabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2013