

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Argofan 75 SR, 75 mg toimeainet prolungeeritud vabastavad tabletid Argofan 150 SR, 150 mg toimeainet prolungeeritud vabastavad tabletid Venlafaksiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on Argofan SR ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Argofan SR'i võtmist
3. Kuidas Argofan SR'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Argofan SR'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Argofan SR ja milleks seda kasutatakse

Argofan SR on antidepressant, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse serotoniini ja norepinefriini tagasihaarde inhibiitoriteks (SNRI). Sellesse rühma kuuluvaid ravimeid kasutatakse depressiooni ja muude seisundite, näiteks ärevushäirete raviks. Arvatakse, et depressiooni ja/või ärevuse seisundis on inimesel serotoniini ja noradrenaliini tase ajus madalam. Antidepressantide toimemehhanism ei ole täielikult teada, kuid need võivad aidata tõsta ajus serotoniini ja noradrenaliini taset.

Argofan SR kasutatakse depressiooniga täiskasvanute raviks või haiguse taastekke vältimiseks. Argofan SR on mõeldud ravimiks ka järgmiste ärevushäiretega täiskasvanutele: generaliseerunud ärevushäire, sotsiaalärevushäire (sotsiaalsete olukordade kartmine või vältimine) ja paanikahäire (paanikahood). Depressiooni või ärevushäirete õige ravi aitab teil paraneda. Ravita jäämisel võib teie seisund püsida ning muutuda tõsisemaks ja raskemini ravitavaks.

2. Mida on vaja teada enne Argofan SR'i võtmist

Ärge võtke Argofan SR'i:

- kui olete venlafaksiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui te kasutate samal ajal või olete kasutanud viimase 14 päeva jooksul ravimeid, mida nimetatakse pöördumatu toimega monoamiinoksüdaasi inhibiitoriteks ja mida kasutatakse depressiooni või Parkinsoni tõve raviks. Pöördumatu toimega monoamiinoksüdaasi inhibiitori kasutamine koos teiste ravimite, sealhulgas preparaadiga Argofan SR, võib põhjustada tõsiseid või isegi eluohtlikke kõrvaltoimeid. Pärast preparaadi Argofan SR kasutamise lõpetamist peate te ootama vähemalt 7 päeva, enne kui võite kasutada mõnda monoamiinoksüdaasi inhibiitorit (vt ka lõigud „Serotoniinisündroom“ ja „Muud ravimid ja Argofan SR“).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Argofan SR'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui te kasutate samaaegselt preparaadiga Argofan SR ravimeid, mis võivad suurendada serotoniinisündroomi tekkimise riski (vt lõik „Muud ravimid ja Argofan SR“);
- kui teil on probleeme silmadega, näiteks teatavat liiki glaukoom (silma siserõhu tõus);

- kui teil on esinenud kõrget vererõhku;
- kui teil on esinenud probleeme südamega või ebaregulaarne südamerütm;
- kui teil on esinenud krampe;
- kui teil on esinenud vere naatriumitaseme langust (hüponatreemia);
- kui teil tekib kergesti verevalumeid või verejookse (on esinenud veritsemishäireid) või kui te kasutate muid ravimeid, mis võivad veritsemisohtu suurendada;
- kui teie vere kolesteroolitase tõuseb;
- kui teil või kellelgi teie pereliikmetest on esinenud maniat või bipolaarset häiret (ülemäärane erutatus või eufooria);
- kui teil on esinenud agressiivset käitumist.

Argofan SR võib põhjustada rahutust või võimetust rahulikult istuda või seista. Sellisel juhul rääkige sellest arstile.

Enesetapumõtted ja depressiooni või ärevushäire süvenemine

Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini, kui te hakkate võtma esimest korda antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega, tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid vahel kauem.

Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:

- kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.
- kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25-aastased), keda raviti antidepressandiga.

Kui teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid mistahes ajal, võtke ühendust oma arstiga või minge otsekohe haiglasse.

Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Suukuivus

10%-l venlafaksiiniga ravitavatest patsientidest esineb suukuivust. See võib suurendada kaariese tekkimise riski. Seepärast peate oma hammaste hügieeni eest eriti hoolt kandma.

Suhkurtõbi

Kui teil on suhkurtõbi ja te võtate samal ajal ka venlafaksiini (või teisi SSRI rühma ravimeid), võib osutuda vajalikuks kohandada teie insuliini ja/või suukaudsete suhkurtõvevastaste ravimite annuseid.

Lapsed ja noorukid (alla 18-aastased)

Preparaati Argofan SR ei tohi üldjuhul kasutada alla 18-aasta vanustel lastel ega noorukitel. Peaksite ka teadma, et alla 18-aasta vanustel patsientidel on sellesse klassi kuuluvate ravimite kasutamisel suurem oht kõrvaltoimete tekkimiseks, nt enesetapukatse, enesetapumõtted ja vaenulikkus (valdavalt agressiivsus, vastanduv käitumine ja viha). Hoolimata sellest võib teie arst ordineerida preparaati Argofan SR ka alla 18-aasta vanustele patsientidele, kui ta leiab, et see on neile kasulik. Kui teie arst on määranud preparaati Argofan SR alla 18-aasta vanusele patsiendile, pidage selle üle arstiga uuesti nõu. Kui alla 18-aasta vanustel patsientidel tekivad või süvenevad preparaadi Argofan SR kasutamise ajal eespool nimetatud sümptomid, rääkige sellest arstile. Ka preparaadi Argofan SR ohutust kasvule, küpsemisele ja kognitiiv-käitumuslikule arengule selle pikaajalise kasutamise korral selles vanuserühmas ei ole veel tõestatud.

Muud ravimid ja Argofan SR

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.. Teie arst otsustab, kas te võite kasutada preparaati Argofan SR koos teiste ravimitega.

Ärge alustage ega lõpetage teiste ravimite, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimite ega looduslike või taimsete ravimite kasutamist ilma eelnevalt arsti või apteekriga konsulteerimata. Sellised ravimid on näiteks:

- monoamiinoksüdaasi inhibiitoreid sisaldavad preparaadid (MAOI-d: vt lõik „Mida on vaja teada enne Argofan SR'i võtmist“).
- antibiootikum linesoliidi sisaldavad ravimid (kasutatakse infektsioonide raviks).
- pöörduva toimega MAOI moklobemiidi sisaldavad ravimid (kasutatakse depressiooni raviks).
- triptaanid (kasutatakse migreeni korral).
- depressiooniravimid, näiteks SNRI, SSRI, tritsüklilised või liitiumi sisaldavad ravimid.
- sibutramiini sisaldavad ravimid (kasutatakse kehakaalu alandamiseks).
- tramadooli (valuvaigisti) sisaldavad ravimid.
- metüleensinist sisaldavad ravimid (kasutatakse vere kõrge methemoglobiinisisalduse raviks).
- liht-naistepuna (ehk *Hypericum perforatum*, looduslik või taimne ravim kerge depressiooni raviks).
- trüptofaani sisaldavad ravimid (kasutatakse näiteks unehäirete ja depressiooni raviks).
- antipsühhootikumid (kasutatakse sellise haiguse raviks, mille sümptomiteks on asjade kuulmine, nägemine või tundmine, mida pole olemas, ekslik veendumus, ebatavaline kahtlustavus, ebaselge mõttekäik ja endasse sulgumine),

Ravi ajal venlafaksiiniga, eriti selle kasutamisel koos teiste ravimitega võib tekkida potentsiaalselt eluohtlik seisund, serotoniinisündroom (vt lõik 4).

Serotoniinisündroomi nähtudeks ja sümptomiteks võivad olla mitu järgmistest seast: rahutus, hallutsinatsioonid, koordinatsioonivõime kadumine, südametegevuse kiirenemine, kehatemperatuuri tõus, vererõhu kiired muutused, reflekside üliaktiivsus, diarröa, kooma, iiveldus, oksendamine. Kui arvate, et teil on tekkimas serotoniinisündroom, pöörduge kohe arsti poole.

Järgmistel ravimitel võib tekkida preparaadiga Argofan SR samuti koostoime ning nende kasutamisel peab olema ettevaatlik. Eriti tähtis on öelda oma arstile või apteekrile, kui te kasutate ravimeid, mis sisaldavad:

- ketokonasooli, itrakonasooli, vorikonasooli, posakonasooli (seenevastased ravimid);
- klaritromütsiini, telitromütsiini (infektsioonidevastased antibiootikumid);
- atasanaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri, sakvინaviiri (kasutatakse HIV raviks);
- haloperidooli või risperidooni (psühhiaatriliste seisundite raviks);
- metoprolooli (beeta-adrenoblokaator kõrge vererõhu ja südameprobleemide raviks).

Argofan SR koos toidu, joogi ja alkoholiga

Preparaati Argofan SR tuleks võtta koos toiduga (vt lõik 3). Preparaadi Argofan SR kasutamisel tuleb hoiduda alkoholi tarvitamisest.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Preparaati Argofan SR võite kasutada ainult pärast selle võimaliku kasulikkuse ja sellega teie sündimata lapsele kaasnevate võimalike ohtude läbiarutamist arstiga.

Kui kasutate preparaati Argofan SR raseduse ajal, olge kindel, et teie arst ja/või ämmaemand sellest teavad, sest lapsel võivad tekkida sündides teatavad sümptomid. Kui te võtate raseduse ajal selliseid ravimeid (SSRI-d), võib suureneda imikul tõsise seisundi tekkimise risk. Need sümptomid ilmuvad tavaliselt esimese 24 tunni jooksul pärast lapse sündi. Nende sümptomite hulka kuuluvad võimetus korralikult imeda ja hingamisprobleemid, mida nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaalseks hüpertensiooniks (PPHN), mis põhjustab lapse kiiremat hingamist ja naha muutumist sinakaks. Kui see juhtub teie lapsega, võtke otsekohe oma arsti ja/või ämmaemandaga ühendust.

Argofan SR imendub rinnapiima. See võib imikule toimet avaldada. Seega pidage nõu oma arstiga ja ta otsustab, kas peate katkestama imetamise või ravi preparaadiga Argofan SR. Imetatavad imikud võivad nutta, olla ärritunud ja neil võib esineda unehäireid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid, kuni te ei tea, millist mõju Argofan SR teile avaldab.

3. Kuidas Argofan SR'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Depressioon, generaliseerunud ärevushäire ja sotsiaalärevushäire

Soovituslik algannus depressiooni, generaliseerunud ärevushäire ja sotsiaalärevushäire raviks on 75 mg päevas. Arst võib teie annust järk-järgult suurendada, depressiooni raviks vajaduse korral isegi maksimaalse annuseni 375 mg päevas. Maksimaalne annus generaliseerunud ärevushäire ja sotsiaalärevushäire raviks on 225 mg päevas.

Paanikahäire

Kui teil ravitakse paanikahäiret, alustab arst väiksemast annusest (37,5 mg venlafaksiini) ja suurendab siis annust järk-järgult. Paanikahäire puhul on maksimaalne annus 225 mg päevas.

Maksa- või neeruprobleemidega patsiendid

Kui teil on maksa- või neeruprobleemid, rääkige sellest arstile, sest teil võib osutuda vajalikuks preparaadi Argofan SR annust muuta.

Võtke preparaati Argofan SR iga päev ligikaudu samal ajal, kas hommikul või õhtul. Tabletid tuleb koos vedelikuga tervelt alla neelata ning neid ei tohi purustada, katki närida ega lahustada. Preparaati Argofan SR tuleb võtta koos toiduga.

Kui te võtate Argofan SR'i rohkem kui ette nähtud

Pöörduge kohe oma arsti või apteekri poole, kui olete võtnud preparaati Argofan SR rohkem, kui arsti poolt ette nähtud.

Võimaliku üleannustamise sümptomiteks võivad olla kiire südame löögisagedus, ärkveloleku taseme muutused (unisusest koomani), hägustunud nägemine, krambid ja oksendamine

Kui te unustate Argofan SR'i võtta

Kui olete annuse vahele jätnud, võtke ravimit kohe, kui teile meenub. Kui on aga juba aeg võtta järgmist annust, ärge vahelejäänud annust võtke, vaid võtke üks annus nagu tavaliselt. Ärge võtke preparaadi Argofan SR suuremat päevaannust, kui arst on teile päevas määranud. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Argofan SR'i võtmise

Ärge lõpetage Argofan SR'i võtmist ega vähendage selle annust ilma arstiga nõu pidamata, isegi kui te ennast paremini tunnete. Kui teie arst arvab, et te ei vaja enam preparaati Argofan SR, võib ta paluda teil vähendada annust aegamööda, enne kui ravi täielikult lõpetada. Preparaadi Argofan SR kasutamise lõpetamisel on täheldatud kõrvaltoimeid, eriti kui lõpetada ravi preparaadiga Argofan SR järsult või vähendada annust liiga kiiresti. Mõnel patsiendil võivad tekkida sellised sümptomid nagu väsimus, pearinglus, uimasus, peavalu, unetus, halvad unenäod, suukuivus, söögiisu kadumine, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, närvilisus, rahutus, ärevus, segasus, kohin kõrvus, kipitustunne või harva elektrilöögitaoline tunne, nõrkus, värinad, higistamine, krambid või gripilaadsed sümptomid. Arst annab teile nõu, kuidas ravi preparaadiga Argofan SR järk-järgult lõpetada. Kui teil tekib mõni nimetatud sümptom või muid häirivaid sümptomeid, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allergilised reaktsioonid

Järgmistel juhtudel katkestage preparaadi Argofan SR kasutamine. Pöörduge kohe arsti poole või lähima haigla esmaabiosakonda:

- pitsitustunne rinnus, kähisev hingamine, neelamis- või hingamisraskused;
 - näo, kõri, käte või jalgade turse;
 - närvilisus või ärevus, pearinglus, puperdamine, äkiline nahapunetus ja/või soojatunne; raskekujuline lööve, kihelus või nahapõletik (nahapinnast kõrgemad punetavad või kahvatud laigud, mis sageli kihelevad).
 - serotiinisündroomi nähud ja sümptomid, mille hulka võivad kuuluda rahutus, hallutsinatsioonid, koordinatsiooni kadumine, kiire südame töö, kehatemperatuuri tõus, kiired muutused vererõhu väärtustes, üliaktiivsed refleksid, kõhulahtisus, kooma, iiveldus, oksendamine.
- Serotiinisündroom võib oma kõige raskemal kujul sarnaneda maliigsele neuroleptilisele sündroomile (MNS). MNS-i sümptomid võivad kombineerituna olla palavik, südame kiirenenud löögisagedus, higistamine, raskekujuline lihaskangus, segasusseisund, lihasensüümide suurenenud aktiivsus (määratav vereanalüüsis).

Tõsised kõrvaltoimed

Kui märkate järgmisi kõrvaltoimeid, võite vajada kiiresti meditsiinilist abi:

- südameprobleemid, näiteks kiire või ebaregulaarne pulss, vererõhu tõus;
- silmaprobleemid, näiteks nägemise ähmastumine või pupillide laienemine;
- närviprobleemid: näiteks pearinglus, „sipelgate jooksmise” tunne, liikumishäired, krambid;
- psühhiaatrilised probleemid, näiteks hüperaktiivsus ja eufooria;
- ravi äräjätunähud (vt lõik 3 – „Kui te lõpetate Argofan SR’i võtmise“);
- kõha, vilistav hingamine, hingeldus ja kõrge kehatemperatuur;
- must (tõrvataoline) väljaheide või veri roojas;
- naha või silmavalgete kollasus, sügelus või tume uriin, mis võivad olla maksapõletiku (hepatiit) sümptomiteks;
- pikenenud veritsusaeg – kui te lõikate endale sisse või vigaste end, võib verejooksu peatumine võtta kauem aega.

Kõrvaltoimete täielik loetelu

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

- suukuivus, peavalu, iiveldus, higistamine (sh öine higistamine) ja pearinglus.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

- söögiisu vähenemine;
- ebatavalised unenäod, libiido langus, lihastoonuse tõus, unetus, närvilisus, nõeltega torkimise tunne, unisus, treemor, segasus, enesest lahusoleku (või eraldatuse) tunne;
- ähmane nägemine, laienenud pupillid, silmalihaste võimetus kohaneda kaugele vaatamiselt lähedale vaatamisele;
- helinad kõrvades (tinnitus);
- vererõhu tõus, nahaõhetus, südamekloppimine;
- haigutamine;
- kõhukinnisus, oksendamine ja kõhulahtisus;
- urineerimisraskused, sagenenud urineerimine;
- ejakulatsiooni/orgasmi häired (meestel), võimetus saavutada orgasmi, erektsiooni häired (impotentsus), ebaregulaarsed menstruatsioonid, nt rohke vereeritus või sage ebaregulaarne veritsus;
- nõrkus (asteenia), väsimus, külmavärinad;
- kolesteroolisisalduse tõus.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

- sinikad, must tõrvataoline väljaheide või vere esinemine roojas, mis võivad olla sisemise verejooksu tunnusteks;
- kehakaalu tõus, kehakaalu langus;

- tunnete või emotsioonide puudumine, hallutsinatsioonid, lihaste tahtmatud liigutused, rahutus, koordineerimise- ja tasakaaluhäired, reaalsusest lahusoleku (või eraldatuse) tunne, kõrgeenenud meeleolu ja tohutu energiaturv (hüpomania);
- maitsetundlikkuse muutus;
- peeringluse tunne (eriti, kui tõustakse liiga kiiresti püsti), minestamine, kiire südamerütm;
- hammaste krigistamine;
- nahalööve, ebataoline juuste väljalangemine;
- võimetus urineerida;
- ebataoline orgasm (naistel);
- tundlikkus päikesevalguse suhtes, järsk turse teke, mis avaldub nahaalustes kudedes (angioödem).

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

- krampid või tõmbused, ülierutuse tunne või eufooria (mania);
- kusepeetus.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

- vereliistakute vähenenud arv, mis võib viia marrastuste või veritsuste tekke suurenemiseni; verehüübed, sh granulotsüütide (teatud tüüpi valgevererakud) arvu vähenemine, mis võib viia suurenenud infektsiooniriskini; aneemia luuüdi pärssumisest;
- maksaensüümide taseme muutused veres, vere naatriumisisalduse langus, sügelemine, naha või silmavalgete kollasus, tume uriin, või gripi-laadsed sümptomid, need on maksapõletiku (hepatiit) tunnused, liigne vedelikutarbimine (tuntakse kui SIADH - antidiureetilise hormooni liignõrjustuse sündroom), ebanormaalne rinnapiima teke;
- kehatemperatuuri tõus koos lihasjäikusega, segasus või erutus ja higistamine, või kontrollimatud lihastõmbused, mis võivad olla tõsise seisundi, mida nimetatakse maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks, sümptomid; eufooriline meeleolu, uimasus, püsivalt kiired silmade liigutused, kohmakus, rahutus, purjusoleku tunne, higistamine või lihasjäikus, mis on serotoniinisündroomi sümptomid; desorientatsioon ja segasus, millega sageli kaasnevad hallutsinatsioonid (deliirium); lihaste jäikus, spasmid ja tahtmatud liigutused; enesetapu- ja enesevigastamise mõtted, vertiigo, agressiivsus;
- tugev silmavalu ja vähenenud või ähmane nägemine;
- vererõhu langus, ebataoline, kiire või ebaregulaarne südamerütm, mis võib tekitada minestamise, ootamatud verejooksud, nt igemeveritsused, veri uriinis või okses või ootamatute sinikate teke või veresoonte lõhkemine (purunenud veenid);
- köha, vilistav hingamine, hingeldus ja kõrge palavik, mis on valgeliblede taseme tõusuga seotud kopsupõletiku (pulmonaalne eosinofiilia) sümptomid;
- tugevad kõhu- või seljavalud (mis võivad viidata tõsisele soole-, maksa- või kõhunäärmele);
- seletamatu lihasvalu, hellus või nõrkus (rabdomüolüüs);
- näo- või keeleturse, hingamisraskus või hingeldus, sageli koos nahalööbega (see võib olla tõsine allergiline reaktsioon).

Kuna Argofan SR võib põhjustada mõnikord kõrvaltoimeid, millest te ei tarvitse olla teadlik, võib teie arst teha teile aeg-ajalt vereanalüüse, eriti kui olete Argofan SR'i kaua kasutanud.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas Argofan SR'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõblik kuni“.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Argofan SR sisaldab

- Toimeaine on venlafaksiin (venlafaksiinvesinikkloriidina). Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 75 mg või 150 mg venlafaksiini.
- Abiained on hüpromelloos, magneesiumstearaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, metakrüülhappe etüülakrülaadi kopolümeeri (1:1) dispersioon 30%, atsetüültrietüültsitraat, talk.

Kuidas Argofan SR välja näeb ja pakendi sisu

Valge või valkjas, ümmargune, kaksikkumer tablett, diameetriga 10 mm (75 mg) või 11 mm (150 mg).

Pakendis 30 tabletti (3x10 tabl), 60 tabletti (6x10 tabl) või 100 tabletti (10x10 tabl).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

ZENTIVA a.s.,
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovakkia Vabariik

Tootja:

Saneca Pharmaceutical a.s.
Nitrianska 100
920 27 Hlohovec
Slovakkia Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt 139E/2
Tallinn 11317
Eesti
Tel. +372 627 34 80
Faks. +372 627 34 81

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Argofan SR 75 või 150 SR Tšehhi Vabariigis, Eestis, Rumeenias ja Slovakkias.

Argofan 75 või 150 Kreekas ja Küprosel

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2014