

## **Pakendi infoleht: teave kasutajale**

### **Strepsils Intensive, 8,75 mg losengid** Flurbiprofeen

#### **Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

-  
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### **Infolehes antakse ülevaade:**

1. Mis ravim on Strepsils Intensive ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Strepsils Intensive võtmist
3. Kuidas Strepsils Intensive't võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Strepsils Intensive't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Strepsils Intensive ja milleks seda kasutatakse**

Strepsils Intensive sisaldab toimeainet flurbiprofeen. Flurbiprofeen kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA-d). Need ravimid on valuvaigistava, põletikuvastase ja palavikku alandava toimega. Strepsils Intensive't kasutatakse kurgupõletiku sümptomite, nagu kurgu kähedus, valu ja paistetus, leevendamiseks.

#### **2. Mida on vaja teada enne Strepsils Intensive kasutamist**

##### **Ärge kasutage Strepsils Intensive't**

- kui olete flurbiprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui olete allergiline (ülitundlik) atsetüülsalitsüülhappe või mõne teise MSPVA suhtes;
- kui teil on kunagi pärast atsetüülsalitsüülhappe või mõne teise MSPVA kasutamist tekkinud astma, ootamatu hingeldus, nohu, näopaistetust või sügelev lööve (nõgestõbi);
- kui teil on või on kunagi olnud haavand või veritus (kaks või rohkem maohaavandi episoodi) maos või sooltes;
- kui teil on pärast MSPVA-de võtmist olnud seedetrakti verejooks või perforatsioon, raske kuluga koliit või vere hüübimishäired;
- kui te kasutate teisi MSPVA-sid (nagu tselekoksib, ibuprofeen, diklofenaknaatrium jne.);
- kui teie raseduse lõpuni on jäänud vähem kui 3 kuud;
- kui teil on või on olnud raske südamel-, neeru- või maksapuudulikkus;
- kui te olete alla 12-aastane.

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne Strepsils Intensive võtmist pidage nõu oma arstiga:

- kui teil on kunagi olnud astma;
- kui teil on bakteriaalne infektsioon (kollakasroheline röga köha, valulikud põskkoopad, kurguvalu);
- kui teil on probleeme neerude või maksaga;

- kui teil on probleeme südamega, varasem insult või te arvate, et teil võivad need seisundid tekkida (nt kui teil on kõrge vererõhk, diabeet või kõrge kolesteroolitase või te suitsetate);
- kui teil on kõrge vererõhk;
- kui teil on krooniline autoimmuunhaigus (kaasa arvatud süsteemne erütematoosne luupus);
- kui teil on regulaarsed peavalud;
- kui teil on mõni tõsine nahareaktsioon (kaasa arvatud Stevensi-Johnsoni sündroom);
- kui te olete eakas, sest siis teil võivad tõenäolisemalt tekkida selles infolehes loetletud kõrvaltoimed.

### **Erihoiatused**

Ravimid, nagu Strepsils Intensive, võivad olla seotud südameataki (müokardiinfarkt) või insuldi tekke riski vähesese suurenemisega. See risk on tõenäolisem suurte annuste ja pikaajalise ravi puhul. Ärge ületage soovituslikku annust ega ravi kestust (3 päeva).

Kui teil on probleeme südamega, varasem insult või te arvate, et teil on nende seisundite tekkimise oht (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, diabeet või kõrge kolesteroolitase või olete suitsetaja), peate te konsulteerima oma arsti või apteekriga.

### **Muud ravimid ja Strepsils Intensive**

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Eriti, kui kasutate:

- atsetüülsalitsüülhapet väikeses annuses (kuni 75 mg päevas),
- kõrge vererõhu või südamepuudulikkuse ravimeid,
- uriinihulka suurendavaid ravimeid (diureetikumid, sh kaaliumisäästvad ravimid),
- ravimeid vere vedeldamiseks (antikoagulandid),
- podagra ravimeid,
- teisi MSPVA-sid või steroide (nagu tseleksiib, ibuprofeen, diklofenaknaatrium või prednisoloon),
- mifepristooni (ravim raseduse katkestamiseks),
- kinoloonireia antibiootikume (nagu tsiprofloksatsiin),
- tsüklosporiini või takroliimust (immuunreaktsiooni pärssivad ravimid),
- fenütoiini (epilepsiaravim),
- metotreksaati (vähivastane ravim),
- liitiumi või selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (SSTI-d) (depressiooni ravi),
- suukaudseid diabeedivastaseid ravimeid (diabeedi ravi),
- zidovudiini (HIV-ravi).

### **Strepsils Intensive koos alkoholiga**

Strepsils Intensive ravi ajal tuleb vältida alkoholi kasutamist.

### **Rasedus ja imetamine**

Strepsils Intensive losengid kuuluvad ravimite gruppi, mis võivad mõjutada naiste viljakust. See mõju on pöörduv ravimi manustamise lõpetamisel. Ei ole tõenäoline, et losengide lühiajaline kasutamine võiks mõjutada teie rasedumist, siiski, konsulteerige enne selle ravimi võtmist arstiga, kui teil on probleeme rasedumisega.

**Ärge võtke seda ravimit raseduse viimase 3 kuul jooksul.** Raseduse esimese 6 kuu jooksul või imetamise korral konsulteerige enne selle ravimi kasutamist arstiga.

Enne mistahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Strepsils Intensive ei tohiks mõjutada teie autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet.

### **Strepsils Intensive sisaldab glükoosi ja sahharoosi**

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima

oma arstiga, kuna see sisaldab **glükoosi ja sahharoosi**.

### 3. Kuidas Strepsils Intensive't võtta

**Täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele.** Ärge andke neid losenge alla 12-aastastele lastele.

- Võtke üks loseng ja imege aeglaselt suus.
- Imemise ajal liigutage alati losengi suus ringi.
- Losengid hakkavad mõjuma 30 minuti jooksul.
- Vajadusel võtke 1 loseng iga 3...6 tunni järel.
- **Ärge võtke rohkem kui 5 losengi 24 tunni jooksul.**

**Need losengid on ainult lühiajaliseks kasutamiseks.**

Võtke nii vähe losenge võimalikult lühikese aja jooksul kui vajate, et teie haigussümptomid kaoksid.

**Ärge kasutage Strepsils Intensive't kauem kui 3 päeva jooksul**, kui just arst pole teile seda soovitanud. Kui teie seisund ei parane või halveneb või kui tekivad uued sümptomid, nagu bakteriaalne infektsioon, konsulteerige arsti või apteekriga.

#### **Kui te võtsite Strepsils Intensive't rohkem kui ette nähtud**

Konsulteerige arsti või apteekriga või pöörduge kohe lähimasse haiglasse. Üleannustamise sümptomid võivad olla: iiveldus või oksendamine, kõhuvalu või harvemini kõhulahtisus. Samuti võivad ilmned helin kõrvus, peavalu ja seedetrakti veritsus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Strepsils Intensive põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

#### **LÕPETAGE SELLE RAVIMI KASUTAMINE ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil tekivad:**

- **seedetrakti veritsuse sümptomid**, nagu veri väljaheites, mustjas tõrvataoline väljaheide, veriokse või tumedad kohvioletalised tükid okses.
- **väga harva esinevad allergilised reaktsioonid**, nagu astma, ootamatu hingeldus, hingamisraskused, näo-, huulte- või keeleturse, nahareaktsioonid (nagu nõgestõbi, sügelus, nahalööbed), minestus.

#### **LÕPETAGE SELLE RAVIMI KASUTAMINE ja rääkige oma arstile või apteekrile, kui teil tekivad:**

- **sümptomid kõhupiirkonnas**, nagu seedehäired, kõrvetised, kõhuvalu või teised ebatavalised sümptomid kõhus.

#### **Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te märkate mõnda järgnevat kõrvaltoimet või mõnda siin mitteleotletud kõrvaltoimet:**

**Väga sage** (tekib rohkem kui ühel kasutajal 10'st):

- ebameeldiv tunne suus, nagu põletav või soe tunne.

**Sage** (tekib 1...10 kasutajal 100'st):

- kõhuvalu, iiveldus, kõhulahtisus
- suukuivus või torkiv tunne suus, suuhaavandid.

**Aeg-ajalt** (tekib 1...10 kasutajal 1000'st):

- seedehäired, puhitus, oksendamine, nahalööbed
- peavalu, pearinglus.

**Harv** (tekib 1...10 kasutajal 10000'st):

- unisus, unehäired
- pikenenud veritsusaeg

- muutused veres (mis võivad põhjustada verevalumeid, palavikku, suuhaavandeid, nahakahvatust ja nõrkust)
- probleemid neerudega, mis põhjustavad muutusi uriinis, seljavalu ja turseid
- palavik
- hingamisraskused, ootamatu hingeldus
- seedetrakti mulgustus, maohaavand.

**Väga harv** (tekib vähem kui ühel kasutajal 10000'st):

- maksaprobleemidest põhjustatud kollatõbi (naha ja silmavalgete kollasus)
- rasked nahareaktsioonid, nagu Stevensi-Johnsoni sündroom (nahalööve ja villid, suu ja silmade haavandid) ja Lyelli sündroom (punane hell ketendav nahk).

**Teised kõrvaltoimed (millest on teatatud sarnaste MSPVA'de puhul, nagu ibuprofeen):**

- kõhukinnisus (harv), maopõletik (väga harv)
- harv ja vähene suurenenud risk südameataki (müokardiinfarkt), insuldi, kõrge vererõhu, ajupõletiku tekkeks.

#### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.raviamet.ee](http://www.raviamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas Strepsils Intensive't säilitada**

- Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
- Hoida originaalpakendis.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Pakendi sisu ja muu teave**

### **Mida Strepsils Intensive sisaldab**

- Toimeaine on flurbiprofeen. Üks loseng sisaldab 8,75 mg flurbiprofeeni.
- Teised koostisosad on makrogool 300, kaaliumhüdroksiid, sidruni maitseaine, levomentool, mesi, veeldatud sahharoos ja veeldatud glükoos.

### **Kuidas Strepsils Intensive välja näeb ja pakendi sisu**

Ümmarguse kujuga, läbipaistmatud kahvatukollased losengid, millel on reljeffrütkis kaubamärgi logo. Pakend sisaldab 8, 16 või 24 losengi. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

### **Müügiloa hoidja ja tootja**

#### Müügiloa hoidja

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Poola

#### Tootja

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd

Nottingham NG90 2DB  
Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloo hoidja kohaliku esindaja poole:

Kärberi 34-32  
13919 Tallinn  
Tel: 51 51 555

See ravimpreparaat on saanud müügiloo Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega

Ühendkuningriik	Streflam 8.75mg lozenges
Austria	Strepfen 8,75 mg - Lutschtabletten
Saksamaa	Dobendan Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten
Portugal	Strepfen Mel e Limão 8,75 mg Pastilhas
Belgia	Strepfen 8,75 mg zuigtablett
Küpros	Strefen 8,75 mg Τροχίσκοι
Taani	Strefen 8,75mg Sugetabletter
Eesti	Strepsils Intensive, 8,75 mg losengid
Kreeka	Strepfen 8,75 mg Τροχίσκοι
Hispaania	Strefen 8,75 mg pastillas para chupar
Soome	Strefen 8,75mg Imeskelytabletti
Island	Strefen 8,75mg Munnsogstafla
Leedu	Strepsils Intensive, 8,75 mg, Kietoji pastilė
Luksemburg	Strepfen 8,75 mg pastille
Holland	Strepsils Strepfen, zuigtablett 8,75 mg
Rootsi	Strefen 8,75mg Sugtablett
Sloveenia	Strepfen 8,75mg pastile

**Infoleht on viimati uuendatud augustis 2014**